

Método de Prueba (Toma de muestras)

PRUEBA DE PCR

TOMA DE MUESTRA DE SALIVA



No debe comer, beber, fumar, ni siquiera cepillarse los dientes, o sea, no debe meter nada en la boca durante 10 minutos antes de sacar la muestra de la saliva



- ① Por favor, ponga su saliva en el recipiente que se le entregará en el Centro de pruebas (farmacia de la tienda) donde se realiza la prueba.
- ② Entregue el envase de saliva al responsable del Centro de pruebas (farmacia de la tienda) donde se realiza la prueba.
- ③ Por favor, siga las instrucciones de la persona encargada.

PRUEBAS CUALITATIVAS DE ANTÍGENOS

TOMA DE MUESTRA NASOFARINGEO



- ① Introduzca suavemente el hisopo suministrado con el kit a unos 2 cm de la entrada de la cavidad nasal como si estuviera limpiando la mucosidad.
- ② Una vez introducido, gire suavemente el hisopo unas 5 veces.
- ③ Deje el hisopo en la zona introducida durante unos 5 segundos, hasta humedecerla suficientemente y, luego retírelo suavemente de la cavidad nasal cuidando que la punta no toque ninguna otra parte del cuerpo.
- ④ Coloque el hisopo con la muestra en el recipiente designado.
- ⑤ Por favor, siga las instrucciones de la persona encargada.