

讓您了解 新冠疫苗 第 3 劑的情況

為何需要接種第 3 劑？

隨著時間的推移，
疫苗的保護力會下降

新冠疫苗雖有很高的免疫效果，
但時間久了保護力就會下降。
為了提高效果，請接種第 3 劑。

對 Omicron 變異株的預防效力
第 2 劑接種後



對象


第 2 劑接種後超過 5 個月的 12 歲以上者

費用

免費 ¥0

地點

所居住市町村之會場・醫院



接種有何好處？

接種第 3 劑後，比較不容易被感染。

據了解，接種第 3 劑對預防感染新冠病毒和染疫後病情惡化皆非常有效。

疫苗可混打嗎？

接種與第 1・2 劑不同的疫苗也很安全

第 3 劑可接種與第 1・2 劑不同的疫苗。

無論是輝瑞疫苗或是莫德納疫苗，

最重要的是請盡快接種。

雖接種不同疫苗，但免疫效力極高也極安全。

接種第 3 劑是否安全？

不良反應與第 2 劑接種後的症狀大致相同

輝瑞疫苗和莫德納疫苗的不良反應與接種第 2 劑時大致相同。

莫德納疫苗第 3 劑的注射量是第 1、2 劑的半劑量，所以反應會比第 2 劑輕。



- ◆ 曾感染新冠病毒者也請接種第 3 劑。
- ◆ 疫苗接種後請繼續採取預防感染新冠病毒措施。
- ◆ 請勿強迫周邊的人施打疫苗。
- ◆ 請勿歧視沒接種疫苗者。

若有不明之處，請致電諮詢。（需負擔電話費）

有關接種券及 市町村接種會場・醫院之預約等	居住地的政府機關
有關疫苗及 接種後之症狀等	群馬新冠疫苗專線 0570-783-910（24小時 19種語言）
上述以外之諮詢	群馬外國人綜合諮詢中心 027-289-8275 （週一～週五 9:00～17:00 5種語言）
疫苗詳情	厚生労働省  群馬縣 

尚未接種第 1、2 劑者，亦可免費接種疫苗。