

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和3年12月22日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第19276号	グリホス	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	ケミノバ エイエス

### ■変更内容

#### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- 作物名「果樹類（かんきつ、パイナップルを除く）、かんきつ、水田作物（水田畦畔）、水田作物（水稲を除く）、移植水稲、直播水稲、麦類（小麦を除く）、小麦、豆類（種実、ただし、だいず、らっかせいを除く）、だいず、かんしょ、キャベツ、はくさい、だいこん、さとうきび（春植え）、茶、牧草、りんご、なし、かき、ぶどう、くり、もも」を削除する。

#### 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

##### 【変更前】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
果樹類 (かんきつ、 パイナップル を除く)	—	スギナ	収穫7日前まで (雑草生育盛期)	2000 mL/10a	少量散布 25~50 L/10a	3回以内	雑草 木茎葉 散布	3回以内
		一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a			
		多年生雑草		500~1000 mL/10a				
		つる性 多年生雑草 ササ類 落葉雑かん木	夏~秋期 但し、 収穫7日前まで (生育盛期以降)	1000 mL/10a	少量散布 25~50 L/10a			
かんきつ	—	スギナ	収穫7日前まで (雑草生育盛期)	2000 mL/10a	少量散布 25~50 L/10a	3回以内	雑草 木茎葉 散布	5回以内
		一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a			
		多年生雑草		500~1000 mL/10a				
		つる性 多年生雑草 ササ類 落葉雑かん木	夏~秋期 但し、 収穫7日前まで (生育盛期以降)	1000 mL/10a	少量散布 25~50 L/10a			
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a	2回以内		3回以内
		多年生雑草		500~1000 mL/10a				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数					
				薬量	希釈水量								
水田作物 (水稲を除く)	—	一年生雑草	耕起10日以前 (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a	1回	雑草木茎葉散布	2回以内					
		多年生雑草		500~1000 mL/10a									
移植水稲		一年生雑草		250~500 mL/10a	少量散布 25~50 L/10a								
		多年生雑草		500~1000 mL/10a	L/10a								
		一年生及び 多年生雑草	湛水30~5日前 (雑草生育期) (不耕起栽培)	500 mL/10a	50L/10a								
直播水稲	—	一年草雑草	耕起10日以前 (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a	1回	雑草木茎葉散布	2回以内					
		多年生雑草		500~1000 mL/10a					少量散布 25~50 L/10a				
		一年生及び 多年生雑草	耕起直後~ 出芽前 (雑草生育期) (乾田耕起栽培)	500mL/10a	少量散布 25~50 L/10a								
			は種30日前~ 出芽前 (雑草生育期) (乾田不耕起栽培)										
麦類 (小麦を除く)	—	一年生雑草	耕起10日以前 (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a	3回以内	雑草木茎葉散布	3回以内					
小麦		多年生雑草		500~1000 mL/10a									
豆類 (種実、ただし、 だいず、らっかせい を除く)	—	一年生雑草	は種10日以前 (雑草生育期)	250~500 mL/10a	通常散布 50~100 L/10a	2回以内	雑草木茎葉散布	2回以内					
だいず									耕起7日以前 (雑草生育期)	500~1000 mL/10a	少量散布 25~50 L/10a	1回	4回以内
かんしょ													2回以内
キャベツ		耕起10日以前 (雑草生育期)	500~1000 mL/10a	L/10a	1回	1回							
はくさい						2回以内							
だいこん		は種10日前~ は種当日 (耕起整地後) (雑草発生揃期)	250~500 mL/10a	L/10a	2回以内	6回以内							
さとうきび (春植え)						多年生雑草		500~1000 mL/10a	L/10a	2回以内			
茶	一年生雑草	春~夏期 但し、 摘採7日前まで (雑草生育期)	250~500 mL/10a	2回以内	2回以内								
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生雑草	更新・造成の 10日以前 (耕起造成前) (雑草生育期)	250~500 mL/10a	2回以内	2回以内	3回以内						
		多年生雑草		500~1000 mL/10a									
		一年生雑草 多年生雑草	は種10日前~ は種当日 (耕起整地後) (雑草発生揃期)	250~500 mL/10a									

## 極小水量処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
かんきつ りんご なし	—	一年生及び 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	400～600 mL/10a	4～6 L/10a	3回以内	雑草木 茎葉散布	5回以内
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔		収穫14日前まで (雑草生育期)					2回以内

## 塗布処理

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
かんきつ りんご なし かき ぶどう くり もも	—	一年生雑草 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	3～6倍	3～6L/10a	3回以内	雑草茎葉 塗布	5回以内
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔		収穫14日前まで (雑草生育期)					2回以内

## [ 変更後 ]

削除

## 【 申請者による変更理由 】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

## 【 本文書の取扱いに関するお願い 】

本周知文書は、変更登録内容を防除暦等へ速やかに反映するための情報提供を目的としています。このため、農薬登録日以前においては、インターネット上に掲載する等、変更内容を公開することはお控えください。なお、登録後の掲載は問題ございません。

## 【 本件のお問い合わせ先 】

群馬県農政部技術支援課生産環境室植物防疫係  
齋藤

TEL:027-226-3038

FAX:027-221-8681