

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、令和元年10月9日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22774号	タチガレエースM液剤	ヒドロキシイソキサゾール・メタキシム液剤	三井化学アグロ株式会社
第22899号	ホクサンタチガレエースM液剤	ヒドロキシイソキサゾール・メタキシム液剤	ホクサン株式会社

### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・作物名「稲(箱育苗)」のヒドロキシイソキサゾールを含む農薬の総使用回数を「4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注は2回以内、本田では1回以内)」から「3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注は2回以内)」へ変更する。
- ・作物名「稲(湛水直播)」のヒドロキシイソキサゾールを含む農薬の総使用回数を「2回以内(種もみへの処理は1回以内、本田では1回以内)」から「1回」へ変更する。

#### 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

##### [変更前]

作物名	適用病虫害名 使用目的	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ヒドロキシイソ キサゾールを含む 農薬の総使用 回数	メタキシム及び メタキシムを含む 農薬の総 使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯病 (フザリウム菌) 苗立枯病 (ビシウム菌) ムレ苗防止 根の生育促進 移植時の活着促進	500～ 1000倍	育苗箱 (30×60× 3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り 500mL	は種時 又は 発芽後	1回	土壌 灌注	4回以内 (移植前の 土壌混和 は1回以 内、移植前 の土壌灌 注は2回 以内、本田 では1回 以内)	4回以内 (移植前の 土壌混和は 1回以内、育 苗箱への灌 注は1回以 内、本田では 2回以内)
		1000倍	育苗箱 (30×60× 3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り1 L	は種時				
稲(湛水 直播)	苗腐病 (ビシウム菌)	2.5～ 5倍	乾燥種籾 1kg当り 30mL	は種前		鉄コーテ ィング種 子に吹き 付け処理	2回以内 (種もみへ の処理は1 回以内、本 田では1回 以内)	3回以内(種 もみへの処 理は1回以 内、本田では 2回以内)

[ 変更後 ]

作物名	適用病害虫名 使用目的	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ヒドロキシイソ ゾールを含む 農薬の総使 用回数	メタキシル及びメ タキシムを含 む農薬の総 使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯病 (フザリウム菌) 苗立枯病 (ビシウム菌) ムレ苗防止 根の生育促進 移植時の活着促進	500～ 1000倍	育苗箱 (30×60× 3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り 500mL	は種時 又は 発芽後	1回	土壌 灌注	3回以内 (移植前の 土壌混和 は1回以 内、移植前 の土壌灌 注は2回 以内)	4回以内 (移植前の 土壌混和は 1回以内、育 苗箱への灌 注は1回以 内、本田では 2回以内)
		1000倍	育苗箱 (30×60× 3cm、使用 土壌約5L) 1箱当り1 L	は種時				
稲(湛水 直播)	苗腐病 (ビシウム菌)	2.5～ 5倍	乾燥種粃 1kg当り 30mL	は種前		鉄コーテ ィング種 子に吹き 付け処理	1回	3回以内(種 もみへの処 理は1回以 内、本田では 2回以内)

【 申請者による変更理由 】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【 本件のお問い合わせ先 】

群馬県農政部技術支援課生産環境室植物防疫係  
長澤

TEL:027-226-3038

FAX:027-221-8681