


GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG MẮC PHẢI BỆNH SỞI/ BỆNH SỞI ĐỨC

Để không gây lây nhiễm cho những người xung quanh, hãy hạn chế ra ngoài!



Bệnh đặc biệt dễ bị lây nhiễm đối với những người chưa từng mắc bệnh, hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi tiêm chủng.

Tiêm chủng là mũi tiêm phòng nhằm không bị lây nhiễm bệnh.

Trường hợp tình trạng bệnh trở nên xấu đi, hãy liên lạc tới bệnh viện trước khi đi thăm khám




- Không ra ngoài cho tới khi nhận được kết quả kiểm tra xét nghiệm.
- Hãy tuân thủ theo chỉ thị của bác sĩ khi tới bệnh viện thăm khám.

Trường hợp nghi bị lây nhiễm bệnh, Ban y tế dự phòng sẽ tiến hành xét nghiệm, kiểm tra cụ thể




- Bệnh nhân sẽ được lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu, mẫu dịch tiết tỵ - hầu xét nghiệm.
- Nhằm phòng ngừa lây nhiễm lan rộng, Ban y tế dự phòng sẽ liên hệ để nắm bắt lịch trình di chuyển/ hoạt động của bệnh nhân trong giai đoạn lây nhiễm.
- Thăm hỏi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
- Trong trường hợp cần thiết, bệnh nhân sẽ được giải thích về một số điều cần lưu ý nhằm phòng bệnh.

Sởi thông thường



- Bệnh sởi thông thường có khả năng lây nhiễm tương đối cao.
Loại khẩu trang thông thường được bày bán tại cửa hàng cũng không thể phòng ngừa được khả năng lây nhiễm của bệnh.
- Đối với người không có miễn dịch đối với bệnh sởi thông thường, hầu như sẽ bị phát chứng khi bị lây nhiễm.
- Sau khi hạ sốt cũng có thể gây lây nhiễm cho những người xung quanh trong vòng 3 ngày sau đó.

Sởi Đức



- Đối với phụ nữ đang mang thai bị lây nhiễm, có trường hợp sẽ để lại dị tật, dị chứng cho trẻ ở các bộ phận như mắt, tai, tim.
- Trường hợp bất đắc dĩ khi cần phải gặp gỡ mọi người xung quanh, hãy đeo khẩu trang kín từ mũi tới cằm.
- Sau khi phát chứng, trong khoảng thời gian 1 tuần, bệnh có thể bị lây nhiễm tới những người xung quanh.