


Para aquellos que tienen posibilidad de haber contraído a sarampión o rubéola.

No salir fuera de la casa para no infectar a otras personas



Las personas que nunca han padecido de estas enfermedades o que no tienen administrados las dos dosis de vacunas tienen facilidades de infectarse a estas enfermedades.

Las vacunaciones preventivas son para prevenir las enfermedades.

Cuando se agrabe los síntomas, llamemos al hospital antes de acudir.



- Si hacemos la prueba, en lo posible permanecemos en la casa, hasta que salga el resultado.
- Para las consultas médicas, respetemos las indicaciones de los hospitales.

Si haya sospecha de contagio de la enfermedad, el centro de salud público realizará una prueba minuciosa.




- Se extraerá la muestra de sangre, orina y garganta.
- El centro de salud público le preguntará sobre su actos o movimientos para prevenir la propagación de la epidemia(enfermedades transmisibles de persona a persona).
- Le preguntará sobre su estado de salud, si esta bien o no
- En caso de necesidad, le explicará sobre la vacunación para prevenir la enfermedad.


Sarampión



- El sarampión es muy contagioso. Hay casos que no se puede prevenir la infección, con las mascarillas de venta libre.
- Si una persona que no tiene inmunidad contrae la enfermedad de sarampión, casi a todos les aparecerán los síntomas.
- Tiene posibilidad de infectar a otros, hasta más o menos 3 días después que baje la fiebre.



Rubéola



- En caso que contraigan las mujeres gestantes, existen casos que los hijos puedan sufrir de las deficiencias, como en los ojos, oídos y corazón.
- Si no puede evitar la reunión con algunas personas, use sin falta la mascarilla, cubriendo desde la nariz hasta la barbilla.
- Tiene posibilidad de infectar a otros, hasta más o menos 1 semana después de la aparición de los síntomas.