

## 飼育実験計画書

飼育実験名	高染色性絹糸生産カイコ (改変Fibroin H、 <i>Bombyx mori</i> ) の飼育
実施法人・研究所名	国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 生物機能利用研究部門 群馬県蚕糸技術センター
公表年月日	令和6年8月2日

## 1. 飼育実験の目的、概要

## (1) 目的

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という。）生物機能利用研究部門は、遺伝子組換え技術を用いて、高染色性絹糸を生産するカイコ（以下「遺伝子組換えカイコ」という。）を開発し、群馬県蚕糸技術センター（以下「蚕糸技術センター」という。）とともに実用化に向けた研究を進めてきました。

本飼育実験では、第一種使用等において、遺伝子組換えカイコの交雑種及び原種を養蚕農家に近い環境及び方法で飼育した場合の催青開始後の卵の孵化、稚蚕の飼育過程における生育や行動の特性等を中心に、非遺伝子組換えカイコとの違いの有無を調査するために行います。また、隔離飼育区画で生産した原種の繭については、実験室等に運搬し、第二種使用等において、成虫の行動特性等を調査します。

## (2) 概要

令和6年9月から令和6年11月まで、遺伝子組換えカイコの飼育実験を行います。詳細は以下の通りです。

## 2. 飼育実験に使用する第一種使用規程承認カイコ

## (1) カイコの名称

高染色性絹糸生産カイコ（改変Fibroin H、*Bombyx mori*）（GCS500、GCS508、中515号×GCS500、中517号×GCS508）

## (2) 第一種使用規程の承認取得年月日等

令和5年7月13日に第一種使用規程（隔離飼育区画における①催青処理開始後の卵の保管、運搬及び孵化、②幼虫の飼育（孵化直後から繭の形成まで）、③繭の生産、④幼虫及び繭の保管、運搬、不活化処理及び廃棄並びに①から④までに付随する行為）の承認を取得しています。

## 3. 飼育実験の全体実施予定期間、飼育開始予定期期及び飼育終了予定期期等

## (1) 全体実施予定期間

令和6年9月～令和6年11月

## (2) 飼育開始予定期期及び飼育終了予定期期等

令和6年9月上旬 隔離飼育区画での飼育開始

令和6年10月上旬 繭の収穫、残渣等の処理（飼育終了）

令和6年11月上～中旬 残渣等の搬出（残渣不活化終了）

令和7年度は、令和6年度の飼育実験の結果等を踏まえて、飼育を行うかどうか

及びその規模を判断します。

#### 4. 飼育実験を実施する区画（隔離飼育区画）の面積及び位置（蚕糸技術センター内等の区画配置関係）

##### （1）第一種使用規程承認カイコの飼育規模

ア 隔離飼育区画の面積：1,700 m<sup>2</sup>（図1）

イ 蚕室の面積：パイプハウス蚕室 285m<sup>2</sup>、プレハブ蚕室 224m<sup>2</sup>（図1）

ウ 飼育頭数：各蚕室とも、最大で遺伝子組換えカイコ約1,000頭、対照とする非遺伝子組換えカイコ約1,000頭を飼育予定

##### （2）隔離飼育区画の位置

群馬県蚕糸技術センター（図2、3）

群馬県前橋市総社町総社2326番地2

#### 5. 近縁野生種との交雑防止措置に関する事項

##### （1）交雑防止措置の内容

隔離飼育区画（図3）の周囲には、カイコと交雑可能な近縁野生種としてクワコ（*Bombyx mandarina*）が生息していますが、第一種使用規程及び付随する作業要領に従って、以下のように、遺伝子組換えカイコとクワコとの交雑を防止します。

- ア 遺伝子組換えカイコは、成虫が生じる前の繭の段階で収穫して不活化します。原種の繭は実験室等に運搬します。
- イ クワコ成虫の侵入を防止するため、パイプハウス蚕室（図4）の内側全体と、プレハブ蚕室（図5）の開閉可能な窓、戸（出入り口を除く）及び換気口に4mm目以下の網を張ります。
- ウ 飼育終了後に残るクワの枝等の残渣は、蚕室内で遺伝子組換えカイコを取り除いた上で、隔離飼育区画内の残渣処理室（図6）で4mm目以下の網を掛けて30日間以上保管します。

##### （2）モニタリングの内容

隔離飼育区画の四隅の外側に、カイコのメス成虫又は合成した性フェロモン（ボンビコール）を誘引源として粘着板で捕獲するフェロモントラップを設置し、クワコのオス成虫を捕獲します。実施時期は、隔離飼育試験を開始する9月上旬からクワコの発生時期が終了する12月中旬までとし、実施年は、交雑個体が生じた場合に直ちに成虫まで成長する可能性と卵で越冬して翌年に成虫が生じる可能性とを考慮して、本飼育実験の実施年及びその翌年（5月～12月）とします。捕獲したクワコ成虫が、本遺伝子組換えカイコが野生のクワコと交雑して、外部形態からカイコとの交雑第一代であると考えられた個体については、改変*Fibroin H*遺伝子の有無をPCR法又はサザンハイブリダイゼーション法により検定します。

#### 6. 研究所等の内での収穫物、実験材料への混入防止措置

- ①遺伝子組換えカイコの卵や幼虫を、稚蚕（若齢幼虫）飼育施設から隔離飼育区画に搬入する際には、蓋を固定すること等により幼虫が逸出しない構造の容器に入れて運搬します。
- ②幼虫の蚕室では専用の作業着及び履物を着用するとともに、蚕室から退出する際及び隔離飼育区画から退出する際は、衣服等にカイコが付着していないこと

を確認します。

- ③隔離飼育区画内で使用した機械や器具は、作業終了後、カイコが付着していないことを確認します。
- ④収穫した繭（蛹）は、蓋を固定すること等により繭がこぼれ落ちない構造の容器に入れ、不活化のための施設または調査のための実験室等に運搬します。

## 7. 飼育実験終了後の第一種使用規程承認カイコの処理方法

- ①産卵調査等に係る交配試験に用いる原種の繭については、実験室等に運搬した後、羽化・産卵させ、行動や特性等の調査に使用します。
- ②飼育終了後に残るクワの枝等の残渣は、隔離飼育区画内の残渣処理室（図6）で4mm目以下の網を掛けて30日間以上保管することにより不活化します。

## 8. 飼育実験に係る情報提供に関する事項

- ①飼育実験を開始する前の情報提供等

群馬県及び前橋市へ情報提供を行います。今後も飼育実験の詳細について情報提供を行います。

- ②説明会等の計画

令和6年 8月 2日 計画書の公表

令和6年 8月 22日 飼育実験に係る説明会

場所：群馬県蚕糸技術センター

- ③その他の情報提供

飼育実験の実施状況については、

農研機構ウェブページ (<https://www.naro.affrc.go.jp/>) 及び

蚕糸技術センターウェブページ (<https://www.pref.gunma.jp/soshiki/140/>)

で情報提供を行います。

- ④本飼育実験に係る連絡先

農研機構・生物機能利用研究部門研究推進部 研究推進室

電話番号 029-838-6005

群馬県蚕糸技術センター

電話番号 027-251-5145

## 9. その他の必要な事項

特になし。

(参考)

- ・今回、飼育実験を行う遺伝子組換えカイコは、カイコの絹タンパク質であるフィブロインH鎖タンパク質のアミノ酸配列の一部を置換した改変*Fibroin H*遺伝子を導入したカイコで、高染色性の絹糸を生産します。また、選抜マーカーとして、オランクラゲ (*Aequorea victoria*) の緑色蛍光タンパク質 (GFP) を眼で発現する遺伝子が導入されています。
- ・カイコは高度に家畜化された昆虫で、餌がなくても幼虫が逃げずに待っているなど、人が管理しないと生きていけません。また、これまで全国各地で行った調査において、野生のクワコ集団にカイコとクワコの交雑個体は確認されていません。このような特性を持つカイコですが、施設への網張りや残渣の不活化処理などで、交雑を確実に防ぐこととしています。




図1 隔離飼育区画

- : 隔離飼育区画（フェンスとプレハブ蚕室の壁で囲まれている）
- : フェンス（高さ 1.8 m）
- : モニタリング用トラップの設置場所



図2 蚕糸技術センター周辺の地形図 (Google マップより)  
赤く囲んだところが蚕糸技術センターの敷地



図3 群馬県蚕糸技術センター内配置図  
赤く囲んだところが隔離飼育区画



図4 パイプハウス蚕室



図5 プレハブ蚕室



図6 残渣処理室