·旦出现食物过敏症状···

如出现紧急症状,请立即呼叫救护车3)4)。

高度紧急的过敏症状

【全身症状】

- 口 浑身乏力
- □ 意识朦胧
- □ 漏尿或漏便
- □ 难以摸到脉搏 或脉搏不规律
- □ 嘴唇或指甲泛白

【呼吸道症状】

- □ 喉咙或胸部发紧
- □ 声音嘶哑
- 口 犬吠样咳嗽
- 口 呼吸困难
- □ 持续剧烈咳嗽 □ 呼吸急促
 - (包含无法与哮喘发作加以区别的情况)



如符合其中任一种情况

- 1. 立即使用 EpiPen®
- 2. 呼叫救护车 (拨打 119)
- 3. 就地休息
- 4. 就地等待急救
- 5. 如条件允许服用内服药
- ◆如使用EpiPen®10-15分钟后症状仍未改善,再使用一支EpiPen® (如有两支以上时)
- ◆如呼吸或心跳停止,使用自动体外除颤器(AED)或进行心肺复苏。

※EpiPen®:自行注射式肾上腺素,用于过敏性休克等。

监修: 社会福祉法人希望之家附属北关东过敏研究所 所长 荒川浩一

公益社团法人群马具医师会

发行: 群马县健康福祉部 食品・生活卫生课(2025年2月)

371-8570 群马县前桥市大手町 1-1-1

☎027-226-2424 shokuseika@pref.gunma.lg.jp

出处: 1) "外出就餐或购买预制食品时的应注意事项(2023年3月)"(消费者厅) (https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy)

- 2) "食物过敏宣传页" (消费者厅) (https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets)
- 3) "在与食物过敏的顾客交谈时是否曾感到困惑? (2023年3月)" (消费者厅)
- (https://www.caa.go.jp/policies/policy/food labeling/food sanitation/allergy) 4) "食物过敏应急手册" (东京都)
- (https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/allergy/pdf/zenbun1.pdf)



〈日本 EpiPen® 处方〉

【消化道症状】

□ 反复不断呕吐

(难以忍受的) 腹痛

□ 持续强烈

图: 0.3mg 配方



误食案例 1) 外表看不出来 ...

※店内当面出售的无包装便当或菜品等

有发生。有时甚至会导致严重的过敏性休克。

(过敏食物:鸡蛋、牛奶)

父母给孩子吃了一 口点好的食物后,孩 子出现过敏症状。

酱汁中使用了黄油 和鸡蛋。下单时,包

括家庭菜肴, 没有事 先确认食物中是否用 了讨敏原。



发生意外(误食)的情况时有发生!

本指南将介绍外出就餐或购买预制食品时的应注意事项。

即使是同一家连锁店...

听朋友说,某家连锁店 出售适合过敏体质孩子食 用的汉堡,于是在该连锁 店的另一家餐厅买给孩子 吃,结果孩子出现过敏症

每家餐厅的预防过敏菜 单各不相同,没有向店员 确认就下了单。



(过敏食物:鸡蛋)

このパンフレットは、中国語を話される方のために作成しました。

专为食物过敏患者及其家人提供的

中文版

食物过敏患者外出就餐或购买预制食品※时

外出就餐或购买预制食品,有时难以获得与食物过敏相关的完整信息。由于信息

错误或信息不充分等原因,可能误食含有致敏食物(过敏原)的食品,此类事故时

県

请提前告知食物过敏的情况

如您患有食物过敏症, 请在外出就餐或购买预制食品时在以下相应的象形图案中 标注出,或在□内打勾☑,以便告知店内工作人员您的食物过敏情况2)。

私は食物アレルギーです。



※ 上述之外的过敏原也可能导致食物过敏。

外出就餐或购买预制食品时,供应方不具有提供食物过敏相关信息的义务。部分 门店会主动提供此类信息,但应注意的是,门店提供的信息并不总是正确、最新的1)。

外出就餐或购买预制食品时的注意事项

「回向熟悉食物过敏的负责人确认相关」 信息

☑ 享用在外就餐及预制食品时,要有 自己对误食负责的清晰意识。



注意无意中混入的致敏食物!

在同时准备数道菜时, 致敏食物(过敏原)可能会无意中混入本应适合过敏体质 的菜品中。

即使是微量的混入也可能造成严重的症状,因此要确保对烹调用具、食物夹等的 区分使用或彻底清洗。

