


Para quem pode ter contraído sarampo ou rubéola

Não saia de casa para não infectar outras pessoas



As pessoas que nunca tiveram essas doenças ou que não tomaram duas doses de vacinas têm maior probabilidade de serem infectadas por essas doenças.

As vacinas preventivas são para prevenir doenças.



Quando os sintomas se tornarem graves, ligue primeiro antes de ir para o hospital.

- Até que o diagnóstico seja feito, não saia e evite encontrar pessoas o máximo possível.
- Ao receber consultas médicas, siga as instruções dos hospitais.

Se houver suspeita de contágio da doença, o centro de saúde pública realizará exames detalhados.



- Vamos colher amostras de seu sangue, urina e garganta.
- O centro de saúde pública irá perguntar-lhe sobre as suas ações ou movimentos para evitar a propagação da epidemia (doenças transmissíveis de pessoa para pessoa).
- Vamos perguntar sobre seu estado de saúde, se você está bem ou não.
- Se for necessário, explicaremos sobre a vacinação para prevenir a doença.

Sarampo




- O sarampo é muito contagioso.

Você não pode evitar a infecção somente com máscaras de venda livre.



- Quando a doença é transmitida para pessoas que não têm imunidade ao sarampo, os sintomas ocorrem em todos.



- Há uma chance de infectar outras pessoas, até cerca de 3 dias após a febre diminuir.

Rubéola



- Caso as gestantes sejam infectadas, há casos em que aparecem algumas deficiências nas crianças, como nos olhos, ouvidos e coração.



- Caso não possa evitar encontro com pessoas, use a máscara que cubra do nariz ao queixo.

- Há probabilidade de infectar outras pessoas, cerca de 1 semana após o início dos sintomas.

