目 次

(各項目が該当ページへのリンクとなっています。)

病虫害防除指針

1 1. 飼料作物の部

(1) 飼料用とうもろこし	265
(2) ソルガム	273
(3) いね科牧草	278
(4) まめ科牧草	282
(5) 簡易サイロ・ラップサイロ	285
(稲発酵粗飼料用稲に係る農薬)	286
(飼料として使用する粳米への農薬の使用について)	309
(飼料用とうもろこしの専用除草剤の適用品種一覧)	313

飼料作物－飼料用とうもろこし－殺菌剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						すす 紋 病	
1	チルト乳剤25		普	プロピコナゾール	3	○	

飼料作物－飼料用とうもろこし－殺虫剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病害虫雑草名	
						ア ワ ノ メ イ ガ	ツ マ ジ ロ ク サ ヨ ト ウ
1	エコマスターBT	抑制	普	BT	11A	○	-
2	サブリーナフロアブル	抑制	普	BT	11A	○	-
3	ジャックポット顆粒水和剤	抑制	普	BT	11A	○	○
4	デルフィン顆粒水和剤	抑制	普	BT	11A	-	○
5	トアロー水和剤CT		普	BT	11A	○	-
6	パダンSG水溶剤	抑制	劇	カルタップ	14	○	○

飼料作物－飼料用とうもろこし(子実)－殺虫剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名			
						タマナヤガ	ネキリムシ類	アワノメイガ	オオタバコガ
1	ダイアジノン粒剤5		普	ダイアジノン	1B	○	○	-	-
2	プレバソンフロアブル5	抑制	普	クロラントラニリプロール	28	-	-	○	○

飼料作物－飼料用とうもろこし(青刈り)－殺虫剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						タマナヤガ
1	ダイアジノン粒剤5		普	ダイアジノン	1B	○

飼料作物－飼料用とうもろこし－その他

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名						
						カラス	キジ	キジバト	スズメ	ハト	ムクドリ	苗立枯病
1	キヒゲンR-2フロアブル		普	チウラム	F:M3	○	○	○	○	○	○	○

11-(1) 飼料用とうもろこし

病害虫防除

病害虫名	防除方法	参考事項
すす紋病	は種前 1. 抵抗性品種を栽培する。 2. 連作を避ける。 3. 夏期以降に発生しやすいので、遅播きを避ける。 4. ほ場の排水性を改善する。 5. 窒素、カリを中心とした十分な施肥管理。 生育期 発病初期に適用薬剤を散布する。 収穫後 収穫残さを除去、またはすき込みを行う。	<ul style="list-style-type: none"> 冷涼地での代表的な葉枯性の糸状菌病で、冷涼多湿条件で発生が増加し、大発生するとほ場全体が枯れ上がるほどの被害が出る。 葉に黄褐色～灰色、紡錘型、長さ3～10 cmの大型病斑を形成する。 絹糸抽出期以降に発生することが多い。
ごま葉枯病	は種前 1. 連作を避ける。 2. 深耕を行い堆肥、リン酸肥料を増肥する。 3. 未熟堆肥の多投を避け、熟度の進んだ堆肥を施用する。 4. 早播きによる早期収穫を行う。 5. 抵抗性品種を栽培する。 生育期 肥料切れを避ける。 収穫後 収穫残さを除去する。	<ul style="list-style-type: none"> 葉及び葉鞘にオレンジ色～黄褐色、楕円形、長さ5～20 mm、幅2～5 mm程度の病斑を多数形成する。 多湿な暖地において夏期以降に多発する。 肥料切れや密植は発病を助長する。
根腐病	は種前 1. ほ場の排水性を改善する(停滞水に注意)。 2. 未熟堆肥の多投を避け、熟度の進んだ堆肥を施用する。 3. 早播きによる早期収穫を行う。 4. 連作を避ける。 5. 抵抗性品種を栽培する。 生育期 被害株は速やかに切り取って焼却する。	<ul style="list-style-type: none"> 根が褐変し、黄熟期を過ぎると一気に枯れ上がり、全体が黄色くなる。 雌穂が垂れ下がるのが特徴。 イネ科の作物及び雑草に寄生し、感染源となる。
苗立枯病	は種前 1. ほ場の排水性を改善する(停滞水に注意)。 2. 種子に薬剤の塗沫処理を行う。 3. 低温条件下で発芽させないため、は種を遅らせる。	<ul style="list-style-type: none"> 出芽時の多湿条件で苗が枯死する。 3～4葉期の幼苗期までに萎凋枯死することが多い。
モザイク病	は種前 ウイルス伝搬源のアブラムシの繁殖を防ぐため雑草を早春に除去する。	<ul style="list-style-type: none"> ウイルスに感染した畦畔雑草が伝染源となり、アブラムシ類によって媒介される。 まれに種子伝染により発生する。
黒穂病	は種前 1. 多発した場合には3年以上の長期輪作を行う。 2. 窒素肥料の多投入を避ける。 3. 抵抗性品種を栽培する。 生育期 発病部位を見つけたら胞子が飛散しないうちに除去し、適正に処分(焼却)する。罹病個体を堆肥化しない。	<ul style="list-style-type: none"> 外部は白色で中に黒い粉の詰まったゴール(肥大組織)を形成し、葉・節・穂に発生する。 地面に落下し、土壤中で越冬した胞子が翌年の伝染源となる。ゴールが成熟し、破れて空中に飛散した胞子が二次伝染源となる。 感染は湿潤条件下で多い。

病害虫名	防除方法	参考事項
紋枯病	は種前 1. 深耕を行い感染源を埋没させる。 2. 密植を避ける。 生育期 発生した葉鞘を剥離する。	<ul style="list-style-type: none"> ・高温多湿で発生しやすい。 ・病気が進むと表面が滑らかで褐色の菌核をつくり、地面に落下して翌年の感染源となる。 ・周縁部褐色、中心部灰白色の雲形斑を形成する。
タマナヤガ (ネキリムシ)	は種前 1. 秋期に雑草の防除を行う。 2. 初期生育の早い品種を栽培する。 発生初期 薬剤散布はは種後1ヵ月以内に行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・発芽の不揃いや幼苗の萎れは発生の可能性を考える。 ・発生後の被害株の根本に幼虫が潜んでいるので早期に発見して駆除する。
アワノメイガ	は種前 早まきによる早期収穫を行う。 発生時 適用薬剤を散布する。	<ul style="list-style-type: none"> ・関東地方では年2~3回発生する。 ・は種期が遅いと被害が多い。 ・幼虫の食害部はカビが侵入しやすくなるのでかび毒蓄積や汚粒発生等の品質低下を招く。
ツマジロクサヨトウ	生育期 定期的にはほ場を巡回し、早期発見に努める。 発生時 1. 適用薬剤を散布する。 2. 収穫可能な場合は直ちに収穫・調製を行う。 収穫後 発生ほ場の土壌中にはさなぎが残存している可能性があるため、刈り取り後は速やかに耕起して残存害虫を駆除する(複数回が望ましい)。	<ul style="list-style-type: none"> ・薬剤を散布するときは、幼虫の活動が活発になる早朝に、散布することが望ましい。 ・幼虫は軟らかい葉を好んで食害する傾向があるため、特に生育初期は注意する。 ・とうもろこし、ソルガム、野菜類など広く農作物を食害し、生育初期の食害では被害が甚大になるため、特に注意して発見に努める。
鳥害防止 (カラス、キジ、ハト、キジバト、スズメ、ムクドリ)	は種前 種子に薬剤の塗沫処理または粉衣を行う。	

雑草防除

- ・ 碎土、整地は丁寧に行い、種子が露出しないように覆土はできるだけ丁寧に行う。
- ・ 散布薬剤の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないように十分注意して散布する。
- ・ 周辺の作物や構造物等にかからないように注意する。
- ・ 皮膚に付着しないように注意する。付着した場合には、直ちに石けんを使用し水で良く洗い流す。
- ・ 使用后、タンク、ホース、ブーム、ノズル内に薬液が残らないよう散布器具等はよく洗浄し、他の用途に使用する場合は、十分に注意する。

除草剤名	適用雑草	使用方法 (適用土壌)	使用時期	使用上の注意
アルファード液剤	一年生雑草	雑草茎葉散布 又は全面散布	とうもろこし 3 ～7 葉期(但し、 収穫 45 日前ま で)	<ul style="list-style-type: none"> ・ イヌホオズキ、シロザ、イチビ、オオブタクサなどの問題雑草に卓効を示す。 ・ 飼料用とうもろこしの各品種に影響が少なく高い選択性がある。 ・ 散布時の展開葉に薬害(黄斑)を生じる場合があるが、その後の生育・収量には影響しない。 ・ 雑草生育期に有効だが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣ることがあるので、時期を逸しないよう均一に散布する。 ・ 散布直後の降雨は効果を低下させるため、天候に注意して散布する。
エコトップP乳剤	一年生雑草	全面土壌散布 (砂土を除く全 土壌)	は種後出芽前 (雑草発生前)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発芽後の雑草に対しては効果が劣るので、雑草発生前に時期を逸しないように散布する。 ・ 碎土、整地及び覆土は丁寧に行う。覆土深は2～3 cm以上とする。 ・ 散布直後の多量の降雨は薬害を生じるおそれがあるため天候に注意して散布する。 ・ 蚕に対して毒性があるため、周辺の桑葉にかからないよう注意する。 ・ 砂土では使用しない。
ゲザノンゴールド	一年生雑草	全面土壌散布	マルチ前・は種 前(雑草発生前) は種後発芽前 (雑草発生前) 生育期(とうも ろこし 2～4 葉 期)	<ul style="list-style-type: none"> ・ イチビ、アレチウリ、ヨウシュチョウセンアサガオなど強害帰化雑草にも有効である。 ・ 碎土、整地及び覆土は丁寧に行う。 ・ は種後、乾燥が続くと予想される場合は、除草効果が安定する生育期(とうもろこし 2～4 葉期)に散布する。 ・ イチビの防除を行う場合には、所定量の範囲内で多めの薬量を散布する。 ・ 土壌が極端に乾燥している場合、所定量の範囲内で散水量を多めにして丁寧に散布する。 ・ 極端な過湿土壌及び砂質土壌で使用する場合には、生育を抑えることがあるので少なめの薬量を散布する。 ・ 砂土では使用しない。 ・ 蚕に対して影響があるため、周辺の桑葉にかからないよう注意する。 ・ 当年及び翌年の水稻栽培をさける。

各論作成日:2024年11月1日 必ずラベルを確認してから農薬を使用してください。

除草剤名	適用雑草	使用方法 (適用土壌)	使用時期	使用上の注意
ゲザプリムフロアブル	一年生雑草	全面土壌散布 及び雑草茎葉 散布 (砂土を除く全 土壌)	は種後～とうも ろこし2～4葉期 まで	<ul style="list-style-type: none"> 畑作一年生雑草全般、ツクサには特に土壌処理で効果が大きい。 茎葉部からの吸収も一部みられ、幼少雑草に対しても効果を発揮するが、雑草の発芽直前から発芽揃期までの散布が最も効果が高いので、できるだけ早めに散布する。 イネ科雑草には効果が不十分な場合があるので、それらが優先するほ場での使用は避ける。 多年生・深根性の雑草には効果が期待出来ない。 覆土は丁寧に行い、覆土深は3cm程度にする。 砂土、水はけのよい土壌では薬害を生じる恐れがあるので使用しない。また雨の多い時期、場所での使用は避ける。 蚕に対して影響があるため、周辺の桑葉にかからないよう注意する。 本剤処理後、短期間内に後作物を作付する場合、後作物に影響をあたえることがあるので、予め発芽試験を行う等安全性を確認してから作付する。
ゴーゴーサン 細粒剤F	一年生雑草	全面土壌散布	は種後出芽前 (雑草発生前)	<ul style="list-style-type: none"> 雑草の発生前～発芽時に有効であるが、雑草の生育が進むと急激に効果が低下するので、使用時期を逸しないように散布する。 イネ科及び広葉の一年生雑草に効果があるが、キク科雑草とツクサには効果が劣るので、これらの雑草の優先ほ場では使用しない。 土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、土壌が適度の水分を含んでいるときに散布する。 砕土、整地及び覆土は丁寧に行う。覆土深は2～3cm以上とする。 激しい降雨が予想される時には使用を避ける。 砂土では使用しない。
ゴーゴーサン 乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種後出芽前 (雑草発生前)	<ul style="list-style-type: none"> 雑草の発生前～発芽時に有効であるが、雑草の生育が進むと急激に効果が低下するので、使用時期を逸しないように散布する。 イネ科及び広葉の一年生雑草に効果があるが、キク科雑草とツクサには効果が劣るので、これらの雑草の優先ほ場では使用しない。 土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、希釈水の量を多めにするか降雨後に散布する。 砕土、整地及び覆土は丁寧に行う。 激しい降雨が予想される時には使用を避ける。 桑にかからないよう注意する。 砂土では使用しない。
シャドー水和 剤	一年生及び多 年生広葉雑草 キクイモ	雑草茎葉散布 又は全面散布	一年生及び多年 生広葉雑草2～5 葉期(とうも ろこし3～5葉期) キクイモ生育期 (とうもろこし5 葉期)	<ul style="list-style-type: none"> 防除が困難な強害雑草のイチビ・シヨクヨウガヤツリ(キハマスゲ)・キクイモに高い効果を有する。 生育初期のキクイモに対しては効果が劣ることがある。 イネ科雑草に効果が期待できないので、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用する。 有機リン系殺虫剤との混用及び7日以内の近接散布は、薬害を生じることがあるので避ける。 散布数日後、一時的に縞状の退色、生育抑制を生じる場合があるが、その後の生育に影響はない。 散布直後の降雨によって薬害を生じるおそれがあるので、天候に注意して散布する。

除草剤名	適用雑草	使用方法 (適用土壌)	使用時期	使用上の注意
タッチダウン i Q	一年生雑草	雑草茎葉散布	は種後出芽前 (雑草生育期)	<ul style="list-style-type: none"> 雑草の種類や大きさ、発生密度によって適正な薬量が異なるので、その程度に応じて所定量の範囲内で適宜薬量を増減する。 散布後、効果の発現までに一年生雑草では2~4日、多年生雑草では1~2週間を要するので、その間に刈り取らないようにする。 多年生雑草を地上部及び地下部まで含めて枯殺するには、雑草の生育盛期から生育終期又は開花期前までに散布する。 スギナの防除の際は、スギナが生育盛期を過ぎた時期及びスギナが他雑草に埋没している条件での散布は効果が劣ることがあるので、適期に注意して散布する。 激しい降雨が予想される場合は使用を避ける。
デュアルゴ ールド	一年生雑草 一年生イネ科 雑草	全面土壌散布	は種後出芽前 (雑草発生前) 本葉 1~2 葉期 (イネ科雑草 2 葉 期まで)	<ul style="list-style-type: none"> 雑草の発生前に散布する。 広葉雑草(特にアカザ科)が混在する場合は、それらに有効な除草剤と体系防除する。 砕土、整地及び覆土は丁寧に行う。 土壌が極端に乾燥している場合には、除草効果が劣ることがあるので、所定量の範囲内で散布水量を多めにして丁寧に散布する。 砂土では使用しない。 水稲に薬害を生じるおそれがあるため、当年または翌年の水稲栽培をさける。
バサグラン液 剤(ナトリウム 塩)	一年生雑草 (イネ科を除 く)	雑草茎葉散布 又は全面散布	生育期 (但し、収穫 50 日前まで)	<ul style="list-style-type: none"> イネ科雑草には効果がないため、イネ科雑草が優先するほ場での使用は控える。イネ科雑草が混在する場合はこれらに有効な除草剤との体系で使用する。 散布後、曇天、降雨日が長く続くと効果が劣ることがあるため、晴天時に散布する。 高温条件化では、薬害を生じやすいので異常高温化での散布は避ける。 重複散布は薬害のおそれがあるため避ける。
フィールドス ターP乳剤	一年生雑草 (アカザ科、 アブラナ科、 タデ科を除 く) 一年生イネ科 雑草	全面土壌散布	は種後出芽前 (雑草発生前) とうもろこし出 芽直前~2 葉期 (イネ科雑草 2 葉期まで)	<ul style="list-style-type: none"> 発芽後の雑草に対しては効果が劣るので、必ず雑草の発生前に時期を逸しないように散布する。 アカザ科、タデ科、アブラナ科などの一部広葉雑草には効果が劣るので、これらの広葉雑草の混在するほ場では、広葉雑草に有効な除草剤との体系で使用する。 散布直後の多量の降雨は薬害のおそれがあるため、天候を見きわめて散布する。 砕土、整地及び覆土は丁寧に行う。覆土深は2~3 cm以上とする。 砂土では使用しない。
ブルーシアフ ロアブル	一年生雑草	雑草茎葉散布 又は全面散布 無人航空機に よる散布	とうもろこし 3 ~5 葉期(但し、 収穫 45 日前ま で) とうもろこし 6 ~7 葉期(但し、 収穫 45 日前ま で) とうもろこし 3 ~7 葉期(但し、 収穫 45 日前ま で)	<ul style="list-style-type: none"> 一年生イネ科雑草、および一年生広葉雑草と幅広い草種に効果を発揮し、イチビ、イヌホオズキにも優れた効果を示す。 散布後一時的にクロロシス症状を生じることがあるが、その後の生育、収量には影響しない。 雑草生育期に有効だが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣ることがあるので、時期を逸しないよう均一に散布する。 散布後6時間以内の降雨は効果を低下させる。

除草剤名	適用雑草	使用方法 (適用土壌)	使用時期	使用上の注意
モーティブ乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種後～とうもろこし2葉期 (イネ科雑草2葉期まで)	<ul style="list-style-type: none"> ・雑草の生育が進むと効果が劣るので、使用時期を逸しないように散布する。 ・砕土、整地及び覆土は丁寧に行う。覆土深は2～3 cm以上とする。 ・激しい降雨が予想される時には使用を避ける。 ・砂土では使用しない。
ラウンドアップマックスロード	一年生及び多年生雑草	雑草茎葉散布	飼料用とうもろこし出芽前まで (雑草生育期)	<ul style="list-style-type: none"> ・吸収移行型の除草剤で非選択的にほとんどすべての一年生、越年生、多年生草本及び木本植物に作用する。 ・多年生雑草の中には、散布年には効果の発現が少なく、翌年の再生時期になって枯殺効果がわかるものがある。 ・散布時の雑草の草丈や茎葉面積が大きい程、効果が確実となるので、散布前に雑草の地上部を刈り払わない。 ・通常2～7日で効果が発現し、効果完成までさらに日数を要するので、誤って再散布しない。 ・スギナ防除に際しては、スギナが他雑草の中に埋没しているような条件の散布では効果が劣ることがあるので、スギナにかかるように注意して散布する。 ・一年生広葉雑草、または多年生雑草のうちススキ、セイタカアワダチソウ等を主対象に使用する場合、もしくは生育の進んだマルバツユクサに使用する場合、所定量の範囲内で多めの薬量を使用する。 ・処理後1時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候を良く見極めてから散布する。 ・少量散布の場合は、専用のノズルを用いて雑草木の葉面に均一に散布する。 ・出芽後に散布すると薬害を生じる恐れがあるので、必ず出芽前に散布する。
ラッソー乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種後出芽前	<ul style="list-style-type: none"> ・土壌処理剤のため、雑草の発生前に使用する。 ・イネ科雑草には卓効だが、タデ科、アカザ科などの広葉雑草には効果が劣る。 ・砕土、整地は丁寧に行い、は種後の鎮圧も行うようにする。 ・有機物を多く含む土壌や粘質土では所定量の範囲内で多めの薬量を散布する。
ワンホープ乳剤	一年生雑草 多年生イネ科雑草	雑草茎葉散布 又は全面散布	とうもろこし3～5葉期 但し、収穫30日前まで	<ul style="list-style-type: none"> ・剤への適用品種に使用する。「2024年度ワンホープ乳剤の適用品種一覧」参照 ・一年生イネ科雑草から一年生広葉雑草、さらにシバムギ、レッドトップなどの多年生イネ科雑草まで対象とする。特に生育期のイネ科雑草をしっかり防除できる。 ・有機リン系殺虫剤との混用および7日以内の近接散布は、薬害を生じることがあるので避ける。 ・散布数日後、一時的に退色および生育抑制を生じることがあるが、その後の生育・収量には影響しない。 ・散布直後の降雨は、効果を低下させるので、天候に注意して散布する。

飼料作物ーソルガムー殺虫剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名	
						アブラムシ類	ツマジロクサヨトウ
1	オルトラン水和剤		普	アセフェート	1B	○	○
2	モスピラン顆粒水溶剤	抑制	劇	アセタミプリド	4A	○	-

飼料作物ーソルガムーその他

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名					
						カラス	キジ	キジバト	スズメ	ハト	ムクドリ
1	キヒゲンRー2フロアブル		普	チウラム	-	○	○	○	○	○	○

11-(2) ソルガム

病虫害防除

病虫害名	防除方法	参考事項
紫斑点病	は種前 1. 抵抗性品種を栽培する。 2. 早まきによる早期収穫を行う。 収穫時 刈り遅れしない。 収穫後 収穫残さを除去する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 梅雨時期から発生し始め、夏から秋にかけて最もまん延する。 ・ 赤紫色、楕円形、長さ5~20mm、幅3~10mmの病斑を多数形成する。
ツマジロクサヨトウ	生育期 定期的にはほ場を巡回し、早期発見に努める。 発生時 1. 適用薬剤を散布する。 2. 収穫可能な場合は直ちに収穫・調製を行う。 収穫後 発生ほ場の土壌中にはさなぎが残存している可能性があるため、刈り取り後は速やかに耕起して残存害虫を駆除する（複数回が望ましい）。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 薬剤を散布するときは、幼虫の活動が活発になる早朝に、散布することが望ましい。 ・ 幼虫は軟らかい葉を好んで食害する傾向があるため、特に生育初期は注意する。 ・ とうもろこし、ソルガム、野菜類など広く農作物を食害し、生育初期の食害では被害が甚大になるため、特に注意して発見に努める。
鳥害防止 (カラス、キジ、キジバト、スズメ、ハト、ムクドリ)	は種前 種子に薬剤塗沫処理を行う。	

雑草防除

- ・ 碎土、整地は丁寧に行い、種子が露出しないように覆土はできるだけ丁寧に行う。
- ・ 散布薬剤の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないように十分注意して散布する。
- ・ 周辺の作物や構造物等にかからないように注意する。
- ・ 皮膚に付着しないように注意する。付着した場合には直ちに石けんを使用し水で良く洗い流す。
- ・ 使用後、タンク、ホース、ブーム、ノズル内に薬液が残らないよう散布器具等はよく洗浄し、他の用途に使用する場合は、十分に注意する。

除草剤名	適用雑草	使用方法 (適用土壌)	使用時期	使用上の注意
ゲザノンゴールド	一年生雑草	全面土壌散布	は種直後	<ul style="list-style-type: none"> ・ イチビ、アレチウリ、ヨウシュチヨウセンアサガオなど強害帰化雑草にも有効である。 ・ 碎土、整地及び覆土は丁寧に行う。 ・ イチビの防除を行う場合には、所定量の範囲内で多めの薬量を散布する。 ・ ソルガムに使用する場合、次のような条件下では出芽抑制及び生育抑制等の薬害を生じる恐れがあるため、使用を避ける。 土壌の種類：過湿土壌及び砂質土壌 生育ステージ：出芽直前 ・ 散布直前に降雨があった場合、また、散布直後に降雨が予想される場合は使用を避ける。 ・ 砂土では使用しない。 ・ 蚕に対して影響があるため、周辺の桑葉にかからないよう注意する。 ・ 水稻に薬害を生じるおそれがあるため、当年及び翌年の水稻栽培をさける。
ゲザプリムフロアブル	一年生広葉雑草	全面土壌散布及び雑草茎葉散布(砂土を除く全土壌)	は種後雑草発生前～始期	<ul style="list-style-type: none"> ・ 畑作一年生雑草全般、ツククサには特に土壌処理で効果が大きい。 ・ 茎葉部からの吸収も一部みられ、幼少雑草に対しても効果を発揮するが、雑草の発芽直前から発芽前期までの散布が最も効果が高いので、できるだけ早めに散布する。 ・ 砂土、水はけのよい土壌では薬害を生じる恐れがあるので使用しない。また雨の多い時期、場所での使用は避ける。 ・ 覆土は丁寧に行い、覆土深は3 cm程度にする。 ・ 多年性、深根性雑草には効果が期待できない。 ・ 本剤処理後、短期間内に後作物を作付する場合、後作物に影響をあたえることがあるので、予め発芽試験を行う等安全性を確認してから作付する。 ・ イネ科雑草には効果が不十分な場合があるので、それらが優先するほ場での使用は避ける。 ・ 蚕に対して影響があるため、周辺の桑葉にかからないよう注意する。
ゴーゴーサン細粒剤F	一年生雑草	全面土壌散布	は種後出芽前(雑草発生前)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 雑草の発生前～発芽時に有効であるが、雑草の生育が進むと急激に効果が低下するので、使用時期を逸しないように散布する。 ・ イネ科及び広葉の一年生雑草に効果があるが、キク科雑草とツククサには効果が劣るので、これらの雑草の優先ほ場では使用しない。 ・ 土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、土壌が適度の水分を含んでいる時に散布する。 ・ 碎土、整地及び覆土は丁寧に行う。 ・ 覆土深は3 cm以上とする。また、散播では使用しない。 ・ 激しい降雨が予想される時には使用を避ける。 ・ 砂土では使用しない。

除草剤名	適用雑草	使用方法 (適用土壌)	使用時期	使用上の注意
ゴーゴーサン 乳剤	一年生雑草	全面土壌散布 雑草茎葉散布 又は全面土壌 散布	は種後出芽前 (雑草発生前) ソルガム3葉期 (雑草発生前～ 発生始期)	<ul style="list-style-type: none"> 雑草の発生前～発芽時に有効であるが、雑草の生育が進むと急激に効果が低下するので、使用時期を逸しないように散布する。 イネ科及び広葉の一年生雑草に効果があるが、キク科雑草とツクサには効果が劣るので、これらの雑草の優先ほ場では使用しない。 土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、希釈水の量を多めにするか降雨後に散布する。 碎土、整地及び覆土は丁寧に行う。 覆土深は3cm以上とする。また、散播では使用しない。 激しい降雨が予想される時には使用を避ける。 桑にかからないよう注意する。 砂土では使用しない。
バサグラン液 剤(ナトリウム 塩)	一年生雑草 (イネ科を除く)	雑草茎葉散布 又は全面散布	生育期 (但し、収穫30日 前まで)	<ul style="list-style-type: none"> イネ科雑草には効果がないため、イネ科雑草が優先するほ場での使用は控える。イネ科雑草が混在する場合はこれらに有効な除草剤との体系で使用する。 散布後、曇天、降雨日が長く続くと効果が劣ることがあるため、晴天時に散布する。 高温条件化では、薬害を生じやすいので異常高温化での散布は避ける。 重複散布は薬害のおそれがあるので避ける。
ラウンドアップ マックスロ ード	一年生雑草	雑草茎葉散布	耕起前又はは種 前まで	<ul style="list-style-type: none"> 吸収移行型の除草剤で非選択的にほとんどすべての一年生、越年生、多年生草本及び木本植物に作用する。 多年生雑草の中には、散布年には効果の発現が少なく、翌年の再生時期になって枯殺効果がわかるものがある。 散布時の雑草の草丈や茎葉面積が大きい程、効果が確実となるので、散布前に雑草の地上部を刈り払わない。 通常2～7日で効果が発現し、効果完成までさらに日数を要するので、誤って再散布しない。 スギナ防除に際しては、スギナが他雑草の中に埋没しているような条件の散布では効果が劣ることがあるので、スギナにかかるように注意して散布する。 一年生広葉雑草、または多年生雑草のうちススキ、セイタカアワダチソウ等を主対象に使用する場合、もしくは生育の進んだマルバツクサに使用する場合、所定量の範囲内で多めの薬量を使用する。 処理後1時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候を良く見極めてから散布する。 少量散布の場合は、専用のノズルを用いて雑草木の葉面に均一に散布する。

除草剤名	適用雑草	使用方法 (適用土壌)	使用時期	使用上の注意
ラッソー乳剤	一年生雑草	全面土壌散布	は種直後(雑草発生前)	<ul style="list-style-type: none"> ・土壌処理剤なので必ず雑草の発生前に使用する。 ・イネ科雑草には卓効だが、タデ科、アカザ科などの広葉雑草に対しては効果が劣る。 ・砕土、整地は丁寧に行い、は種後の鎮圧も行うようにする。 ・有機物を多く含む土壌や粘質土では所定量の範囲内で多めの薬量を散布する。 ・砂質土壌では薬害を生じる恐れがあるので使用は避ける。 ・は種時の覆土は3 cm以上とする。また、散播では使用しない。 ・薬剤処理は土壌表面が乾いた状態で行う。 ・激しい降雨が予想される場合は使用しない。 ・ソルガムは品種が多く、薬剤に対する品種間差もあるため、使用の際には病害虫防除所等関係機関の指導を受ける。
ロロックス	一年生雑草	全面土壌散布	は種直後(雑草発生前)	<ul style="list-style-type: none"> ・イネ科雑草が優先しているところでは、他剤との現地混用又は体系処理が望ましい。 ・処理後土の表層をこわしたり、動かしたりしない。 ・十分にかき混ぜてから均一に散布する。 ・土壌表面が適湿の 때가効果的である。 ・雑草発生前よりも発生直後の方が除草効果は安定する。 ・生育の進んだ雑草には効果が劣る場合があるので、時期を逸しないように散布する。 ・覆土は細かく砕いて均一厚めに行い、砂土では使用しない。 ・激しい降雨が予想される場合は使用しない。 ・蚕に対して影響があるので、桑葉にはかからないようにする。

飼料作物－牧草－いね科牧草－殺菌剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名	
						雪腐 大粒菌核病	
1	トップジンM水和剤		普	チオファネートメチル	1	○	

飼料作物－牧草－いね科牧草－殺虫剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日:2024/11/1

	農薬の名称	群馬県 指定	製剤 毒性	有効成分の種類	作用機構 分類	病虫害雑草名						
						ア ブ ラ ム シ 類	ウ リ ハ ム シ モ ド キ	ウ ン カ 類	ゾ ウ ム シ 類	ヨ コ バ イ 類	ア ワ ヨ ト ウ	ム ギ ダ ニ
1	アルバリン顆粒水溶剤	抑制	普	ジノテフラン	4A	○	-	-	-	-	-	-
2	スミチオン乳剤		普	MEP	1B	○	○	○	○	○	○	○
3	スタークル顆粒水溶剤	抑制	普	ジノテフラン	4A	○	-	-	-	-	-	-
4	モスピラン顆粒水溶剤	抑制	劇	アセタミプリド	4A	○	-	-	-	-	-	-

11-(3) いね科牧草

病害虫防除

病害虫名	防除方法	参考事項
冠さび病	は種前 1. 抵抗性品種を栽培する。 2. 厚播きしない(イタリアンライグラスでは種量は2~3kg/10a)。 収穫期 刈り遅れしない。	<ul style="list-style-type: none"> ・初めは黄色の腫れ物状の病斑であるが、やがて長さ1~2mm、幅0.5mm程度の楕円形病斑となり、表皮が破れて中から黄色~オレンジ色の夏胞子が現れる。
葉腐病	は種前 標準は種量を守り厚播きしない。 生育期 発病が多い場合、一部早刈りして風通しをよくする。 収穫期 刈り遅れしない。 収穫後 刈り取った牧草は速やかに収納する。	<ul style="list-style-type: none"> ・初めは灰緑色、水浸状に葉が変色し、やがてゆでたように軟化する。罹病植物上には、明褐色~褐色、直径5mm程度の菌核が形成される。 ・高温多湿で多発し、雨が続くとまん延する。 ・株間の湿度が高まると激発する。
すじ葉枯病 (条葉枯病)	は種前 抵抗性品種を栽培する。 生育期 肥料切れを避ける。 収穫期 低刈りにし、刈り遅れしない。	<ul style="list-style-type: none"> ・はじめ灰褐色~茶褐色又は紫褐色の楕円形病斑ができ、しだいに葉脈間を縦に伸びて、長さ0.5~4cm、幅1~3mmの線状の病斑を形成する。 ・春秋の多湿時や梅雨期に発生が多い。
雪腐大粒菌核病	根雪前 1. 越冬前の草丈を15cm程度にしておく。 2. 適用薬剤を散布する。 は種時 リン酸肥料を増肥する。	<ul style="list-style-type: none"> ・積雪下の葉や茎が水浸状に枯れ、融雪後乾燥すると漂白したように白くなる。 ・肥料切れは被害を助長する。 ・長期の根雪により多発する。
アブラムシ類	生育期 ほ場の風通しをよくする。 発生時 適用薬剤を散布する。	<ul style="list-style-type: none"> ・4~5月及び初冬(11月頃)に発生する。 ・春先に乾燥が続くと多発する。
ムギダニ	は種前 冬作物として、早生のエンバクを栽培し、年内刈りをする事で発生を抑える。 は種後 1. 畦畔雑草を刈り取る。 2. 生息密度の上昇期に適用薬剤を散布する。	<ul style="list-style-type: none"> ・乾燥時に発生しやすい。 ・深耕(プラウ耕)により生息密度の低下が認められる。 ・曇天の日や夕方以降に葉上に現れるので、防除はこの時に行う。
アワヨトウ	発生時 1. 発生初期に刈り取りを行う。 2. 適用薬剤を散布する。	<ul style="list-style-type: none"> ・暴食性があり、被害が大きい。食痕が不規則な欠刻で残る。 ・発生回数は関東地方で年3~4回とされる。

各論作成日:2024年11月1日 必ずラベルを確認してから農業を使用してください。

雑草防除

- ・ 碎土、整地は丁寧に行い、種子が露出しないように覆土はできるだけ丁寧に行う。
- ・ 散布薬剤の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないように十分注意して散布する。
- ・ 周辺の作物や構造物等にかからないように注意する。
- ・ 皮膚に付着しないように注意する。付着した場合には直ちに石けんを使用し水で良く洗い流す。
- ・ 使用后、タンク、ホース、ブーム、ノズル内に薬液が残らないよう散布器具等はよく洗浄し、他の用途に使用する場合は、十分に注意する。

除草剤名	適用雑草	使用方法 (適用土壌)	使用時期	使用上の注意
バンペルーD 液剤	ギシギシ	雑草茎葉散布	秋期最終刈取後 30日以内	<ul style="list-style-type: none"> ・ いね科牧草では種当年の雑草用には使用しない。 ・ 展着剤を加えて散布するとより効果が増す。 ・ エゾノギシギシの越冬株には薬量を多めにする。 ・ 広葉雑草のうちカタバミには効果が劣るので、それらの優占する所では使用を避ける。 ・ まめ科牧草には薬害を生じるので、まめ科牧草優占草地での使用は避ける。
ハーモニーD F	一年生広葉雑 草 ギシギシ類	雑草茎葉散布 又は全面散布	採草21日前まで (雑草生育期) 採草21日前まで (雑草生育期) 新播草地定着後 (但し、採草21日 前まで)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一番草刈取後(夏処理)から最終番草刈取後(秋処理)まで幅広く使用できる。 ・ 調製した薬剤は速やかに使用する。 ・ ギシギシの葉が展開してから散布する。 ・ 新播草地定着後の散布適期はギシギシ類草丈20cm以下であり、生育の進んだ雑草には効果が劣るので、時期を逸しないように散布する。 ・ 散布後21日間は採草及び放牧を行わない。 ・ タンク内や散布器具に残った薬液は他作物に影響を及ぼす可能性があるため、ハーモニー洗浄剤を用いた所定の手順で洗浄する。 ・ クローバーに対して薬害を生じるので使用しない。 ・ 耐性雑草が現れるので、3年以上の連用を避ける。 ・ 砂土では使用しない。
タッチダウン iQ	一年生雑草 多年生雑草 一年生及び多 年生雑草 リードカナリ ーグラス	雑草茎葉散布	耕起10日以前 (雑草生育期) は種10日前～ は種当日(耕起 整地後:雑草発 生揃期) 最終刈取後 (雑草生育期)	<ul style="list-style-type: none"> ・ スギナ、ススキ、チガヤ、カヤツリグサ、セイタカアワダチソウなどの難防除雑草にも高い殺草力を発揮する。 ・ 散布1時間後に降雨があっても安定した効果を発揮する。 ・ 雑草の種類や大きさ、発生密度によって適正な薬量が異なるので、その程度に応じて所定量の範囲内で適宜薬量を増減する。 ・ 多年生雑草を地上部及び地下部まで含めて枯殺するには、雑草の生育盛期から生育終期又は開花期前までに散布する。 ・ スギナの防除の際は、スギナが生育盛期を過ぎた時期及びスギナが他雑草に埋没している条件での散布は効果が劣ることがあるので、適期に注意して散布する。 ・ リードカナリーグラスに使用する場合、雑草が生え揃った時期以降に散布し、草丈の目安は20cm以上50cm以下とする。

各論作成日:2024年11月1日 必ずラベルを確認してから農業を使用してください。

除草剤名	適用雑草	使用方法 (適用土壌)	使用時期	使用上の注意
ラウンドアップ マックスロ ード	一年生及び多 年生雑草 多年生イネ科 雑草	雑草茎葉散布	耕起前まで (雑草生育期) 耕起整地後 ~ は種当日まで (雑草発生揃期) 最終刈取後：雑 草生育期	<ul style="list-style-type: none"> ・吸収移行型の除草剤で非選択的にほとんどすべての一年生、越年生、多年生草本及び木本植物に作用する。 ・多年生雑草の中には、散布年には効果の発現が少なく、翌年の再生時期になって枯殺効果がわかるものがある。 ・散布時の雑草の草丈や茎葉面積が大きい程、効果が確実となるので、散布前に雑草の地上部を刈り払わない。 ・通常 2~7 日で効果が発現し、効果完成までにさらに日数を要するので、誤って再散布しない。 ・一年生広葉雑草、または多年生雑草のうちススキ、セイタカアワダチソウ等を主対象に使用する場合、もしくは生育の進んだマルバツユクサに使用する場合、所定量の範囲内で多めの薬量を散布する。 ・処理後 1 時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候を見極めてから散布する。 ・少量散布の場合は、希釈水量に応じ、それぞれ専用のノズルを用いて雑草木の葉面に均一に散布する。 ・リードカナリーグラスに使用する場合、雑草が生え揃った時期以降に散布し、草丈の目安は 20 cm 以上とする。

飼料作物－牧草－まめ科牧草－殺菌剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名
						菌核病
1	トップジンM水和剤		普	チオファネートメチル	1	○

飼料作物－牧草－まめ科牧草－殺虫剤

※農薬の使用に際しては、必ず農薬のラベルに記載されている登録内容・注意事項を確認してください。
更新年月日：2024/11/1

	農薬の名称	群馬県指定	製剤毒性	有効成分の種類	作用機構分類	病害虫雑草名			
						アブラムシ類	ウリハムシモドキ	ウンカ類	ヨコバイ類
1	オルトラン水和剤		普	アセフェート	1B	○	-	-	-
2	スミチオン乳剤		普	MEP	1B	○	○	○	○
3	モスピラン顆粒水溶剤	抑制	劇	アセタミプリド	4A	○	-	-	-

11-(4) まめ科牧草

病虫害防除

病虫害名	防除方法	参考事項
黒かび病	梅雨時、秋雨時 発生箇所は早期に刈り取り、ほ場外に出す。 収穫時 刈り遅れしない。	<ul style="list-style-type: none"> ・高温多湿で多発する。 ・アカクローバに発生が多い。 ・過繁茂の草に発生する。 ・葉に黒褐色、不定形の病斑が形成され、それらが互いに融合して葉の全体を覆う大型病斑となる。病斑中心部には黒い毛羽だった菌核が形成される。 ・罹病草の給与により、「よだれ症状」が発生する。
すす点病	は種時 イネ科作物と混播する。 収穫時 刈り遅れしない。	<ul style="list-style-type: none"> ・冷涼地で発生し、葉の裏側に黒いすす状のかびを生じる。 ・4月～梅雨時に発生する。 ・野生のシロクローバに発生が多い。
いぼ斑点病	収穫時 刈り遅れしない。	<ul style="list-style-type: none"> ・冷涼多湿条件で多発する。 ・褐色～黒褐色の直径1～3mmの小点が多数形成される。
茎枯病	生育期 アブラムシを防除する。 収穫時 刈り遅れしない(ただし、早期刈り取りは後に欠株を招くので行わない)。	<ul style="list-style-type: none"> ・アルファルファに発生が多い。 ・冷涼多湿条件で多発する。 ・黒褐色で針頭大～ゴマ粒大の不揃いの病斑を多数形成する。 ・アブラムシの排せつ物が栄養源となる。
菌核病	は種前 1. 深耕を行い感染源を埋没させる。 2. 1ヵ月間湛水状態にする。 は種時 1. 抵抗性品種を栽培する。 2. 連作を避ける。 収穫時 刈り遅れしない。	<ul style="list-style-type: none"> ・冷涼多湿地域で発生する。 ・初め小さな斑点が現れ、やがて葉や茎が黄化、枯死する。
アブラムシ類	生育時 ほ場の風通しをよくする。 発生時 1. 早期に刈り取りを行う。 2. 適用薬剤を散布する。	<ul style="list-style-type: none"> ・アルファルファとクローバ類に発生が多い。 ・4～5月及び初冬(11月頃)に発生する。 ・春先に乾燥が続くと多発する。
ウリハムシモドキ	は種前 イネ科作物と混播する。 発生時 適用薬剤を散布する。	<ul style="list-style-type: none"> ・乾燥気味で牧草の生育がよくない場所に発生が多い。 ・幼虫期の防除が最も効果的である。
ハスモンヨトウ	生育期 ほ場周辺の雑草を除去する(ハスモンヨトウ防除対策の項参照)。 発生時 1. 発生初期に刈り取りを行う。 2. イネ科作物と混播する。 3. 適用薬剤を散布する。	<ul style="list-style-type: none"> ・アルファルファとクローバ類に発生が多い。 ・発生回数は年4～5回とされる。 ・8～9月に多発する。 ・雑草にも生息する。 ・若齢幼虫の防除が最も効果的である。

雑草防除

- ・ 碎土、整地は丁寧に行い、種子が露出しないように覆土はできるだけ丁寧に行う。
- ・ 散布薬剤の飛散、あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生じることのないように十分注意して散布する。
- ・ 周辺の作物や構造物等にかからないように注意する。
- ・ 皮膚に付着しないように注意する。付着した場合には直ちに石けんを使用し水で良く洗い流す。
- ・ 使用后、タンク、ホース、ブーム、ノズル内に薬液が残らないよう散布器具等はよく洗浄し、他の用途に使用する場合は、十分に注意する。

除草剤名	適用雑草	使用方法 (適用土壌)	使用時期	使用上の注意
タッチダウン i Q	一年生雑草 多年生雑草 一年生及び多 年生雑草 リードカナリ ーグラス	雑草茎葉散布	耕起10日以前 (雑草生育期) は種10日前～ は種当日(耕起 整地後:雑草発 生揃期) 最終刈取後 (雑草生育期)	<ul style="list-style-type: none"> ・ スギナ、ススキ、チガヤ、カヤツリグサ、セイタカアワダチソウなどの難防除雑草にも高い殺草力を発揮する。 ・ 散布1時間後に降雨があっても安定した効果を発揮する。 ・ 雑草の種類や大きさ、発生密度によって適正な薬量が異なるので、その程度に応じて所定量の範囲内で適宜薬量を増減する。 ・ 多年生雑草を地上部及び地下部まで含めて枯殺するには、雑草の生育盛期から生育終期又は開花期前までに散布する。 ・ スギナの防除の際は、スギナが生育盛期を過ぎた時期及びスギナが他雑草に埋没している条件での散布は効果が劣ることがあるので、適期に注意して散布する。 ・ リードカナリーグラスに使用する場合、雑草が生え揃った時期以降に散布し、草丈の目安は20cm以上50cm以下とする。
ラウンドアップ マックスロ ード	一年生及び多 年生雑草 多年生イネ科 雑草	雑草茎葉散布	耕起前まで (雑草生育期) 耕起整地後～ は種当日まで (雑草発生揃期) 最終刈取後:雑 草生育期	<ul style="list-style-type: none"> ・ 吸収移行型の除草剤で非選択的にほとんどすべての一年生、越年生、多年生草本及び木本植物に作用する。 ・ 多年生雑草の中には、散布年には効果の発現が少なく、翌年の再生時期になって枯殺効果がわかるものがある。 ・ 散布時の雑草の草丈や茎葉面積が大きい程、効果が確実となるので、散布前に雑草の地上部を刈り払わない。 ・ 通常2～7日で効果が発現し、効果完成までにさらに日数を要するので、誤って再散布しない。 ・ 一年生広葉雑草、または多年生雑草のうちススキ、セイタカアワダチソウ等を主対象に使用する場合、もしくは生育の進んだマルバツユクサに使用する場合、所定量の範囲内で多めの薬量を散布する。 ・ 処理後1時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候を見極めてから散布する。 ・ リードカナリーグラスに使用する場合、雑草が生え揃った時期以降に散布し、草丈の目安は20cm以上とする。

11-(5) 簡易サイロ・ラップサイロ

病虫害防除

病虫害名	防除方法	参考事項
コオロギ	貯蔵、保管時 1. ビニールサイロの食害防止には 30cm 以上の高さの隔障板を設置する。 2. ビニールサイロやラップサイロ周囲の雑草を防除する。	
鳥害防止 (主にカラス)	貯蔵、保管時 テグス等の糸を張る。	・鳥害が著しい場合を除いて防鳥ネット、網等で覆うことはネズミ害を助長する。
野そ	貯蔵、保管時 1. ラップサイロ間隔は 50 cm以上とし、見通しを確保する。 2. ビニールサイロやラップサイロ周囲の雑草を防除する。	・ラップサイロの下にパレットやスノコ、タイヤ等を敷くと被害を助長する。

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

一般社団法人 日本草地畜産種子協会
(令和6年2月20日通知に対応)

1. 殺虫剤

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
イミダクロプリド水和剤	アドマイヤー水和剤 アドマイヤー顆粒水和剤	
イミダクロプリド粒剤	アドマイヤー1粒剤 アドマイヤーCR箱粒剤	
エトフェンプロックス乳剤	トレボン乳剤 トレボンEW トレボンエアー	
エトフェンプロックス粉剤	トレボン粉剤DL	
エトフェンプロックスマイクロカプセル剤	トレボンMC トレボンスカイMC	
エトフェンプロックス粒剤	トレボン粒剤	
エトフェンプロックス・ジノテフラン水和剤	トレボンスターフロアブル	
エトフェンプロックス・ジノテフラン粉剤	トレボンスター粉剤DL	
エトフェンプロックス・ジノテフラン乳剤	スタートレボンW10	
カルタップ水溶剤	パダンSG水溶剤	
カルタップ粒剤	パダン粒剤4	
カルボスルファン粒剤	ガゼット粒剤	
カルボスルファン・フィプロニル粒剤	ギャング粒剤	
クロチアニジン粉剤	ダントツ粉剤DL ダントツH粉剤DL	
クロチアニジン水溶剤	ダントツ水溶剤	
クロチアニジン水和剤	ダントツフロアブル ダントツEXフロアブル	
クロチアニジン粒剤	ダントツ粒剤 ダントツ箱粒剤 ワンリード箱粒剤08	
クロチアニジン・スピネトラム粒剤	ワンリードSP箱粒剤 ボクシーDS箱粒剤	
クロラントラニプロール粒剤	フェルテラ箱粒剤	
クロラントラニプロール・ジノテフラン粒剤	フェルテラスタークル箱粒剤CU	
クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム粒剤	フェルテラゼクサロン箱粒剤	
クロラントラニプロール・ピメロジン粒剤	フェルテラチェス箱粒剤	
クロラントラニプロール・ベンフラカルブ粒剤	オーベスト箱粒剤	
シアントラニプロール水和剤	バズ顆粒水和剤、フォルテンザFS	
シアントラニプロール粒剤	パディート箱粒剤	
シアントラニプロール・トリフルメゾピリム粒剤	ゼクサロンパディート箱粒剤	
シアントラニプロール・ピメロジン水和剤	ミネクトスター顆粒水和剤	
ジノテフラン液剤	スタークル液剤10 スタークルメイト液剤10	
ジノテフラン剤	スタークル豆つぶ	
ジノテフラン水溶剤	スタークル顆粒水溶剤 アルバリン顆粒水溶剤	
ジノテフラン粉剤	スタークル粉剤DL アルバリン粉剤DL スタークルL粉剤DL	

1. 殺虫剤

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
ジノテフラン粒剤	スタークル粒剤 アルバリン粒剤 スタークル箱粒剤 スタークル1キロH粒剤 スタークルメイト1キロH粒剤 アトラクトン箱粒剤 スターダム箱粒剤	
ジノテフラン・プロフェジン水和剤	アプロードスタークルゾル	
ジノテフラン・ベンズピリモキサン水和剤	オーケストラスタークルエアー	
スピネトラム水和剤	ディアナSC	
スピノサド粒剤	スピノエース箱粒剤、ゼロカウント粒剤	
スピノサド・フィプロニル粒剤	プリンススピノ粒剤6 プリンススピノ粒剤10	
スルホキサフロル粉剤	エクシード粉剤DL	
スルホキサフロル水和剤	エクシードフロアブル	
チアクロプリド粒剤	バリアード箱粒剤	
テトラニプロール水和剤	ヨーバルシードFS ヨーバルキングフロアブル	
テトラニプロール粒剤	ヨーバル箱粒剤	
テブフェノジド水和剤	ロムダンエアー ロムダンゾル	
テブフェノジド粉剤	ロムダン粉剤DL	
トリフルメゾピリム水和剤(ただし、灌注に限る)	ペキサロンフロアブル	※
トリフルメゾピリム粒剤	ゼクサロン箱粒剤	
フィプロニル粒剤	プリンス粒剤	
プロフェジン水和剤	アプロード水和剤 アプロードゾル アプロードフロアブル	
プロフェジン粉剤	アプロード粉剤DL	
プロフェジン粒剤	アプロード粒剤	
ベンズピリモキサン水和剤	オーケストラフロアブル	
ベンフラカルブ粒剤	オンコル粒剤5 グランドオンコル粒剤 オンコルCR箱粒剤	
メタルデヒド粒剤	ジャンボたにくん メタレックスRG粒剤 スクミノンメイト スクミノン スクミノン5 ジャンボタニシ退治粒剤	
メトキシフェノジド水和剤	ランナーフロアブル	
燐酸第二鉄粒剤	スクミンバイト3 スクミンブルー	
BPMC・MEP粉剤	スミバッサ粉剤 スミバッサ粉剤2ODL スミバッサ粉剤5ODL	
MEP乳剤	スミチオン乳剤	
MEP粉剤	スミチオン粉剤2 スミチオン粉剤3DL スミチオン粉剤2DL	
MEPマイクロカプセル剤	スミチオンMC	

注1) 記載されている農薬の名称(製品名)は令和6年3月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。

注2) 備考欄の※印は令和6年2月20日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

一般社団法人 日本草地畜産種子協会
(令和6年2月20日通知に対応)

2. 殺菌剤

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
アゾキシストロピン水和剤(希釈倍数8倍、30倍、300倍、1000倍及び1000~1500倍の使用方法に限る)	アミスターエイト(原液空中散布を除く)	
イソチアニル水和剤	スタウト顆粒水和剤 ルーチンフロアブル ルーチンシードFS	
イソチアニル粒剤	ルーチン粒剤	
イソプロチオラン水和剤	フジワン水和剤	
イソプロチオラン乳剤	フジワン乳剤	
イソプロチオラン粉粒剤	フジワンパック	
イソプロチオラン粒剤	フジワン粒剤 フジワン1キロ粒剤	
イソプロチオラン・フルトラニル粒剤	フジワンモンカット粒剤	
イブコナゾール・銅水和剤	テクリードCフロアブル	
オキシリニック酸水和剤	スターナ水和剤	
オキシリニック酸・プロクロラズ水和剤	スポルタックスターナSE	
醸造酢液剤	エコフィット	
タラロマイセス フラバス水和剤	タフブロックSP タフエイド タフブロック モミキーパー	
チアジニル水和剤	ブイゲットフロアブル	
チアジニル粒剤	ブイゲット箱粒剤	
チオファネートメチル水和剤	トップジンMゾル トップジンM水和剤	
チウラム水和剤	チウラム80、 アンレス【忌避剤】 キヒゲンR-2フロアブル【忌避剤】	
チウラム・ベノミル水和剤	ベンレートT水和剤20	
チウラム・ペフラゾエート水和剤	ヘルシードTフロアブル	
銅水和剤	ドイツボルドーA ボルドー	
銅粉剤	Zボルドー粉剤DL	
銅・フルジオキシニル・ペフラゾエート水和剤	モミガードC水和剤 モミガードC・DF	
テブフロキン水和剤	トライフロアブル	
トリコデルマトロピリデ水和剤	エコホープDJ	
トリフルミゾール水和剤	トリフミン水和剤	
トリフルミゾール乳剤	トリフミン乳剤	
トルプロカルブ粒剤	サンプラス粒剤 ゴウケツ粒剤 サンプラス1キロ粒剤 ゴウケツ1キロ粒剤 サンプラス粒剤18 ゴウケツ粒剤500 サンプラスパック ゴウケツパック シングルキック箱粒剤	
パチルス シンプレクス水和剤	モミホープ水和剤	
パチルス ズブチリス水和剤	ボトキラー水和剤	
ピカルブトラゾクス水和剤	ナエファインフロアブル	

2. 殺菌剤

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
ピカルブトラゾクス粉剤	ナエファイン粉剤	
ヒドロキシイソキサゾール液剤	タチガレン液剤	
ヒドロキシイソキサゾール粉剤	タチガレン粉剤	
ヒドロキシイソキサゾール・メタラキシルM 液剤 (育苗箱での使用に限る)	タチガレエースM液剤 (育苗箱での使用に限る)	
ヒドロキシイソキサゾール・メタラキシルM 粉剤 (育苗箱での使用に限る)	タチガレエースM粉剤 (育苗箱での使用に限る)	
ピロキロン剤	コラトップ豆つぶ	
ピロキロン粉粒剤	コラトップジャンボP	
ピロキロン粒剤	コラトップ粒剤5 コラトップ1キロ粒剤12 コラトップ粒剤24	
ピロキロン・フラメピル粒剤	コラトップリンバー粒剤	
フェリムゾン・フサライド水和剤 (ゾル剤及びフロアブル剤の希釈倍数8倍、30培、300倍及び1000倍の使用方法に限る)	ブラシソール ブラシソールフロアブル (希釈倍数8倍、30培、300倍及び1000倍の使用方法に限る)	
フェリムゾン・フサライド粉剤	ブラシソール粉剤DL	
フサライド水和剤	ラブサイドフロアブル	
フサライド・フルトラニル水和剤	モンカットラブサイド20フロアブル	
フラメピル粒剤	リンバー粒剤	
フラメピル・プロベナゾール粒剤	オリゼメートリンバー粒剤	
フルジオキシニル水和剤	ウイスペクト水和剤5	
フルトラニル水和剤	モンカット水和剤 モンカット水和剤50 モンカットフロアブル モンカットフロアブル40	
フルトラニル粉剤	モンカットファイン粉剤20DL	
フルトラニル粒剤	モンカット粒剤 モンカット1キロ粒剤21 ラクオー・モンカット	
ブロクロラズ乳剤	スポルタック乳剤	
プロベナゾール水和剤	オリゼメート顆粒水和剤	
プロベナゾール粒剤	オリゼメート粒剤 オリゼメート粒剤20 オリゼメート1キロ粒剤 Dr. オリゼ箱粒剤 オリゼメート粒剤40 ファーストオリゼ箱粒剤	
ベノミル水和剤	ベンレート水和剤	
ベノミル・TPN水和剤	ダコレート水和剤	
ペフラゾエート乳剤	ヘルシード乳剤	
ペンフルフェン水和剤	エパーゴルシードFS	
メタラキシルM液剤	スクーデリアES	
メプロニル水和剤 (希釈倍数1000倍及び1000～1500倍の使用方法に限る)	バンタック水和剤75 バンタックゾル (希釈倍率1000倍及び1000～1500倍の使用方法に限る)	
TPN水和剤	ダコニール1000 ダコニールエース	
TPN粉剤	ダコニール粉剤	

注1) 記載されている農薬の名称(製品名)は令和6年3月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。

注2) 備考欄の※印は令和6年2月20日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

一般社団法人 日本草地畜産種子協会
(令和6年2月20日通知に対応)

3. 殺虫殺菌剤

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
イミダクロプリド・イソチアニル粒剤	ルーチンアドマイヤー箱粒剤	
イミダクロプリド・イソチアニル・ベンフルフェン粒剤	エバーゴルフォルテ箱粒剤	
イミダクロプリド・クロラントラニプロール・イソチアニル粒剤	ルーチントレス箱粒剤	
イミダクロプリド・クロラントラニプロール・イソチアニル・ベンフルフェン粒剤	エバーゴルワイド箱粒剤 エバーゴルプラス箱粒剤	
イミダクロプリド・スピノサド・イソチアニル粒剤	ルーチンアドスピノ箱粒剤	
イミダクロプリド・スピノサド・イソチアニル・チフルザミド粒剤	ルーチンアドスピノGT箱粒剤 シャリオ箱粒剤	
イミダクロプリド・スピノサド・イソチアニル・ベンフルフェン粒剤	ルーチンエキスパート箱粒剤	
イミダクロプリド・チアジニル粒剤	ブイゲットアドマイヤー粒剤	
エトフェンプロックス・アゾキシストロピン水和剤	アミスタートレボンSE	
エトフェンプロックス・ピロキロン粒剤	コラトツブレボン粒剤	
クロチアニジン・イソチアニル水和剤	ツインターボ顆粒水和剤	
クロチアニジン・イソチアニル粒剤	スタウトダントツ箱粒剤 スタウトダントツ箱粒剤08 ツインターボ箱粒剤08 ボクシー粒剤	
クロチアニジン・イソチアニル・フラメトピル粒剤	箱大臣粒剤	
クロチアニジン・イソプロチオラン粒剤	フジワンドアントツ粒剤	
クロチアニジン・クロラントラニプロール・イソチアニル粒剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤	
クロチアニジン・クロラントラニプロール・イソチアニル・フラメトピル粒剤	フルターボ箱粒剤	
クロチアニジン・シアントラニプロール・イソチアニル粒剤	スタウトバディートDX箱粒剤	
クロチアニジン・スピネトラム・イソチアニル粒剤	箱王子粒剤 ボクシーSP粒剤	
クロチアニジン・スピネトラム・イソチアニル・フラメトピル粒剤	箱いり娘粒剤	
クロチアニジン・フィプロニル・イソチアニル粒剤	ハコナイト粒剤	
クロチアニジン・フェリムゾン・フサライド水和剤	ブラシンドアントツフロアブル	
クロチアニジン・フェリムゾン・フサライド粉剤	ブラシンドアントツ粉剤DL ブラシンドアントツH粉剤DL	
クロチアニジン・フサライド水和剤	ラブサイドダントツフロアブル	
クロチアニジン・プロベナゾール粒剤	ダントツオリゼメート10箱粒剤 Dr. オリゼダントツ箱粒剤	
クロラントラニプロール・イソプロチオラン粒剤	フジワンフェルテラ粒剤	
クロラントラニプロール・ジノテフラン・トルプロカルブ粒剤	サントリプル箱粒剤 サンフェスタ箱粒剤	
クロラントラニプロール・ジノテフラン・プロベナゾール粒剤	ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤	
クロラントラニプロール・チアジニル粒剤	ブイゲットフェルテラ粒剤 アプライフェルテラ粒剤	
クロラントラニプロール・チフルザミド・プロベナゾール粒剤	Dr.オリゼフェルテラグレータム粒剤	
クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル・フラメトピル粒剤	箱維新粒剤 箱将軍粒剤	
クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル・ベンフルフェン粒剤	スクラム箱粒剤	
クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル粒剤	防人箱粒剤	
クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム・ジクロベンチアゾクス粒剤	ブーンゼクテラ箱粒剤	
クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム・チアジニル・チフルザミド粒剤	ブイゲットハコレンジャーL粒剤 ハコガード粒剤	
クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム・チアジニル粒剤	ブイゲットフェルテラゼクサロンL粒剤	
クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム・トルプロカルブ粒剤	サンスパイク箱粒剤	
クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム・プロベナゾール粒剤	ビルダーフェルテラゼクサロン粒剤	
クロラントラニプロール・ピメロジン・チアジニル粒剤	ブイゲットフェルテラチェスL粒剤	
クロラントラニプロール・ピメロジン・チフルザミド・プロベナゾール粒剤	ビルダーフェルテラチェスGT粒剤	
クロラントラニプロール・ピメロジン・ピロキロン粒剤	デジタルパウアー箱粒剤	
クロラントラニプロール・ピメロジン・プロベナゾール粒剤	ビルダーフェルテラチェス粒剤	
クロラントラニプロール・プロベナゾール水和剤	側条オリゼメートフェルテラ顆粒水和剤	
クロラントラニプロール・プロベナゾール粒剤	Dr. オリゼフェルテラ粒剤 ファーストオリゼフェルテラ粒剤	
クロラントラニプロール・ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤	ジャッジフェルテラ箱粒剤 オーベストオリゼ10箱粒剤	

3. 殺虫殺菌剤

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
シアントラニプロール・イソチアニル水和剤	ミネクトプラスター顆粒水和剤	
シアントラニプロール・イソチアニル粒剤	スタウトバディート箱粒剤 ルーチンデュオ箱粒剤 ツインバディート箱粒剤 ルーチンパンチ箱粒剤	
シアントラニプロール・イソチアニル・ベンフルフェン水和剤	ミネクトフォルスターSC	
シアントラニプロール・イソチアニル・ベンフルフェン粒剤	ルーチンブライト箱粒剤	
シアントラニプロール・ジクロベンチアゾクス水和剤	ブーンバズSC	※
シアントラニプロール・ジクロベンチアゾクス粒剤	ブーンバディート箱粒剤	
シアントラニプロール・チアジニル粒剤	ブイゲットバディート粒剤 アブライバディート粒剤	
シアントラニプロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル・ベンフルフェン粒剤	フルスロトル箱粒剤	
シアントラニプロール・トルプロカルブ粒剤	ツインキック箱粒剤	
シアントラニプロール・ピロキロン粒剤	デジタルミネクト箱粒剤	
シアントラニプロール・プロベナゾール粒剤	Dr. オリゼバディート粒剤 ファーストオリゼバディート粒剤	
ジノテフラン・チオファネートメチル水和剤	トップジンスタークルフロアブル	
ジノテフラン・テブフェノジド・ブプロフェジン・フサライド・フルトラニル粉剤	ワイドナーエース粉剤DL	
ジノテフラン・トルプロカルブ粒剤	ハイパーキック箱粒剤 ゴウケツバスター箱粒剤	
ジノテフラン・ピロキロン粒剤	コラトップスタークル1キロ粒剤	
ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド水和剤	ブレードスタークルゾル ブレードスタークルRゾル	
ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド粉剤	ブレードスタークル粉剤DL	
ジノテフラン・フサライド水和剤	ラブサイドスタークルフロアブル	
ジノテフラン・フサライド粉剤	ラブサイドスタークル粉剤DL	
ジノテフラン・ブプロフェジン・フルトラニル粉剤	アブロードモンカットスタークルF粉剤DL	
ジノテフラン・プロベナゾール水和剤		
ジノテフラン・プロベナゾール粒剤	Dr. オリゼスタークル箱粒剤、オリザエートスター箱粒剤 ビルダースタークル箱粒剤 Dr. オリゼスタークル箱粒剤OS ロングリーチ箱粒剤	
スピノサド・フィプロニル・プロベナゾール粒剤	Dr.オリゼプリンススピノ粒剤6 Dr.オリゼプリンススピノ粒剤10 ファーストオリゼプリンススピノ粒剤6	
チアクロプリド・イソチアニル粒剤	ルーチンバリアード箱粒剤 ルーチンコア箱粒剤	
チアクロプリド・チアジニル粒剤	ブイゲットバリアード粒剤 ブイゲットバイソン粒剤	
チアメトキサム・ピロキロン粒剤(チアメトキサムの含有量が2.0%以下の農薬に限る)	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤	
テトラニプロール・イソチアニル粒剤	ヨーバルトップ箱粒剤	
テトラニプロール・イソチアニル・ベンフルフェン粒剤	ヨーバルプライムEV箱粒剤	
テトラニプロール・ジクロベンチアゾクス粒剤	レシードプラス箱粒剤	
テトラニプロール・ジクロベンチアゾクス・ベンフルフェン粒剤	ブーンレパード箱粒剤	
テトラニプロール・ピメトロジン・イソチアニル粒剤	ヨーバルUG箱粒剤	
テトラニプロール・ピメトロジン・イソチアニル・ベンフルフェン粒剤	ヨーバルパワーEV箱粒剤	
テブフェノジド・ブプロフェジン・フルトラニル水和剤	アブロードロムダンモンカットエア	
テブフェノジド・ブプロフェジン・フルトラニル粉剤	アブロードロムダンモンカットF粉剤DL	
テブフェノジド・ベンズピリモキサム・フルトラニル水和剤(エア)	オーケストラロムダンモンカットエア	
テブフェノジド・ベンズピリモキサム・フルトラニル粉剤	オーケストラロムダンモンカット粉剤DL	
フィプロニル・イソプロチオラン粒剤	フジワンプリンス粒剤	
フィプロニル・イソプロチオラン・ピロキロン粒剤	ピカピカ粒剤	
フィプロニル・チアジニル粒剤	ブイゲットプリンス粒剤10 アブライプリンス粒剤10 コメホープ箱粒剤	

3. 殺虫殺菌剤

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
フィプロニル・チアジニル・フラメピル粒剤	ブイゲットプリンスリンパーL粒剤	
フィプロニル・チフルザミド・プロベナゾール粒剤	ビルダープリンスグレータム粒剤	
フィプロニル・フラメピル粒剤	プリンスリンパー箱粒剤	
フィプロニル・プロベナゾール粒剤	オリゼメートプリンス粒剤 Dr. オリゼプリンス粒剤10 ビルダープリンス粒剤 ファーストオリゼプリンス粒剤10 ファーストオリゼプリンス粒剤6	
ブプロフェジン・フルトラニル水和剤	アプロードモンカットエア	
ベンフラカルブ・ジクロベンチアゾクス粒剤		※
ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤	オリゼメートオンコル粒剤 ジャッジ箱粒剤 グランドオリゼメートオンコル粒剤	

注1)記載されている農薬の名称(製品名)は令和6年3月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。

注2)備考欄の※印は令和6年2月20日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

一般社団法人 日本草地畜産種子協会
(令和6年2月20日通知に対応)

4. 農薬肥料

農薬の種類	農薬の名称(製品名)		備考
ウニコナゾールP複合肥料	スミショート14		
	スマッシュA14		
	コープショート14	コープショートA14	
	スミショート21		
	スマッシュA21		
	コープショート21	コープショートA21	
	スミショート28		
	コープショート28	コープショートA28	
	スミショート35		
	楽-15	楽-18	
	楽-19	楽-20	
	楽-21	楽-25	
	楽-27		
	楽-20W	楽-20S	
	楽-28N	楽-28W	
	コープショート一発25	コープショート一発27	
	コープショート一発ハイチツソ		
	ダブルショットA18		
	ダブルショットA20S	ダブルショットA20W	
	ダブルショットA21		
	ダブルショットA25		
	ダブルショットA27		
	ダブルショットA28N	ダブルショットA28W	
登熟一番18			
登熟一番20S	登熟一番20W		
登熟一番21			
登熟一番25			
登熟一番27			
登熟一番28N	登熟一番28W		
側条用コープショート一発20			
ヒドロキシイソキサゾール複合肥料	タチガレファイト液剤		

5. 植物成長調整剤

農薬の種類	農薬の名称(製品名)		備考
ウニコナゾールP液剤	スミセブンP液剤		
ウニコナゾールP粒剤	ロミカ粒剤		
過酸化カルシウム粉粒剤	カルパー粉粒剤16 オクソスDS		

注1)記載されている農薬の名称(製品名)は令和5年2月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。

注2)備考欄の※印は令和6年2月20日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

一般社団法人 日本草地畜産種子協会
(令和6年2月20日通知に対応)

6. 除草剤 (直播栽培に適用できるもの)

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
イブフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・プロモブチド水和剤	ゴエモンフロアブル	
イブフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・プロモブチド粒剤	ゴエモン1キロ粒剤 ゴエモンジャンボ	
イブフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾピシクロン水和剤	ツルギフロアブル	
イブフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾピシクロン粒剤	ツルギ250粒剤 ツルギジャンボ ツルギ1キロ粒剤	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン水和剤	キマリテフロアブル	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン粒剤	キマリテ1キロ粒剤 キマリテジャンボ ワザアリ薬粒	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・プロピリスルフロン水和剤	カイリキZフロアブル	※
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・プロピリスルフロン粒剤	カイリキZ1キロ粒剤 カイリキZジャンボ	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・フォルピラウキシフェンベンジル粒剤	サキガケ薬粒	※
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤	カチボシLフロアブル カチボシフロアブル トリニティフロアブル	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤	カチボシ1キロ粒剤51 カチボシ1キロ粒剤75 カチボシジャンボ カチボシLジャンボ トリニティ1キロ粒剤 トリニティジャンボ	
イブフェンカルバゾン・プロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤	ウィナーフロアブル ウィナーLフロアブル ウィニングランフロアブル	
イブフェンカルバゾン・プロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤	ウィニングラン1キロ粒剤 ウィナー1キロ粒剤75 ウィナー1キロ粒剤51 ウィナージャンボ ウィナーLジャンボ ウィニングランジャンボ	
イブフェンカルバゾン・ベンゾピシクロン・ベンゾフェナップ水和剤	ジャイロフロアブル	
イブフェンカルバゾン・ベンゾピシクロン・ベンゾフェナップ粒剤	ジャイロ1キロ粒剤	
イマゾスルフロン・エトベンザニド・ダイムロン粒剤	キックパイ1キロ粒剤	
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・クロメブロップ・ダイムロン水和剤	サラブレッドRXフロアブル	
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル水和剤	サラブレッドKAIフロアブル	
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル粒剤	サラブレッドKAI1キロ粒剤 サラブレッドKAIジャンボ サラブレッドKAI400FG	
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・プロモブチド水和剤	バッチリLXフロアブル デルタアタックフロアブル サラブレッドGOフロアブル	
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・プロモブチド粒剤	バッチリLXジャンボ バッチリLX1キロ粒剤 バッチリLX400FG デルタアタックジャンボ デルタアタック1キロ粒剤 デルタアタック400FG サラブレッドGO1キロ粒剤 サラブレッドGOジャンボ サラブレッドGO400FG	
イマゾスルフロン・テフリルトリオン・ピラクロニル粒剤	キラリ1キロ粒剤 キラリジャンボ キラリ400FG カラット1キロ粒剤 カラットジャンボ カラット400FG	

6. 除草剤（直播栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
イマゾスルフロン・テフリルトリオン・ピラクロニル水和剤	キラリフロアブル カラットフロアブル	
イマゾスルフロン・ピラクロニル粒剤	カットダウン1キロ粒剤	
イマゾスルフロン・ピラクロニル・プロモブチド水和剤	バッチリフロアブル ヒッサツフロアブル	
イマゾスルフロン・ピラクロニル・プロモブチド粒剤	バッチリ1キロ粒剤 バッチリジャンボ バッチリ400FG ヒッサツ1キロ粒剤 ヒッサツジャンボ ヒッサツ400FG	
イマゾスルフロン・ピリミノバクメチル・プロモブチド粒剤	オサキニ1キロ粒剤	
イマゾスルフロン・ピリミノバクメチル・フェンキントリオン水和剤	マスラオフロアブル	
イマゾスルフロン・ピリミノバクメチル・フェンキントリオン粒剤	マスラオ1キロ粒剤 マスラオジャンボ	
イマゾスルフロン・フェントラザミド・プロモブチド水和剤	ドニチS1キロ粒剤 マクダス1キロ粒剤	
インダノファン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン水和剤	ライジンパワーフロアブル	
インダノファン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン粒剤	ライジンパワー1キロ粒剤 ライジンパワージャンボ	
エトキシスルフロン・クロメブロップ・トリアファモン・フェントラザミド粒剤	ドリフ1キロ粒剤	
オキサジクロメホン・クロメブロップ・ダイムロン・ベンスルフロンメチル粒剤	ミスターホームランD Lジャンボ	
オキサジクロメホン・クロメブロップ・ベンスルフロンメチル水和剤	ミスターホームランLフロアブル	
オキサジクロメホン・クロメブロップ・ベンスルフロンメチル粒剤	ミスターホームラン1キロ粒剤51	
オキサジクロメホン・ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾピシクロン粒剤	シリウスターボジャンボ	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン・ピラクロニル水和剤	ジェイフレンドフロアブル ジェイフレンド1キロ粒剤	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン・ピラクロニル粒剤	ジェイフレンドジャンボ ジェイフレンド400FG	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン水和剤	デオーレフロアブル デオーレ顆粒	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン粒剤	デオーレ1キロ粒剤 デオーレジャンボ デオーレエアーク粒剤	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン水和剤	エーワンフロアブル	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン粒剤（有効成分含有量がオキサジクロメホン2.0%で用量が小包装(パック)10個(300g)/10aであるものに限る）	エーワンジャンボ	
オキサジクロメホン・ピラクロニル・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾピシクロン水和剤	シリウスエグザ顆粒	
オキサジクロメホン・ピラクロニル・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾピシクロン粒剤	シリウスエグザ1キロ粒剤	
オキサジクロメホン・ピリミスルファン・ベンゾピシクロン水和剤	ナギナタ豆つぶ250 ナギナタジャンボ	
オキサジクロメホン・ピリミスルファン・ベンゾピシクロン粒剤	ナギナタ1キロ粒剤	
オキサジクロメホン・フェンキントリオン・プロピリスルフロン・プロモブチド水和剤	シンズイズ豆つぶ250 シンズイズジャンボ	
オキサジクロメホン・フェンキントリオン・プロピリスルフロン・プロモブチド水和剤	シンズイズフロアブル	
オキサジクロメホン・フェンキントリオン・プロピリスルフロン・プロモブチド粒剤	シンズイズ1キロ粒剤	
カフェンストロール・カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン・ベンゾピシクロン水和剤	フルイニングスカイ500グラム粒剤 フルイニングジャンボ	
カフェンストロール・シクロスルファミロン・ダイムロン・ベンゾピシクロン粒剤	サスケラジカルジャンボ レオンジャンボパワー サスケ粒剤200	
カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル水和剤	クサトリエースLフロアブル ラクダーHフロアブル	
カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ベンゾピシクロン水和剤	シロノックLフロアブル	
カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ベンゾピシクロン粒剤	シロノック1キロ粒剤51、 シロノックLジャンボ	
カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン粒剤	月光1キロ粒剤	
カフェンストロール・フロルピラウキシフェンベンジル・ベンゾピシクロン水和剤	ダンクショットフロアブル	
カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロン粒剤	フルチャーージジャンボ	
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	グリホエキス液剤 サンフーロン液剤 エイトアップ液剤 クサクリーン液剤 草枯らしMIC ハイフウノン液剤 ピラサート液剤 コンパカレール液剤 ハーブ・ニート液剤	

6. 除草剤（直播栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	キャピタルグリホサート41% シンノングリスター マイター液剤 クサトリキング カルナクス クサクリア マルガリーダ ランドマスター カレター 草刈りサクサク原液	
グリホサートカリウム塩液剤	タッチダウンiQ	
	ラウンドアップマックスロード	
グルホシネートPナトリウム塩液剤	ザクサ液剤	
グルホシネート液剤	バスタ液剤	
クロメプロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド粒剤	イネリーグ1キロ粒剤 イネリーグジャンボ	
クロメプロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド水和剤	イネリーグフロアブル	
シクロスルフアロン・ベンゾピシクロン・ペントキサゾン粒剤	半蔵1キロ粒剤	
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾレート水和剤	クサウェボンフロアブル ジャスタフロアブル	
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾレート粒剤	クサウェボン1キロ粒剤 ジャスタ1キロ粒剤 クサウェボンジャンボ ジャスタジャンボ クサウェボン400FG ジャスタ400FG	
シクロピリモレート・ピラゾレート・フェントラザミド水和剤	ジェイソウルフロアブル	
シクロピリモレート・ピラゾレート・フェントラザミド粒剤	ジェイソウル1キロ粒剤 ジェイソウルジャンボ	
シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロロン水和剤	ウルティモZフロアブル レイトリックZフロアブル	
シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロロン粒剤	ウルティモZ1キロ粒剤 レイトリックZ1キロ粒剤 ウルティモZジャンボ レイトリックZジャンボ ウルティモZ350FG	
ジクワット・バラコート液剤	ブリグロックSL	
シハロホップブチル乳剤	クリンチャーEW	
シハロホップブチル粒剤	クリンチャー1キロ粒剤 クリンチャージャンボ	
シハロホップブチル・シメトリン・ベンフレセート・MCPB粒剤	ザベックスDX1キロ粒剤	
シハロホップブチル・ジメタメトリン・ハロスルフロロンメチル・ベンゾピシクロン粒剤	ハイカット1キロ粒剤 サンパンチ1キロ粒剤	
シハロホップブチル・ピラゾスルフロロンエチル・メフェナセット粒剤	リボルバー1キロ粒剤	
シハロホップブチル・フロルピラウキシフェンベンジル乳剤	ノブレクト乳剤	※
シハロホップブチル・ベンタゾン液剤	クリンチャーバスメ液剤	
ジメタメトリン・ダイムロン・テフリルトリオン・メタゾスルフロロン粒剤	レプラス1キロ粒剤 レプラスジャンボ レプラスエア一粒剤	
ジメタメトリン・ピラゾレート・プレチラクロール・ブロモブチド粒剤	クサツタ1キロ粒剤 スラッシュ1キロ粒剤	
シメトリン・テフリルトリオン・トリアファモン・ベンフレセート粒剤	ノックアウト薬粒	※
シメトリン・ピリミルスルファン・フェンキノトリオン剤	ツイゲキ豆つぶ250	
シメトリン・ピリミルスルファン・フェンキノトリオン粒剤	ツイゲキ1キロ粒剤	
シメトリン・ピリミノバックメチル・ベンフレセート・MCPB粒剤	クミメートSM1キロ粒剤	
シメトリン・ペノキススラム・MCPB粒剤	ブイゴールSM1キロ粒剤	
ダイムロン・ピラクロニル・ブロモブチド・ベンスルフロロンメチル水和剤	イッポンDフロアブル	
ダイムロン・ピラクロニル・ブロモブチド・ベンスルフロロンメチル粒剤	イッポンD1キロ粒剤51	
ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロロン粒剤	ゲパード1キロ粒剤 ゲパードジャンボ ゲパードエア一粒剤	
ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロロン粒剤	銀河1キロ粒剤	
ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロロンメチル水和剤	ラオウフロアブル	
ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロロンメチル粒剤	ラオウ1キロ粒剤 ラオウジャンボ	

6. 除草剤（直播栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
ダイムロン・フェントラザミド・プロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤	イノーバDXアップ1キロ粒剤51 ライジング1キロ粒剤75	
ダイムロン・ペノキスラム粒剤	フォローアップ1キロ粒剤 ワイドアタックD1キロ粒剤	
ダイムロン・ベンスルフロンメチル・メフェナセット粒剤	ザークD1キロ粒剤51	
ダイムロン・ペントキサゾン水和剤	テマカットフロアブル	
ダイムロン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤	イネヒーロー1キロ粒剤	※
テフリルトリオン・トリアファモン水和剤	カウンシルコンプリートフロアブル ボデーガードフロアブル	
テフリルトリオン・トリアファモン粒剤	カウンシルコンプリート1キロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ粒剤 カウンシルコンプリートジャンボ ボデーガードプロジャンボ	
テフリルトリオン・トリアファモン・フロルピラウキシフェンベンジル粒剤	ストレンクス1キロ粒剤	
テフリルトリオン・ピラクロニル・プロピリスルフロン水和剤	アットウZフロアブル	
テフリルトリオン・ピラクロニル・プロピリスルフロン粒剤	アットウZ1キロ粒剤 アットウZジャンボ アットウZ400FG	
テフリルトリオン・ピラクロニル水和剤	ゲットスター顆粒	
テフリルトリオン・ピラクロニル粒剤	ゲットスター1キロ粒剤	
テフリルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン水和剤	コメット顆粒	
テフリルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン粒剤	コメット1キロ粒剤	
テフリルトリオン・フェントラザミド水和剤	ボデーガードフロアブル	
テフリルトリオン・フェントラザミド粒剤	ボデーガード1キロ粒剤 ボデーガードジャンボ	
テフリルトリオン・フェントラザミド・メタゾスルフロン水和剤	シグナスフロアブル	
テフリルトリオン・フェントラザミド・メタゾスルフロン粒剤	シグナス1キロ粒剤 シグナスジャンボ シグナスエアーク粒剤	
テフリルトリオン・プロピリスルフロン水和剤	ガツントZフロアブル	
テフリルトリオン・プロピリスルフロン粒剤	ガツントZ1キロ粒剤 ガツントZジャンボ ガツントZ200FG	
トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン水和剤	アシュラフロアブル	
トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン粒剤	アシュラ1キロ粒剤 アシュラジャンボ アシュラ400FG	
トリアファモン・フェンキノトリオン水和剤	プライオリティフロアブル	
トリアファモン・フェンキノトリオン剤	プライオリティ豆つぶ250 プライオリティジャンボ	
トリアファモン・フェンキノトリオン粒剤	プライオリティ1キロ粒剤	
トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド水和剤	アバンティフロアブル カウンシルエナジーフロアブル カウントダウンフロアブル	
トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド粒剤	アバンティ1キロ粒剤 アバンティジャンボ カウンシルエナジー1キロ粒剤 カウントダウン1キロ粒剤、 カウンシルエナジージャンボ カウントダウンジャンボ	
トリアファモン・ベンゾビシクロン・ペントキサゾン水和剤		※
トリアファモン・ベンゾビシクロン・ペントキサゾン粒剤		※
ハロスルフロンメチル水和剤	シャドー水和剤	
ハロスルフロンメチル・メタゾスルフロン水和剤	アレイルSC	
ビスピリバクナトリウム塩液剤	ノミニー液剤	
ピラクロニル水和剤	ピラクロンフロアブル 兆フロアブル	
ピラクロニル粒剤	ピラクロン1キロ粒剤 兆1キロ粒剤	
ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン水和剤	イネキングフロアブル クサバルカンフロアブル	
ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン粒剤	イネキング1キロ粒剤 イネキングジャンボ クサバルカン1キロ粒剤 クサバルカンジャンボ	
ピラクロニル・ピリミスルファン・フェノキサスルホン剤	ヤブサメ豆つぶ250 ヤブサメジャンボ	
ピラクロニル・ピリミスルファン・フェノキサスルホン粒剤	ヤブサメ1キロ粒剤	

6. 除草剤（直播栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
ピラクロニル・ピリミノバクメチル・フェンキトリオン剤	エンペラー豆つぶ250 エンペラージャンボ	
ピラクロニル・ピリミノバクメチル・フェンキトリオン水和剤	エンペラーフロアブル	
ピラクロニル・ピリミノバクメチル・フェンキトリオン粒剤	エンペラー1キロ粒剤	
ピラクロニル・フェンキトリオン・プロピリスルフロロン水和剤	ピリカムイズフロアブル	
ピラクロニル・フルセトスルフロロン・メソトリオン粒剤	センイチMX1キロ粒剤 フルパワーMX1キロ粒剤 タンボパワー1キロ粒剤 センイチMXジャンボ フルパワーMXジャンボ タンボパワージャンボ	
ピラクロニル・プロピリスルフロロン水和剤	メガゼータフロアブル ビクトリーZフロアブル	
ピラクロニル・プロピリスルフロロン粒剤	メガゼータ1キロ粒剤 メガゼータジャンボ メガゼータ400FG ビクトリーZ1キロ粒剤 ビクトリーZジャンボ ビクトリーZ400FG	
ピラクロニル・プロピリスルフロロン・プロモブチド水和剤	アツパレZフロアブル	
ピラクロニル・プロピリスルフロロン・プロモブチド粒剤	アツパレZ1キロ粒剤 アツパレZジャンボ アツパレZ400FG	
ピラクロニル・プロモブチド・ベンスルフロロンメチル水和剤	イッポンフロアブル	
ピラクロニル・プロモブチド・ベンスルフロロンメチル粒剤	イッポン1キロ粒剤75 イッポンジャンボ	
ピラクロニル・ベンゾビシクロン水和剤	サンシャインフロアブル	
ピラクロニル・ベンゾビシクロン粒剤	サンシャイン1キロ粒剤	
ピラクロニル・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤	ピラクロエースフロアブル カリユードフロアブル	
ピラクロニル・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ粒剤	ピラクロエース1キロ粒剤 ピラクロエースジャンボ カリユード1キロ粒剤 カリユードジャンボ	
ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン粒剤	プレキープ1キロ粒剤	
ピラゾスルフロロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン粒剤	ロータスMX1キロ粒剤 アピログロウMX1キロ粒剤 ロータスMXジャンボ アピログロウMXジャンボ アピログロウMXエアー粒剤	
ピラゾスルフロロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン水和剤	ダブルスターSB顆粒	
ピラゾスルフロロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン粒剤	ダブルスターSB1キロ粒剤 ダブルスターSBジャンボ	
ピラゾスルフロロンエチル・ブタクロール・ベンゾビシクロン粒剤	アネシス1キロ粒剤	
ピラゾレート粒剤	サンバード粒剤 サンバード1キロ粒剤30	
ピラゾレート・プロピリスルフロロン粒剤	キクンジャーZ1キロ粒剤	
ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロロン水和剤	アールタイプフロアブル シュナイデンフロアブル	
ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロロン粒剤	アールタイプ1キロ粒剤 アールタイプジャンボ シュナイデン1キロ粒剤 シュナイデンジャンボ ジカマック500グラム粒剤	
ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン剤	ジャンダルムMX豆つぶ250 ジャンダルムMXジャンボ	
ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン粒剤	ジャンダルムMX1キロ粒剤	
ピリフタリド・プレチラクロール・ベンスルフロロンメチル・メソトリオン粒剤	メガオスMX1キロ粒剤	
ピリフタリド・ベンゾビシクロン粒剤	アピロファースト1キロ粒剤	※
ピリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロロン粒剤	アクシズMX1キロ粒剤	
ピリミスルファン剤	アトリ豆つぶ250	
ピリミスルファン粒剤	アトリ1キロ粒剤	
ピリミスルファン・フェノキサスルホン剤	ガンガン豆つぶ250 ガンガンジャンボ	
ピリミスルファン・フェノキサスルホン粒剤	ガンガン1キロ粒剤	
ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキトリオン剤	ベッカク豆つぶ250 ベッカクジャンボ	
ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキトリオン粒剤	ベッカク1キロ粒剤	
ピリミスルファン・フェノキサスルホン・ベンゾビシクロン剤	ベンケイ豆つぶ250、ベンケイジャンボ	

6. 除草剤（直播栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
ピリミスルファン・フェノキサスルホン・ベンゾピシクロン粒剤	ベンケイ1キロ粒剤	
ピリミスルファン・フェントラザミド・プロモブチド剤	イッセン豆つぶ250、イッセンジャンボ	※
ピリミスルファン・メタミホップ・MCPB粒剤	シアゲMF1キロ粒剤	
ピリミノバックメチル剤	ヒエクリーン豆つぶ250	
ピリミノバックメチル剤	ヒエクリーン1キロ粒剤、ワンステージ1キロ粒剤	
ピリミノバックメチル・フェンキントリオン水和剤	ベルーガフロアブル	
ピリミノバックメチル・フェンキントリオン剤	ベルーガ豆つぶ250 ベルーガジャンボ	
ピリミノバックメチル・フェンキントリオン粒剤	ベルーガ1キロ粒剤	
ピリミノバックメチル・プロモブチド・ベンスルフロロンメチル・ペントキサゾン剤	トップガン250グラム トップガンL250グラム トップガンLジャンボ	
ピリミノバックメチル・プロモブチド・ベンスルフロロンメチル・ペントキサゾン水和剤	トップガンフロアブル トップガンRフロアブル トップガンLフロアブル	
ピリミノバックメチル・プロモブチド・ベンスルフロロンメチル・ペントキサゾン粒剤	トップガンGT1キロ粒剤75 トップガンR1キロ粒剤 トップガンGT1キロ粒剤51	
ピリミノバックメチル・ベンタゾン粒剤	ヒエクリーンバサグラン粒剤	
フェノキサスルホン・フェンキントリオン・メタゾスルフロロン剤	アカツキ豆つぶ250、アカツキジャンボ	※
フェノキサスルホン・フェンキントリオン・メタゾスルフロロン粒剤	アカツキ1キロ粒剤	※
フェノキサスルホン・プロモブチド・ベンスルフロロンメチル粒剤	アルファープロ1キロ粒剤75	
フェンキントリオン・プロピリスルフロロン・プロモブチド水和剤	レオゼータフロアブル	※
フェンキントリオン・プロピリスルフロロン・プロモブチド粒剤	レオゼータ1キロ粒剤	※
フェンキントリオン・プロピリスルフロロン・ペントキサゾン水和剤	ゼータジャガーフロアブル	
フェンキントリオン・プロピリスルフロロン・ペントキサゾン粒剤	ゼータジャガー1キロ粒剤 ゼータジャガージャンボ	
フェンキントリオン・プロピリスルフロロン水和剤	ゼータプラスフロアブル	
フェンキントリオン・プロピリスルフロロン粒剤	ゼータプラス1キロ粒剤 ゼータプラスジャンボ ゼータプラス200FG	
フェンキントリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロロン水和剤	流星フロアブル	
フェンキントリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロロン粒剤	流星1キロ粒剤 流星ジャンボ 流星エアー粒剤	
フェントラザミド・プロモブチド・ベンスルフロロンメチル粒剤	クサオウジ1キロ粒剤75 ザークDX1キロ粒剤75 イグザクトQED1キロ粒剤	一部削除
フェントラザミド・ベンスルフロロンメチル・ベンゾピシクロン粒剤	クサトリーBSXジャンボL クサトリーBSXジャンボH	一部削除
フェントラザミド・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロロン水和剤	天空フロアブル	
フェントラザミド・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロロン粒剤	天空1キロ粒剤 天空ジャンボ 天空エアー粒剤	
ブタクロール乳剤	マーシット乳剤	
ブタクロール・ペントキサゾン乳剤	サキドリEW、イネゼットEW シンウチEW	
フルセトスルフロロン粒剤	スケダチエース1キロ粒剤 ヒエクツパエース1キロ粒剤	
プロパニル乳剤	スタム乳剤35	
プロピリスルフロロン水和剤	ゼータワンフロアブル	
プロピリスルフロロン粒剤	ゼータワン1キロ粒剤 ゼータワンジャンボ	
プロピリスルフロロン・プロモブチド水和剤	ゼータファイヤフロアブル	
プロピリスルフロロン・プロモブチド粒剤	ゼータファイヤ1キロ粒剤 ゼータファイヤジャンボ	
プロピリスルフロロン・プロモブチド・ペントキサゾン水和剤	ゼータタイガーフロアブル ドラゴンホークZフロアブル ニマイメZフロアブル	
プロピリスルフロロン・プロモブチド・ペントキサゾン粒剤	ゼータタイガー1キロ粒剤 ゼータタイガージャンボ ゼータタイガー300FG ドラゴンホークZ1キロ粒剤 ドラゴンホークZジャンボ ドラゴンホークZ300FG ニマイメZ1キロ粒剤 ニマイメZジャンボ	
プロピリスルフロロン・ペントキサゾン水和剤	ゼータハンマーフロアブル	
プロピリスルフロロン・ペントキサゾン粒剤	ゼータハンマー1キロ粒剤 ゼータハンマージャンボ	
プロモブチド・ベンスルフロロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤	パワーウルフ1キロ粒剤51	

6. 除草剤（直播栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
フロロピラウキシフェンベンジル乳剤	ロイヤント乳剤	
フロロピラウキシフェンベンジル・ペノキススラム・ベンゾピシクロン粒剤	ウィードコア1キロ粒剤 ウィードコアジャンボSD ウィードコア200SD粒剤	
ペノキススラム水和剤	ワイドアタックSC	
ペノキススラム・ベンゾピシクロン粒剤	テッケン1キロ粒剤 ニトウリュウ1キロ粒剤 テッケンジャンボ ニトウリュウジャンボ	
ペノキススラム・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロン粒剤	サファイア1キロ粒剤	
ペノキススラム・ペンタゾン粒剤	ワイドパワー粒剤	
ペンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤	ウルフェース粒剤17 ウルフェース1キロ粒剤51	
ベンゾピシクロン・メタミホップ粒剤	カイシMF1キロ粒剤	
ペンタゾン液剤	バサグラン液剤(ナトリウム塩)	
ペンタゾン粒剤	バサグラン粒剤(ナトリウム塩)	
ペンタゾン・メタミホップ液剤	トドメバスMF液剤	
メタミホップ粒剤	トドメMF1キロ粒剤	
メタミホップ乳剤	トドメMF乳剤	
ACN粒剤	モゲトン粒剤	

注1)記載されている農薬の名称(製品名)は令和6年3月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。

注2)備考欄の※印は令和6年2月20日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に記載されている
稲発酵粗飼料用稲栽培に使用可能な農薬の種類と農薬の名称の対照表

一般社団法人 日本草地畜産種子協会
(令和6年2月20日通知に対応)

7. 除草剤 (移植栽培に適用できるもの)

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
イブフェンカルバゾン水和剤	スタメンフロアブル	※
イブフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・プロモブチド水和剤	ゴエモンフロアブル	
イブフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・プロモブチド粒剤	ゴエモン1キロ粒剤 ゴエモンジャンボ	
イブフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾピシクロン水和剤	ツルギフロアブル	
イブフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾピシクロン粒剤	ツルギ250粒剤 ツルギジャンボ ツルギ1キロ粒剤	
イブフェンカルバゾン・ベンゾピシクロン・ベンゾフェナップ水和剤	ジャイロフロアブル	
イブフェンカルバゾン・ベンゾピシクロン・ベンゾフェナップ粒剤	ジャイロ1キロ粒剤	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン水和剤	キマリテフロアブル	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン粒剤	キマリテジャンボ キマリテ1キロ粒剤 ワザアリ薬粒	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・プロピリスルフロン水和剤	カイリキZフロアブル	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・プロピリスルフロン粒剤	カイリキZジャンボ カイリキZ1キロ粒剤	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・フロルピラウキシフェンベンジル粒剤	サキガケ薬粒	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤	カチボシLフロアブル カチボシフロアブル トリニティフロアブル	
イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤	カチボシ1キロ粒剤51 カチボシ1キロ粒剤75 カチボシLジャンボ カチボシジャンボ トリニティ1キロ粒剤 トリニティジャンボ	
イブフェンカルバゾン・プロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤	ウィナーフロアブル ウィナーLフロアブル ウィニングランフロアブル	
イブフェンカルバゾン・プロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤	ウィナー1キロ粒剤75 ウィニングラン1キロ粒剤 ウィナー1キロ粒剤51 ウィナージャンボ ウィナーLジャンボ ウィニングランジャンボ	
イマゾスルフロン・エトベンザニド・ダイムロン粒剤	キックパイ1キロ粒剤	
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・クロメブロップ・ダイムロン水和剤	サラブレッドRXフロアブル	
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ダイムロン水和剤	サラブレッドフロアブル	
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル水和剤	サラブレッドKAIフロアブル	
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル粒剤	サラブレッドKAI1キロ粒剤 サラブレッドKAIジャンボ サラブレッドKAI400FG	
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・プロモブチド水和剤	バッチリLXフロアブル デルタアタックフロアブル サラブレッドGOフロアブル	
イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・プロモブチド粒剤	バッチリLXジャンボ バッチリLX1キロ粒剤 バッチリLX400FG デルタアタックジャンボ デルタアタック1キロ粒剤 デルタアタック400FG サラブレッドGO1キロ粒剤 サラブレッドGOジャンボ サラブレッドGO400FG	
イマゾスルフロン・カフェンストール・ダイムロン粒剤	クラッシュ1キロ粒剤 クラッシュEXジャンボ	
イマゾスルフロン・ダイムロン・ペントキサゾン水和剤	テマエースフロアブル	
イマゾスルフロン・ダイムロン・ペントキサゾン粒剤	テマエース1キロ粒剤	
イマゾスルフロン・テフリルトリオン・ピラクロニル水和剤	キラリフロアブル カラットフロアブル	

7. 除草剤（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
イマゾスルフォン・テフリルトリオン・ピラクロニル粒剤	キラリ1キロ粒剤 キラリジャンボ キラリ400FG カラット1キロ粒剤 カラットジャンボ カラット400FG	
イマゾスルフォン・ピラクロニル粒剤	カットダウン1キロ粒剤	
イマゾスルフォン・ピラクロニル・プロモブチド水和剤	バッチフロアブル ヒッサツフロアブル	
イマゾスルフォン・ピラクロニル・プロモブチド粒剤	バッチリ1キロ粒剤 バッチリジャンボ バッチリ400FG ヒッサツ1キロ粒剤 ヒッサツジャンボ ヒッサツ400FG	
イマゾスルフォン・ピリミノバックメチル・フェンキントリオン水和剤	マストラフロアブル	
イマゾスルフォン・ピリミノバックメチル・フェンキントリオン粒剤	マストラオ1キロ粒剤 マストラオジャンボ	
イマゾスルフォン・ピリミノバックメチル・プロモブチド粒剤	オサキニ1キロ粒剤	
イマゾスルフォン・フェントラザミド・プロモブチド粒剤	ドニチS1キロ粒剤 マクダス1キロ粒剤	
イマゾスルフォン・プロモブチド・ベントキサゾン水和剤	ヨシキタフロアブル	
イマゾスルフォン・プロモブチド・ベントキサゾン粒剤	ヨシキタ1キロ粒剤 ヨシキタジャンボ	
インダノファン・クロメプロップ・ベンスルフロメチル粒剤	マサカリLジャンボ	
インダノファン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン水和剤	ライジンパワーフロアブル	
インダノファン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン粒剤	ライジンパワー1キロ粒剤 ライジンパワージャンボ	
エスプロカルブ・ジメタメトリン・ピラゾスルフロリエチル・プレチラクロール粒剤	スパークスター粒剤	
エトキシスルフロム・クロメプロップ・トリアファモン・フェントラザミド粒剤	ドリフ1キロ粒剤	
オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン・プロモブチド・ベンスルフロメチル粒剤	ゴウワンDLジャンボ	
オキサジクロメホン・クロメプロップ・ダイムロン・ベンスルフロメチル粒剤	ミスターホームランD Lジャンボ	
オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ベンスルフロメチル水和剤	バツフルエースLジャンボ	
オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロメチル水和剤	ミスターホームランLフロアブル	
オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロメチル粒剤	ミスターホームランLジャンボ ミスターホームラン1キロ粒剤51	
オキサジクロメホン・ジメタメトリン・ピラゾスルフロリエチル・ベンゾビシクロン水和剤	シリウスターボフロアブル	
オキサジクロメホン・ジメタメトリン・ピラゾスルフロリエチル・ベンゾビシクロン粒剤	シリウスターボ1キロ粒剤 シリウスターボジャンボ	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン水和剤	エーワンフロアブル	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン粒剤（有効成分含有量がオキサジクロメホン2.0%で使用量が小包装(パック)10個(300g)/10aであるものに限る）	エーワンジャンボ	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン・ピラクロニル水和剤	ジェイフレンドフロアブル	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン・ピラクロニル粒剤	ジェイフレンド1キロ粒剤 ジェイフレンドジャンボ ジェイフレンド400FG	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン・プロモブチド水和剤	ピンワンフロアブル	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン・プロモブチド粒剤	ピンワン1キロ粒剤 ピンワンジャンボ	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロム水和剤	デオーレフロアブル デオーレ顆粒	
オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロム粒剤	デオーレ1キロ粒剤 デオーレジャンボ デオーレエアー粒剤	
オキサジクロメホン・ピラクロニル・ピラゾスルフロリエチル・ベンゾビシクロン水和剤	シリウスエグザフロアブル シリウスエグザ顆粒	
オキサジクロメホン・ピラクロニル・ピラゾスルフロリエチル・ベンゾビシクロン粒剤	シリウスエグザ1キロ粒剤 シリウスエグザジャンボ	
オキサジクロメホン・ピリミスルファン・ベンゾビシクロン水和剤	ナギナタジャンボ ナギナタ豆つぶ250	
オキサジクロメホン・ピリミスルファン・ベンゾビシクロン粒剤	ナギナタ1キロ粒剤	
オキサジクロメホン・フェンキントリオン・プロピリスルフロム・プロモブチド水和剤	シンズイZ豆つぶ250 シンズイZジャンボ	
オキサジクロメホン・フェンキントリオン・プロピリスルフロム・プロモブチド水和剤	シンズイZフロアブル	
オキサジクロメホン・フェンキントリオン・プロピリスルフロム・プロモブチド粒剤	シンズイZ1キロ粒剤	
オキサジクロメホン・プロモブチド・フォルピラウキシフェンベンジル粒剤	ルンバ薬粒	※
カフェンストール・カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロム・ベンゾビシクロン粒剤	フルイニングスカイ500グラム粒剤 フルイニングジャンボ	
カフェンストール・シクロスルファミロン・ダイムロン粒剤	ネビロスーラジカルジャンボ	
カフェンストール・シクロスルファミロン・ダイムロン・ベンゾビシクロン粒剤	サスケラジカルジャンボ レオンジャンボパワー サスケ粒剤200	

7. 除草剤（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
カフェンストロール・シハロホップチル・ダイムロン・ベンスルフロメチル水和剤		
カフェンストロール・ジメタメトリン・ダイムロン・ベンゾピシクロン粒剤	キクトモ1キロ粒剤	
カフェンストロール・ダイムロン・ハロスルフロメチル・ベンゾピシクロン水和剤	シルトフロアブル、オークスフロアブル	
カフェンストロール・ダイムロン・ピラゾキシフェン・ベンゾピシクロン粒剤	トビキリジャンボ	
カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロメチル水和剤	クサトリエースLフロアブル ラクダーHフロアブル	
カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロメチル粒剤	ウィードレス粒剤17 クサトリエースLジャンボ クサトリエース粒剤17	
カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロメチル・ベンゾピシクロン水和剤	シロノックLフロアブル	
カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロメチル・ベンゾピシクロン粒剤	シロノック1キロ粒剤51 シロノックLジャンボ	
カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロメチル水和剤	月光フロアブル	
カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロメチル粒剤	月光1キロ粒剤 月光ジャンボ	
カフェンストロール・ピラゾレート・プロモブチド粒剤	ナイスショットジャンボ	
カフェンストロール・フロルピラウキシフェンベンジル・ベンゾピシクロン水和剤	ダンクショットフロアブル	
カフェンストロール・ベンスルフロメチル・ベンゾピシクロン粒剤		
カフェンストロール・ベンスルフロメチル・ベンゾピシクロン水和剤		
カフェンストロール・ベンスルフロメチル・ベンゾピシクロン粒剤		
カルフェントラゾンエチル・フルセトスルフロメチル水和剤	フルチャージジャンボ	
グリホサートイソプロピルアミン塩液剤	フルチャージジャンボ キャピタルグリホサート41%、 クサクリーン液剤 シンノングリスター マイター液剤 クサトリキング カルナクス 草枯らしMIC クサクリア ランドマスター マルガリーダ カレター 草刈りサクサク原液	
グリホサートカリウム塩液剤	タッチダウンIQ ラウンドアップマックスロード	
グルホシネートPナトリウム塩液剤	ザクサ液剤	
グルホシネート液剤	バスタ液剤	
クロメブロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド水和剤	イネリーグフロアブル	
クロメブロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド粒剤	イネリーグ1キロ粒剤 イネリーグジャンボ	
シクルスルファミロン粒剤		
シクルスルファミロン・プレチラクロール粒剤	かねつぐ1キロ粒剤	
シクルスルファミロン・ベンゾピシクロン・ベントキサゾン粒剤	半蔵1キロ粒剤	
シクロピリモレート・シメトリン・テフリルトリオン・プロピリスルフロメチル水和剤	ソニックブームZ1キロ粒剤 グランクロスZ1キロ粒剤	※
シクロピリモレート・シメトリン・テフリルトリオン・ベノキスラム粉粒剤	ソニックブームSジャンボ グランクロスSジャンボ	※
シクロピリモレート・テフリルトリオン・メタゾスルフロメチル水和剤	フィンバック1キロ粒剤 レプラスギア1キロ粒剤	※
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾレート水和剤	クサウェボンフロアブル ジャスタフロアブル	
シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾレート粒剤	クサウェボン1キロ粒剤 ジャスタ1キロ粒剤 クサウェボンジャンボ ジャスタジャンボ クサウェボン400FG ジャスタ400FG	
シクロピリモレート・トリアファモン・ベンゾピシクロン水和剤	グッドラックフロアブル	※
シクロピリモレート・トリアファモン・ベンゾピシクロン粒剤	グッドラック500グラム粒剤 グッドラックジャンボ グッドラック150FG	※
シクロピリモレート・ピラゾレート・フェントラザミド水和剤	ジェイソウルフロアブル	
シクロピリモレート・ピラゾレート・フェントラザミド粒剤	ジェイソウル1キロ粒剤 ジェイソウルジャンボ	
シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロメチル水和剤	ウルティモZフロアブル レイトリックZフロアブル	
シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロメチル粒剤	ウルティモZ1キロ粒剤 レイトリックZ1キロ粒剤 ウルティモZジャンボ レイトリックZジャンボ ウルティモZ350FG	
ジクワット・パラコート液剤	ブリグロックSL	
シハロホップチル乳剤	クリンチャーEW	
シハロホップチル粒剤	クリンチャー粒剤 クリンチャー1キロ粒剤 クリンチャージャンボ	

7. 除草剤（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
シハロホップブチル・ジメタメトリン・ハロスルフロンメチル・ベンゾビシクロン粒剤	ハイカット1キロ粒剤 サンバンチ1キロ粒剤	
シハロホップブチル・ジメタメトリン・ピラゾスルフロンエチル・プレチラクロール粒剤	ホクト粒剤	
シハロホップブチル・シメトリン・ベンフレセート・MCPB粒剤	ザーベックスDX1キロ粒剤	
シハロホップブチル・ピラゾスルフロンエチル・メフェナセット粒剤	リボルバー1キロ粒剤	
シハロホップブチル・フロルピラウキシフェンベンジル乳剤	ノブレクト乳剤	※
シハロホップブチル・ベンタゾン液剤	クリンチャーバスマE液剤	
ジメタメトリン・ダイムロン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン粒剤	レプラス1キロ粒剤、レプラスジャンボ レプラスエアー粒剤	
ジメタメトリン・ピラクロニル粒剤	先陣1キロ粒剤 先陣ジャンボ 先陣200FG	※
ジメタメトリン・ピラゾレート・プレチラクロール・プロモブチド粒剤	クサトツタ粒剤 クサトツタ1キロ粒剤 スラッシュ粒剤 スラッシュ1キロ粒剤	
ジメタメトリン・ピラゾレート・プレチラクロール・ベンフレセート水和剤	ウリホスフロアブル	
ジメタメトリン・ピラゾレート・プレチラクロール・ベンフレセート粒剤	ウリホス粒剤15 ウリホス1キロ粒剤 ウリホス粒剤10	
ジメタメトリン・ブタクロール乳剤	クラールEW	
ジメタメトリン・ブタクロール粒剤	クラール1キロ粒剤	
シメトリン・テフリルトリオン・トリアファモン・ベンフレセート粒剤	ノックアウト薬粒	※
シメトリン・ピラゾキシフェン・プレチラクロール粒剤	ワンオールS1キロ粒剤	
シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン粒剤	ツイゲキ豆つぶ250	
シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン粒剤	ツイゲキ1キロ粒剤	
シメトリン・ピリミノバックメチル・ベンフレセート・MCPB粒剤	クミメートSM1キロ粒剤	
シメトリン・フルセトスルフロン・ベンフレセート粒剤	ナイスミドル1キロ粒剤	
シメトリン・ペノキススラム・MCPB粒剤	ブイゴールSM1キロ粒剤	
シメトリン・ベンフレセート・MCPB粒剤	ザーベックスSM粒剤	
ダイムロン・ピラクロニル・プロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤	イッポンDフロアブル	
ダイムロン・ピラクロニル・プロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤	イッポンD1キロ粒剤51 イッポンDジャンボ	
ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン粒剤	ゲバード1キロ粒剤 ゲバードジャンボ ゲバードエアー粒剤	
ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン水和剤	銀河フロアブル	
ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン粒剤	銀河1キロ粒剤 銀河ジャンボ	
ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル水和剤	ラオウフロアブル	
ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤	ラオウ1キロ粒剤 ラオウジャンボ	
ダイムロン・フェントラザミド・プロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤	イノーバDX1キロ粒剤51 イノーバDXアップ1キロ粒剤51	
ダイムロン・プレチラクロール粒剤	パデホープ1キロ粒剤	
ダイムロン・ペノキススラム粒剤	フォローアップ1キロ粒剤 ワイドアタックD1キロ粒剤	
ダイムロン・ベンスルフロンメチル・メフェナセット粒剤	ザークD粒剤17、ザークD1キロ粒剤51	
ダイムロン・ペントキサゾン水和剤	テマカットフロアブル ダッシュワンフロアブル	
ダイムロン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン水和剤	イネヒーローフロアブル	
ダイムロン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤	イネヒーロー1キロ粒剤 イネヒーロージャンボ イネヒーローエアー粒剤	
ダイムロン・メタゾスルフロン水和剤	ツインスターフロアブル	
ダイムロン・メタゾスルフロン粒剤	ツインスター1キロ粒剤 ツインスタージャンボ	
テフリルトリオン水和剤	マイティワンフロアブル	
テフリルトリオン・トリアファモン水和剤	カウンシルコンプリートフロアブル ボデーガードフロアブル	
テフリルトリオン・トリアファモン粒剤	カウンシルコンプリート1キロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ粒剤 カウンシルコンプリートジャンボ ボデーガードプロジャンボ	
テフリルトリオン・トリアファモン・フロルピラウキシフェンベンジル粒剤	ストレンクス1キロ粒剤	
テフリルトリオン・ピラクロニル・プロピリスルフロン水和剤	アットウZフロアブル	
テフリルトリオン・ピラクロニル・プロピリスルフロン粒剤	アットウZ1キロ粒剤、アットウZジャンボ、 アットウZ400FG	
テフリルトリオン・ピラクロニル水和剤	ゲットスターフロアブル	
テフリルトリオン・ピラクロニル粒剤	ゲットスター顆粒 ゲットスター1キロ粒剤 ゲットスタージャンボ	
テフリルトリオン・ピラクロニル・ペノキススラム粒剤	ドンピシャ1キロ粒剤	
テフリルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン水和剤	コメット顆粒 コメットフロアブル	

7. 除草剤（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
テフルトリオン・ピラクロニル・メタゾスルフロン粒剤	コメット1キロ粒剤 コメットジャンボ	
テフルトリオン・フェントラザミド剤	ボデーガード豆つぶ250	
テフルトリオン・フェントラザミド水和剤	ボデーガードフロアブル	
テフルトリオン・フェントラザミド粒剤	ボデーガード1キロ粒剤	
テフルトリオン・フェントラザミド・メタゾスルフロン水和剤	シグナスフロアブル	
テフルトリオン・フェントラザミド・メタゾスルフロン粒剤	シグナスジャンボ シグナス1キロ粒剤 シグナスエア一粒剤	
テフルトリオン・プロピリスルフロン水和剤	ガツントZフロアブル	
テフルトリオン・プロピリスルフロン粒剤	ガツントZ1キロ粒剤、ガツントZジャンボ ガツントZ200FG	
トリアファモン水和剤	カウンシルワンフロアブル	
トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン水和剤	アシュラフロアブル	
トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン粒剤	アシュラ1キロ粒剤 アシュラジャンボ アシュラ400FG	
トリアファモン・フェンキトリオン剤	プライオリティ豆つぶ250 プライオリティジャンボ	
トリアファモン・フェンキトリオン水和剤	プライオリティフロアブル	
トリアファモン・フェンキトリオン粒剤	プライオリティ1キロ粒剤	
トリアファモン・フェンキトリオン・フェントラザミド水和剤	アバンティフロアブル カウンシルエナジーフロアブル カウントダウンフロアブル	
トリアファモン・フェンキトリオン・フェントラザミド粒剤	アバンティ1キロ粒剤 アバンティジャンボ カウンシルエナジー1キロ粒剤 カウンシルエナジージャンボ カウントダウン1キロ粒剤 カウントダウンジャンボ	
トリアファモン・ベンゾピシクロン・ペントキサゾン水和剤	イザナギフロアブル	
トリアファモン・ベンゾピシクロン・ペントキサゾン粒剤	イザナギ1キロ粒剤 イザナギジャンボSD イザナギ200SD粒剤	
ハロスルフロンメチル・メタゾスルフロン水和剤	アレイルSC	
ビスピリバクナトリウム塩液剤	ノミニ液剤	
ピラクロニル水和剤	ピラクロンフロアブル 兆フロアブル	
ピラクロニル粒剤	ピラクロン1キロ粒剤 ピラクロンジャンボ ピラクロン300FG 兆1キロ粒剤 兆ジャンボ	
ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾピシクロン水和剤	イネキングフロアブル クサバルカンフロアブル	
ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾピシクロン粒剤	イネキング1キロ粒剤 イネキングジャンボ クサバルカン1キロ粒剤 クサバルカンジャンボ	
ピラクロニル・ピリミスルファン・フェノキサスルホン剤	ヤブサメ豆つぶ250 ヤブサメジャンボ	
ピラクロニル・ピリミスルファン・フェノキサスルホン粒剤	ヤブサメ1キロ粒剤	
ピラクロニル・ピリミノバクメチル・フェンキトリオン剤	エンペラー豆つぶ250 エンペラージャンボ	
ピラクロニル・ピリミノバクメチル・フェンキトリオン水和剤	エンペラーフロアブル	
ピラクロニル・ピリミノバクメチル・フェンキトリオン粒剤	エンペラー1キロ粒剤	
ピラクロニル・フェンキトリオン・プロピリスルフロン水和剤	ピリカムIZフロアブル	
ピラクロニル・フルセトスルフロン・メソトリオン粒剤	センイチMX1キロ粒剤 フルパワーMX1キロ粒剤 センイチMXジャンボ フルパワーMXジャンボ タンボパワージャンボ タンボパワー1キロ粒剤	
ピラクロニル・プロピリスルフロン水和剤	メガゼータフロアブル ビクトリーZフロアブル	
ピラクロニル・プロピリスルフロン粒剤	メガゼータジャンボ メガゼータ400FG ビクトリーZジャンボ ビクトリーZ400FG メガゼータ1キロ粒剤 ビクトリーZ1キロ粒剤	
ピラクロニル・プロピリスルフロン・プロモブチド水和剤	アッパレZフロアブル	
ピラクロニル・プロピリスルフロン・プロモブチド粒剤	アッパレZ1キロ粒剤 アッパレZジャンボ アッパレZ400FG	
ピラクロニル・プロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤	イッポンフロアブル	
ピラクロニル・プロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤	イッポン1キロ粒剤75 イッポンジャンボ	

7. 除草剤（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
ピラクロニル・ベンゾビシクロン水和剤	サンシャインフロアブル	
ピラクロニル・ベンゾビシクロン粒剤	サンシャイン1キロ粒剤	
ピラクロニル・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤	ピラクロエースフロアブル カリユードフロアブル	
ピラクロニル・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ粒剤	ピラクロエース1キロ粒剤 ピラクロエースジャンボ カリユード1キロ粒剤 カリユードジャンボ	
ピラクロニル・ベンゾビシクロン・ベンフレセート粒剤	モーレツ1キロ粒剤 モーレツジャンボ	
ピラゾキシフェン・プレチラクロール粒剤（ただし、ピラゾキシフェン含有量が6%以下の製剤に限る）	ワンオール粒剤 クサナイト粒剤	
ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン粒剤	プレキープ1キロ粒剤	
ピラゾスルフロロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン粒剤	ロータスMX1キロ粒剤 ロータスMXジャンボ アピログロウMX1キロ粒剤 アピログロウMXジャンボ アピログロウMXエアージェル粒剤	
ピラゾスルフロロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン水和剤	ダブルスターSB顆粒	
ピラゾスルフロロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン粒剤	ダブルスターSB1キロ粒剤 ダブルスターSBジャンボ	
ピラゾスルフロロンエチル・ブタクロール・ベンゾビシクロン粒剤	アネシス1キロ粒剤	
ピラゾレート粒剤	サンバード粒剤	
ピラゾレート・フェントラザミド・ベンゾビシクロン水和剤	ウエスフロアブル	
ピラゾレート・プロピリスルフロロン水和剤	キクンジャーZフロアブル チャンスタイムZフロアブル	
ピラゾレート・プロピリスルフロロン粒剤	キクンジャーZ1キロ粒剤 キクンジャーZジャンボ チャンスタイムZ1キロ粒剤	
ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロロン水和剤	アールタイプフロアブル シュナイデンフロアブル	
ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロロン粒剤	アールタイプ1キロ粒剤 シュナイデン1キロ粒剤 アールタイプジャンボ シュナイデンジャンボ	
ピラゾレート・ペントキサゾン水和剤	スウィープフロアブル	
ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン剤	ジャンダルム豆つぶ250 ジャンダルムMXジャンボ	
ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン粒剤	ジャンダルムMX1キロ粒剤	
ピリフタリド・プレチラクロール・ベンスルフロロンメチル・メソトリオン粒剤	メガオスMX1キロ粒剤	
ピリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロロン粒剤	アクシズMX1キロ粒剤 アクシズMXジャンボ アクシズMXエアージェル粒剤	
ピリミスルファン剤	アトリ豆つぶ250	
ピリミスルファン粒剤	アトリ1キロ粒剤	
ピリミスルファン・フェノキサスルホン剤	ガンガン豆つぶ250、ガンガンジャンボ	
ピリミスルファン・フェノキサスルホン粒剤	ガンガン1キロ粒剤	
ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン剤	ベッカク豆つぶ250 ベッカクジャンボ	
ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン粒剤	ベッカク1キロ粒剤	
ピリミスルファン・フェノキサスルホン・ベンゾビシクロン剤	ベンケイジャンボ ベンケイ豆つぶ250	
ピリミスルファン・フェノキサスルホン・ベンゾビシクロン粒剤	ベンケイ1キロ粒剤	
ピリミスルファン・フェントラザミド剤	ヤイバジャンボ ヤイバ豆つぶ250	
ピリミスルファン・フェントラザミド粒剤	ヤイバ1キロ粒剤 ゴール1キロ粒剤	
ピリミスルファン・フェントラザミド・プロモブチド剤	イッセン豆つぶ250、イッセンジャンボ	※
ピリミスルファン・フェントラザミド・プロモブチド粒剤	イッセン1キロ粒剤	※
ピリミスルファン・メタミホップ・MCPB粒剤	シアゲMF1キロ粒剤	
ピリミノバックメチル剤	ヒエクリン豆つぶ250	
ピリミノバックメチル粒剤	ヒエクリン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	
ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン剤	ペルーガ豆つぶ250 ペルーガジャンボ	
ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン水和剤	ペルーガフロアブル	
ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン粒剤	ペルーガ1キロ粒剤	
ピリミノバックメチル・プロモブチド・ベンスルフロロンメチル・ペントキサゾン剤	トップガン250グラム トップガンL250グラム	
ピリミノバックメチル・プロモブチド・ベンスルフロロンメチル・ペントキサゾン剤	トップガンジャンボ トップガンLジャンボ トップガンR豆つぶ250 トップガンRジャンボ	
ピリミノバックメチル・プロモブチド・ベンスルフロロンメチル・ペントキサゾン水和剤	トップガンフロアブル トップガンLフロアブル トップガンRフロアブル	

7. 除草剤（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
ピリミノバックメチル・プロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン粒剤	トップガンGT1キロ粒剤75 トップガンGT1キロ粒剤51 トップガンR1キロ粒剤	
ピリミノバックメチル・ベンタズン粒剤	ヒエクリーンバサグラン粒剤	
フェノキサスルホン・フェンキントリオン剤		
フェノキサスルホン・フェンキントリオン水和剤		
フェノキサスルホン・フェンキントリオン粒剤		
フェノキサスルホン・フェンキントリオン・メタゾスルフロン剤	アカツキジャンボ アカツキ豆つぶ250	
フェノキサスルホン・フェンキントリオン・メタゾスルフロン水和剤	アカツキフロアブル	
フェノキサスルホン・フェンキントリオン・メタゾスルフロン粒剤	アカツキ1キロ粒剤	
フェノキサスルホン・プロモブチド・ベンスルフロンメチル剤	クミスター豆つぶ250 クミスターL豆つぶ250 クミスタージャンボ アルファープロHジャンボ クミスターLジャンボ アルファープロH豆つぶ250	
フェノキサスルホン・プロモブチド・ベンスルフロンメチル水和剤	クミスターフロアブル アルファープロHフロアブル クミスターLフロアブル アルファープロLフロアブル	
フェノキサスルホン・プロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤	クミスター1キロ粒剤51 アルファープロ1キロ粒剤51 クミスター1キロ粒剤75 アルファープロ1キロ粒剤75	
フェノキサスルホン・ベンゾビスシクロン・ベンゾフェナップ水和剤	クサビフロアブル	
フェンキントリオン・フェントラザミド剤	シンゲキ豆つぶ250、シンゲキジャンボ	※
フェンキントリオン・フェントラザミド水和剤	シンゲキフロアブル	※
フェンキントリオン・フェントラザミド粒剤	シンゲキ1キロ粒剤	※
フェンキントリオン・プロピリスルフロン水和剤	ゼータプラスフロアブル	
フェンキントリオン・プロピリスルフロン粒剤	ゼータプラス1キロ粒剤 ゼータプラスジャンボ ゼータプラス200FG	
フェンキントリオン・プロピリスルフロン・プロモブチド水和剤	レオゼータフロアブル	※
フェンキントリオン・プロピリスルフロン・プロモブチド粒剤	レオゼータ1キロ粒剤 レオゼータジャンボ レオゼータ300FG	※
フェンキントリオン・プロピリスルフロン・ペントキサゾン水和剤	ゼータジャガーフロアブル	
フェンキントリオン・プロピリスルフロン・ペントキサゾン粒剤	ゼータジャガー1キロ粒剤 ゼータジャガージャンボ	
フェンキントリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン水和剤	流星フロアブル	
フェンキントリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン粒剤	流星1キロ粒剤 流星ジャンボ 流星エア一粒剤	
フェントラザミド水和剤	イノーパワンフロアブル	
フェントラザミド・プロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤	クサオウジ1キロ粒剤75 クサオウジHジャンボ クサトリーDX1キロ粒剤51 クサトリーDXジャンボH クサトリーDXジャンボL ザークDX1キロ粒剤75 ザークDX1キロ粒剤51、 ザークDXジャンボH ザークDXジャンボL イグザクトQEDジャンボ イグザクトQED1キロ粒剤	
フェントラザミド・ベンスルフロンメチル・ベンゾビスシクロン粒剤	クサトリーBSXジャンボL クサトリーBSXジャンボH	
フェントラザミド・ベンゾビスシクロン・メタゾスルフロン水和剤	天空フロアブル	
フェントラザミド・ベンゾビスシクロン・メタゾスルフロン粒剤	天空ジャンボ 天空1キロ粒剤 天空エア一粒剤	
ブタクロール乳剤	マーシエット乳剤	
ブタクロール粒剤	マーシエットジャンボ マーシエット1キロ粒剤 マーシエット粒剤5	
ブタクロール・ACN粒剤	アークエース粒剤 アークエース1キロ粒剤	
ブタクロール・ペントキサゾン乳剤	サキドリEW、イネゼットEW シンウチEW	
ブタクロール・ペントキサゾン粒剤	サキドリ1キロ粒剤 シンウチ1キロ粒剤	
フルセトスルフロン粒剤	スケダチエース1キロ粒剤 ヒエクツパエース1キロ粒剤	
プレチラクロール乳剤	エリジャン乳剤 エリジャンEW乳剤	
プレチラクロール粒剤	ソルネット1キロ粒剤 エリジャンジャンボ	

7. 除草剤（移植栽培に適用できるもの）

農薬の種類	農薬の名称(製品名)	備考
プレチラクロール・ベンゾフェナップ水和剤	ユニハーブフロアブル	
プレチラクロール・メソトリオン粒剤	マキシ-MX1キロ粒剤	
プロピリスルフロン水和剤	ゼータワンフロアブル	
プロピリスルフロン粒剤	ゼータワン1キロ粒剤 ゼータワンジャンボ	
プロピリスルフロン・プロモブチド水和剤	ゼータファイヤフロアブル	
プロピリスルフロン・プロモブチド粒剤	ゼータファイヤ1キロ粒剤 ゼータファイヤジャンボ	
プロピリスルフロン・プロモブチド・ペントキサゾン水和剤	ゼータタイガーフロアブル ドラゴンホークZフロアブル ニマイメZフロアブル	
プロピリスルフロン・プロモブチド・ペントキサゾン粒剤	ゼータタイガー1キロ粒剤 ゼータタイガージャンボ ゼータタイガー300FG ドラゴンホークZ1キロ粒剤 ドラゴンホークZジャンボ ドラゴンホークZ300FG ニマイメZ1キロ粒剤 ニマイメZジャンボ	
プロピリスルフロン・ペントキサゾン水和剤	ゼータハンマーフロアブル	
プロピリスルフロン・ペントキサゾン粒剤	ゼータハンマー1キロ粒剤 ゼータハンマージャンボ	
プロモブチド・ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤	パワーウルフ1キロ粒剤51	
プロモブチド・ペントキサゾン剤	ショキニー250グラム	
プロモブチド・ペントキサゾン水和剤	ショキニーフロアブル	
プロモブチド・ペントキサゾン粒剤	イネショット1キロ粒剤	
フロルピラウキシフェンベンジル・ペノキススラム・ベンゾピシクロン粒剤	ウィードコア1キロ粒剤 ウィードコアジャンボSD ウィードコア200SD粒剤	
フロルピラウキシフェンベンジル乳剤	ロイヤント乳剤	
ペノキススラム水和剤	ワイドアタックSC	
ペノキススラム・ベンゾピシクロン粒剤	テッケン1キロ粒剤 ニトウリュウ1キロ粒剤 テッケンジャンボ ニトウリュウジャンボ	
ペノキススラム・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロン粒剤	サファイア1キロ粒剤	
ペノキススラム・ベンタゾン粒剤	ワイドパワー粒剤	
ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤	ウルフェース粒剤17 ウルフェース1キロ粒剤51	
ベンゾピシクロン・ペントキサゾン水和剤	プレッサフロアブル	
ベンゾピシクロン・ペントキサゾン粒剤	フォーカスショットジャンボ	
ベンタゾン液剤	バサグラン液剤(ナトリウム塩)	
ベンタゾン粒剤	バサグラン粒剤(ナトリウム塩) バサグラン・エアー1キロ粒剤	
ベンタゾン・メタミホップ液剤	トドメバスMF液剤	
ペントキサゾン水和剤	サインヨシフロアブル ベクサーフロアブル ベアスフロアブル メテオフロアブル	
ペントキサゾン粒剤	ベクサー1キロ粒剤 ベアス1キロ粒剤 メテオ1キロ粒剤 メテオジャンボ	
ペントキサゾン・ACN水和剤	クリアホーブフロアブル	
ベンフレート粒剤		
メタミホップ粒剤	トドメMF1キロ粒剤	
メタミホップ乳剤	トドメMF乳剤	
ACN粒剤	モゲトン粒剤	

注1) 記載されている農薬の名称(製品名)は令和6年3月時点で販売実績のある製品ですのでご了承下さい。

注2) 備考欄の※印は令和6年2月20日に追加された農薬または使用方法の変更があった農薬を示しています。

2 1 消 安 第 6 5 8 号
 2 1 生 畜 第 2 2 3 号
 平 成 2 1 年 4 月 2 0 日
 消費・安全局 農産安全管理課長
 畜水産安全管理課長
 生産局 農業生産支援課長
 畜産部畜産振興課長

改正平成 22 年 9 月 7 日	22 消安第 5109 号	22 生畜第 1165 号
改正平成 23 年 11 月 17 日	23 消安第 4124 号	23 生畜第 1825 号
改正平成 24 年 12 月 7 日	24 消安第 4222 号	24 生畜第 1700 号
改正平成 25 年 7 月 1 日	25 消安第 1579 号	25 生畜第 490 号
改正平成 25 年 10 月 30 日	25 消安第 3567 号	25 生産第 2254 号
改正平成 28 年 8 月 8 日	28 消安第 2005 号	28 生畜第 591 号
改正平成 29 年 12 月 1 日	29 消安第 4264 号	28 政統第 678 号
改正平成 30 年 12 月 19 日	30 消安第 4498 号	29 生畜第 789 号
改正令和 2 年 1 月 21 日	元消安第 4447 号	29 政統第 1223 号
改正令和 3 年 1 月 14 日	2 消安第 4418 号	30 生畜第 1181 号
改正令和 4 年 12 月 22 日	4 消安第 5108 号	30 政統第 1462 号
最終改正令和 6 年 2 月 20 日	5 消安第 6726 号	元政統第 1513 号
		2 生畜第 1671 号
		2 政統第 1769 号
		4 畜産第 2048 号
		4 農産第 3058 号
		5 畜産第 2443 号
		5 農産第 4251 号

飼料として使用する粳米への農薬の使用について

近年、生産及び利用が拡大している飼料用米については、粳すりをせずに粳米のまま家畜に給与する取組が普及していますが、粳は、散布された農薬が直接付着する部位であることから、粳米は、玄米に比べ、農薬の残留量が多いことが確認されています。

このため、農林水産省では、粳米を給与した家畜から生産した畜産物の安全確保を図るため、「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」（昭和 63 年 10 月 14 日付け 63 畜 B 第 2050 号農林水産省畜産局長通知）を改正し、出穂以降、飼料用米に使用される農薬の成分については、飼料となる粳米の有害物質の管理の対象となる基準値（以下「粳米の基準値」という。）を順次定めているところです。

一方、下記の 3 に掲げる農薬の成分（粳米の基準値が定められている又は粳米に残留しない農薬の成分）以外については、粳米を給与した家畜から生産した畜産物の安全性が確認されていないことから、下記 1 及び 2 のとおり有害物質の低減対策を行うこととしましたので、貴職から、貴局管内の各都道府県及び関係機関に通知していただくとともに、農家等の関係者に対し周知、指導の徹底をお願いします。

なお、農林水産省において作成している「多収品種の栽培マニュアル」においても当該対策について記載していますので、御留意の上、指導等に御活用ください。

また、本通知については、今後、粳米の基準値が新たに定められた場合には、適宜見直すこととしています。

記

- 1 飼料用米について、出穂以降（ほ場において出穂した個体が初めて確認される時点以降をいう。以下同じ。）に農薬の散布を行う場合には、家畜へは粳すりをして玄米で給与すること。
- 2 粳米を家畜に給与する場合は、出穂以降の農薬の散布は控えること。
- 3 ただし、以下の農薬の成分については、上記 1 及び 2 の低減対策を要しない。
 磷酸第二鉄、ACN（キノクラミン）、BPMC（フェノブカルブ）、PAP（フェントエート）、アジムスルフロン、アゾキシストロビン、イソチアニル、イソプロチオラン、イミダクロプリド、エチプロール、エトフェンプロックス、オキシロニック酸、カルフェントラゾンエチル、クロチアニジン、クロマフェノジド、ジノテフラン、シハロホップブチル、シメコナゾール、シラフルオフエン、スルホキサフロル、チアメトキサム、チオファネートメチル、テブフェノジド、テブフロキン、ヒドロキシイソキサゾール、ピロキロン、フェリムゾン、ブプロフェジン、フラメトピル、フルセトスルフロン、フルトラニル、フルピリミン、プロパニル、プロベナゾール、フロル

ピラウキシフェンベンジル、ペノキススラム、ベンズピリモキサン、マラソン（マラチオン）、メタミホップ、メトキシフェノジド、メトミノストロビン及びメプロニル

なお、上記の農薬の成分を含む農薬の種類は別紙のとおりです。ただし、農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）第 3 条第 1 項の規定に基づく農薬の登録がされ、かつ、農薬の種類が上記の農薬の成分の組合せであれば、別紙の限りではありません。

○殺虫剤

磷酸第二鉄粒剤
BPMC乳剤
BPMC粉剤
BPMC・PAP粉剤
PAP乳剤
PAP粉剤
イミダクロプリド水和剤
イミダクロプリド粒剤
エチプロール水和剤
エチプロール粉剤
エチプロール粉粒剤
エチプロール粒剤
エチプロール・シラフルオフエン水和剤
エチプロール・シラフルオフエン粉剤
エトフェンプロックス水和剤
エトフェンプロックス乳剤
エトフェンプロックス粉剤
エトフェンプロックスマイクロカプセル剤
エトフェンプロックス油剤
エトフェンプロックス粒剤
エトフェンプロックス・ジノテフラン水和剤
エトフェンプロックス・ジノテフラン乳剤
エトフェンプロックス・ジノテフラン粉剤
クロチアニジン水溶剤
クロチアニジン水和剤
クロチアニジン粉剤
クロチアニジン粒剤
クロマフェノジド水和剤
クロマフェノジド・シラフルオフエン粉剤
ジノテフラン液剤
ジノテフラン剤
ジノテフラン水溶剤
ジノテフラン粉剤
ジノテフラン粒剤
ジノテフラン・ブプロフェジン水和剤
ジノテフラン・ベンズピリモキサン水和剤（フロアブル）
シラフルオフエン乳剤
シラフルオフエン粉剤
スルホキサフロル水和剤
スルホキサフロル粉剤
テブフェノジド水和剤
チアメトキサム水和剤
ブプロフェジン水和剤
ブプロフェジン粉剤
ブプロフェジン粒剤
ブプロフェジン・BPMC粉剤
フルピリミン水和剤
ベンズピリモキサン水和剤（フロアブル）
マラソン乳剤
マラソン粉剤
マラソン・BPMC乳剤
メトキシフェノジド粉剤

○殺菌剤

アゾキシストロビン水和剤
アゾキシストロビン粉剤
アゾキシストロビン粉粒剤
イソチアニル粒剤

イソプロチオラン水和剤
イソプロチオラン乳剤
イソプロチオラン粉剤
イソプロチオラン粉粒剤
イソプロチオラン粒剤
イソプロチオラン・フルトラニル粒剤
オキシリニック酸水和剤
シメコナゾール粒剤
チオファネートメチル水和剤
チオファネートメチル粉剤
テブフロキン水和剤
テブフロキン粉剤
ヒドロキシイソキサゾール液剤
フェリムゾン水和剤
フラメトピル粒剤
フラメトピル・プロベナゾール粒剤
フルトラニル水和剤
フルトラニル乳剤
フルトラニル粉剤
フルトラニル粒剤
プロベナゾール粒剤
メトミノストロビン剤
メトミノストロビン粒剤
メプロニル水和剤
メプロニル粉剤

○殺虫殺菌剤

エチプロール・イソプロチオラン粒剤
エチプロール・テブフロキン水和剤
エチプロール・テブフロキン粉剤
エチプロール・メトミノストロビン剤
エチプロール・メトミノストロビン粒剤
エトフェンプロックス・アゾキシストロビン水和剤
エトフェンプロックス・テブフロキン粉剤
ジノテフラン・チオファネートメチル水和剤
ジノテフラン・チオファネートメチル粉剤
ジノテフラン・テブフロキン粉剤
ジノテフラン・ブプロフェジン・フルトラニル粉剤
ジノテフラン・メトミノストロビン粒剤
チアメトキサム・アゾキシストロビン水和剤
テブフェノジド・ブプロフェジン・フルトラニル水和剤（エアー）
テブフェノジド・ベンズピリモキサン・フルトラニル水和剤（エアー）
ブプロフェジン・BPMC・フルトラニル粉剤
ブプロフェジン・フルトラニル水和剤

○除草剤

ACN剤
ACN粒剤
アジムスルフロン・シハロホップブチル粒剤
シハロホップブチル乳剤
シハロホップブチル粒剤
シハロホップブチル・フロルピラウキシフェンベンジル乳剤
フルセトスルフロン水和剤
フルセトスルフロン粒剤
プロパニル乳剤
フロルピラウキシフェンベンジル乳剤
ペノキススラム水和剤
メタミホップ粒剤
メタミホップ乳剤
(令和6年1月1日現在)

飼料用とうもろこし専用除草剤

2025年度 ワンホープ乳剤の適用品種一覧

- ・ワンホープ乳剤は、この表の適用品種以外には使用しないで下さい。晩蒔き、二期作品種、極晩生品種には使用しないで下さい。
- ・高温となる日（最高気温 30℃以上）、または乾燥により作物がストレスを受けている状態では使用しないで下さい。
- ・使用時期はとうもろこしの3葉～5葉期ですので、その範囲内で使用して下さい。
- ・自家採種とうもろこしには使用しないで下さい。
- ・他剤（ベンタゾン剤、s-メトラクロール剤）との混用で薬害が強くあらわれる場合がありますので、使用しないで下さい。なお、その他の薬剤との混用については、弊社までお問い合わせ願います。

品種名	品種名	品種名	品種名	品種名
パイオニアデント 39B29 P7034 P7948 P7631 P8025 39K56 *P8888 *P8284 P82848 *39T45 P9027 P9074 P0200 P0704 P9400 36B08 P1543 34N84 P1204 P1341 P1344 P1690 P2088 P2105 P9960 (*は北海道のみ適用可)	ロイヤルデント TH1515 TH1222 グランデ80 (TH1315) スピーダ82 (TH1513) フレック85 (TH1475) TH058 フォルトナ90 (TH2154) ギガス93 (TH1970) プロフィ95 (TH13101) ロブスト105 (TH2176) TX1235 TX1334 TX1162 TX1277	ゴールドデント KD254 KD320 KD376 KD420 *KD421 KD460 KD502 KD551 KD580 KD641 KD671 KD731 KD078 バステト *KD082 ゲルセミ KD085 ベローナ KD090 カリス KD100 コルビー KD100 エボワス KD105 リコッタ KD106 カンタル KD125 ガブロン (*は北海道のみ適用可)	スノーデント LG3490 110(LG30500) 115(LG31.588) 118R(SH5702) SH4812(SH4812) 125T(SH2821) ニューデント 75(LG3215) 78 ソリード(Anjou227) *80(LG31207) 85(LG31223) 85V ビビアン 85 エリオット 85(LG31237) 90(LG31295) 100(LG3457) 105(LG2533) ネオデント ユミル85(SL19017) エミナ88(SH14081) *アシル90(SH1353) クロノス90(SL12029) マグナス95(SHY4041) エスパス95(SL0746) (*は北海道のみ適用可)	ファームデント 75日(FD21-68) 80日(FD26-24) 80日(FD26-72) 85日(FD33-22) 88日(FD34-66) 90日(FD36-12) 95日(FD41-62) 100日(FD47-85) 103日(FD49-65) 105日(FD51-76) 110日(FD56-24) 110日(FD58-27) クミアイデント 105 113 エスパー S-8812 コビー KWSジュリオ シャンティ チベリウス メルクリオ コロサリス *ミリアーノ セバスト トレイヤ だいち みとりゆたか 北交65号 タカネスター タカネドウ ゆめちから ゆめそだち ゆめつよし (*は北海道のみ適用可)
Z-Corn Z750α Z800α Z850α Z950α Z105 Z112 Z115 Z118 Z120 Z125		サイレージコーン NS115スーパー NS118スーパー NS125スーパー NS129スーパー 95日 タラニス グリーンデント 115 (JG1159)		
*パイオニアデント P8888、P8284、39T45、ゴールドデント KD421、KD082 ゲルセミ、ニューデント 80(LG31207)、ネオデント アシル90(SH1353)及びミリアーノには北海道地域以外では使用しないで下さい。				

2024年12月末現在