

令和7年度コンニャク作況ほ中間成績（8月1日現在）

群馬県農政部蚕糸特産課

〔種球の資質と植付〕

種球の大きさは生子、球茎ともに平年並であった。貯蔵量はやや少ない～平年並。貯蔵中是一部不良球の発生が認められたが、種球資質は平年並だった。

作付面積は令和6年度に引き続き減少したが、作付面積に占める「みやままさり」の比率は県全域で微増したと見られる。

土壌消毒～植付時期に降雨が多かったため、渋川・吾妻地域の一部では植付作業に1週間程度の遅れが生じた。栽植密度は平年並～やや疎植。

〔気象経過と生育状況〕（前橋地方気象台データ）

5～7月の気象条件は、期間中の平均気温が24.2℃（平年差+2.1℃）で平年よりかなり高かった。降水量は363ミリ（平年比81）で少なく、日照時間は568時間（平年比117）で平年より多かった。

出芽・開葉は、ほ場間差が大きい、やや早い～平年並であった。

6月第4半旬～7月第6半旬にかけて気温が高い日が続き、45日間に猛暑日が26回観測された。7月の降水量は77ミリ（平年比38）ととても少なく、記録的な猛暑による高温・干ばつが続いている。この期間に出芽期を迎えたほ場では、苞の黒変や葉柄地際部が褐変し倒伏する株も各地で散見された。また、開葉後も「日焼け症」の発生や生育停滞が観察されている。

〔諸障害の発生状況と対策〕

「モザイク病」の発生は平年並～やや多かった。

高温障害を受けたほ場を中心に「腐敗病」の発生が平年並～やや多い。発病ほ場では、発病株を切り取ってほ場外に搬出するとともに、薬剤防除を徹底する。

「根腐病」は梅雨明け以降発生が見られるが、発生程度は平年並。

今後も気温が高い日が続く予報が出ており、「日焼け症」の発生や「腐敗病」の更なる拡大に警戒を要する。

〔球茎の肥大〕

高温干ばつの影響は大きく、「あかぎおおだま」、「みやままさり」とともに球茎肥大が大幅に遅れている。また、種球が消費しきれず、新球茎に付着した状態の株が多かった。

特に、「みやままさり」1年生では、高温・干ばつの影響が大きく、県内全域で球茎肥大の大幅な遅れが見られている。

以上を総合した作況指数の平年比加重平均は74である。

《参考》

令和6年度栽培面積 群馬 2,690ha / 全国 2,910ha（農林水産統計）

令和7年度栽培面積 群馬 2,388ha（推定値）

品種構成	在来種、支那種	0.1%
	はるなくろ	0.5%
	あかぎおおだま	43.4%
	みょうぎゆたか	0.1%
	みやままさり	55.9%


作況指数一覧表

ほ場名	品種名	年 生 別	8月1日				
			種芋重量 (g)	新芋重量 (g)	肥大倍率 (倍)	作況指数	
						前年比	平年比
渋川(渋川)	あかぎおおだま	1	15.0	32.1	2.14	111	121
		2	100.0	114.2	1.14	54	65
高山	あかぎおおだま	1	15.0	12.2	0.81	67	—
		2	100.0	46.7	0.47	36	—
東吾妻	あかぎおおだま	1	15.0	28.2	1.88	103	105
		2	100.0	98.3	0.98	105	68
川場	あかぎおおだま	1	15.0	15.5	1.03	57	58
		2	100.0	125.9	1.26	134	87
渋川(渋川)	みやままさり	1	15.0	37.9	2.53	109	126
		2	100.0	142.2	1.42	77	101
渋川(中郷)	みやままさり	1	15.0	0.0	0.00	—	—
		2	100.0	131.5	1.32	70	73
安中(中野谷)	みやままさり	1	15.0	13.5	0.90	52	48
		2	100.0	120.0	1.20	77	70
安中(上間仁田)	みやままさり	1	15.0	38.5	2.57	81	99
		2	100.0	148.5	1.49	62	72
富岡(妙義中里)	みやままさり	1	15.0	31.0	2.07	52	56
		2	100.0	128.8	1.29	53	53
富岡(一ノ宮)	みやままさり	1	15.0	13.7	0.91	35	60
		2	100.0	94.6	0.95	59	55
昭和(椽久保)	みやままさり	1	15.0	5.4	0.36	17	22
		2	100.0	107.4	1.07	55	68
昭和(生越)	みやままさり	1	15.0	3.4	0.23	17	—
		2	100.0	95.3	0.95	60	—
平 均	あかぎおおだま	1	15.0	22.0	1.47	85	95
		2	100.0	96.3	0.96	82	73
	みやままさり	1	15.0	20.5	1.37	52	69
		2	100.0	121.0	1.21	64	70

- ・渋川(中郷)みやままさり1年生は、著しい出芽不良が生じたことから欠測とした。
- ・高山と昭和(生越)は前年との比較のみのため、平年比は未算出とした。


(°C)

半旬別平均気温(前橋)



(mm)

半旬別降水量(前橋)



(hr)

半旬別日照時間(前橋)

