




各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部 発生予察係
令和7年9月1日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。



・グラフの見た方
縦軸は誘殺数(頭数)で、それぞれの半旬(5日間)の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬(1日~5日)を表します。





・誘殺方法
有翅アブラムシ類(伊勢崎市西小保方町):黄色水盤
(館林市当郷、沼田市井土上町):黄色粘着トラップ

・館林市当郷と沼田市井土上町の調査期間は、3月~11月です

各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部 発生予察係
令和7年9月1日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。










・グラフの見方
縦軸は誘殺数(頭数)で、それぞれの半旬(5日間)の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬(1日～5日)を表します。

・誘殺方法
フェロモントラップ

各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部 発生予察係
令和7年9月1日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。



・グラフの見方

縦軸は誘殺数(頭数)で、それぞれの半旬(5日間)の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬(1日～5日)を表します。






・誘殺方法

フェロモントラップ

各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部 発生予察係
令和7年9月1日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。



・グラフの見方

縦軸は誘殺数(頭数)で、それぞれの半旬(5日間)の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬(1日～5日)を表します。

・誘殺方法

フェロモントラップ


各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部 発生予察係
令和7年9月1日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。


コナガ:伊勢崎市波志江町

〔性フェロモントラップ、キャベツ〕




コナガ:渋川市赤城町

〔性フェロモントラップ、キャベツ〕



コナガ:嬬恋村田代

〔性フェロモントラップ、キャベツ〕






・グラフの見方
縦軸は誘殺数(頭数)で、それぞれの半旬(5日間)の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬(1日~5日)を表します。
・誘殺方法

各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部 発生予察係
令和7年9月1日更新








※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください



各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部 発生予察係
令和7年9月1日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。











・グラフの見方
縦軸は誘殺数(頭数)で、それぞれの半旬(5日間)の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬(1日～5日)を表します。
・誘殺方法
フェロモントラップ

各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部 発生予察係
令和7年9月1日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。







・グラフの見方
縦軸は誘殺数(頭数)で、それぞれの半月(5日間)の合計値です。
横軸の上段「1」は1半月(1日～5日)を表します。
・誘殺方法

各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部 発生予察係
令和7年9月1日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。



・グラフの見方

縦軸は誘殺数(頭数)で、それぞれの半旬(5日間)の合計値です。

横軸の上段『1』は1半旬(1日～5日)を表します。

・誘殺方法

フェロモントラップ