

水田内におけるイネカメムシすくいとり調査結果

農業事務所	6月			7月			8月			9月			調査市町村
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
中部	—	—	—	—	—	0.8 (5)	—	0.0 (8)	0.1 (8)	0.0 (2)	0.0 (1)	—	前橋市(5)、伊勢崎市(3)、渋川市(2)、 榛東村(1)
西部	—	—	—	—	—	0.6 (5)	—	0.2 (5)	1.2 (5)	—	—	—	高崎市(2)、藤岡市(1)、富岡市(1)、 安中市(1)
吾妻	—	—	—	—	—	0.0 (2)	0.0 (2)	0.0 (2)	—	—	—	—	中之条町(1)、東吾妻町(1)
利根沼田	—	—	—	—	—	0.0 (1)	0.0 (3)	0.0 (3)	—	—	—	—	沼田市(1)、川場村(1)、みなかみ町(1)
東部	0.0 (1)	0.0 (4)	1.0 (4)	42.2 (5)	11.0 (6)	9.9 (15)	7.9 (24)	9.9 (27)	2.2 (23)	9.9 (19)	3.7 (9)	0.5 (4)	太田市(10)、桐生市(4)、みどり市(4)、 館林市(2)、邑楽町(1)、板倉町(6)
県計	0.0 (1)	0.0 (4)	1.0 (4)	42.2 (5)	11.0 (6)	5.6 (28)	6.6 (29)	6.0 (45)	1.6 (36)	9.0 (21)	3.3 (10)	0.5 (4)	計 48地点

※1 各農業事務所、農業技術センターのすくい取り調査による

※2 調査は、1ほ場あたり20回×4カ所 計80回振りによるすくい取り頭数を計数

※3 数値は、1ほ場あたりの平均頭数

※4 頭数は、成虫、幼虫含む

※5 —は未調査、()内は調査地点数