

令和8年3月17日まで農政局、都道府県担当者及び防除担当者限り

令和8年2月20日  
群馬県農政部農政課有機・循環型農業推進室  
農業環境・植物防疫係

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和8年3月18日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

| 登録番号    | 農薬名（商品名）    | 農薬の種類名       | 製造者名         | 変更内容 |
|---------|-------------|--------------|--------------|------|
| 第15664号 | オキシンドー水和剤80 | 有機銅水和剤       | 日本農薬株式会社     | 別紙1  |
| 第18230号 | ドキリンフロアブル   | 有機銅水和剤       | 日本農薬株式会社     | 別紙2  |
| 第21247号 | オキシラン水和剤    | キャプタン・有機銅水和剤 | 日本農薬株式会社     | 別紙3  |
| 第8086号  | キノンドー水和剤40  | 有機銅水和剤       | アグロカネショウ株式会社 | 別紙4  |
| 第14359号 | キノンドー水和剤80  | 有機銅水和剤       | アグロカネショウ株式会社 | 別紙5  |
| 第17831号 | キノンドーフロアブル  | 有機銅水和剤       | アグロカネショウ株式会社 | 別紙6  |
| 第18064号 | キンセット水和剤80  | 銅・有機銅水和剤     | アグロカネショウ株式会社 | 別紙7  |
| 第23522号 | キノンドー顆粒水和剤  | 有機銅水和剤       | アグロカネショウ株式会社 | 別紙8  |

### 【申請者による変更理由】

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。

### 【本文書の取扱いに関するお願い】

本周知文書は、変更登録内容を防除指針、防除暦等へ速やかに反映するための情報提供を目的としています。このため、農薬登録日以前においては、本情報を必要に応じて防除指針、防除暦等に関する生産者団体等に提供することは問題ございませんが、インターネット上に掲載する等、変更内容を公開することはお控えください。なお、登録後の掲載は問題ございません。

### 【本件のお問い合わせ先】

群馬県農政部農政課有機・循環型農業推進室  
農業環境・植物防疫係  
TEL:027-226-3038  
FAX:027-223-3648

**オキシンドー水和剤80**

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- 作物名「りんご」、「マルメロ」及び「かりん」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」について、適用病害虫名「黒斑病、黒星病」の希釈倍数を「1400～2000倍」に、適用病害虫名「輪紋病」の希釈倍数を「1400～1600倍」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

〔変更前〕

| 作物名      | 適用病害虫名                | 希釈倍数       | 使用液量                   | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数        |
|----------|-----------------------|------------|------------------------|----------|---------|------|-----------------------|
| りんご      | 黒星病、黒点病、斑点落葉病         | 1200～1600倍 | 200～700L/10a           | 収穫14日前まで | 4回以内    | 散布   | 7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内） |
|          | 輪紋病、すす点病、すす斑病、褐斑病、炭疽病 | 1200倍      |                        |          |         |      |                       |
| マルメロ、かりん | 黒点病                   | 1200～2000倍 |                        | 収穫3日前まで  | 9回以内    |      | 4回以内                  |
| なし       | 黒斑病、黒星病               | 1200～2000倍 |                        |          |         |      |                       |
|          | 輪紋病                   | 1200～1600倍 | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |          |         |      |                       |

〔変更後〕

| 作物名 | 適用病害虫名  | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数         |
|-----|---------|------------|--------------|----------|---------|------|------------------------|
| なし  | 黒斑病、黒星病 | 1400～2000倍 | 200～700L/10a | 収穫21日前まで | 9回以内    | 散布   | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |
|     | 輪紋病     | 1400～1600倍 |              |          |         |      |                        |

**ドキリンフロアブル**

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

〔変更前〕

| 作物名 | 適用病害虫名            | 希釈倍数  | 使用液量         | 使用時期    | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数         |
|-----|-------------------|-------|--------------|---------|---------|------|------------------------|
| なし  | 黒斑病、黒星病、輪紋病、枝枯細菌病 | 1000倍 | 200～700L/10a | 収穫3日前まで | 9回以内    | 散布   | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |

〔変更後〕

| 作物名 | 適用病害虫名            | 希釈倍数  | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数         |
|-----|-------------------|-------|--------------|----------|---------|------|------------------------|
| なし  | 黒斑病、黒星病、輪紋病、枝枯細菌病 | 1000倍 | 200～700L/10a | 収穫21日前まで | 9回以内    | 散布   | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |

**オキシラン水和剤**

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- 作物名「りんご」の希釈倍数を「700～800倍」に変更し、「500～600倍」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

〔変更前〕

| 作物名 | 適用病虫害名            | 希釈倍数     | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キャプタンを含む農薬の総使用回数 | 有機銅を含む農薬の総使用回数        |      |                        |
|-----|-------------------|----------|--------------|----------|---------|------|------------------|-----------------------|------|------------------------|
| りんご | 黒点病、斑点落葉病、黒星病、輪紋病 | 500～800倍 | 200～700L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内    | 散布   | 6回以内             | 7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内） |      |                        |
|     | 褐斑病、すす点病、すす斑病、炭疽病 | 500～600倍 |              |          |         |      |                  |                       |      |                        |
| なし  | 黒星病、黒斑病、輪紋病       | 500～600倍 |              | 収穫3日前まで  | 9回以内    |      |                  |                       | 9回以内 | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |
|     | 炭疽病、褐色斑点病、黒斑細菌病   | 500倍     |              |          |         |      |                  |                       |      |                        |

〔変更後〕

| 作物名 | 適用病虫害名            | 希釈倍数     | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | キャプタンを含む農薬の総使用回数 | 有機銅を含む農薬の総使用回数        |          |      |
|-----|-------------------|----------|--------------|----------|---------|------|------------------|-----------------------|----------|------|
| りんご | 黒点病、斑点落葉病、黒星病、輪紋病 | 700～800倍 | 200～700L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内    | 散布   | 6回以内             | 7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内） |          |      |
| なし  | 黒星病、黒斑病、輪紋病       | 500～600倍 |              |          |         |      |                  |                       | 収穫21日前まで | 9回以内 |
|     | 炭疽病、褐色斑点病、黒斑細菌病   | 500倍     |              |          |         |      |                  |                       |          |      |

**キノンドー水和剤40**

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」の希釈倍数「600～800倍」を「700～800倍」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

〔変更前〕

| 作物名 | 適用病害虫名        | 希釈倍数      | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数         |
|-----|---------------|-----------|--------------|----------|---------|------|------------------------|
| りんご | 黒星病、斑点落葉病、黒点病 | 500～800倍  | 200～700L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内    | 散布   | 7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）  |
| なし  | 黒斑病、黒星病       | 800～1000倍 |              | 収穫3日前まで  | 9回以内    |      | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |
|     |               | 輪紋病       | 600～800倍     |          |         |      |                        |

〔変更後〕

| 作物名 | 適用病害虫名  | 希釈倍数      | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数         |
|-----|---------|-----------|--------------|----------|---------|------|------------------------|
| なし  | 黒斑病、黒星病 | 800～1000倍 | 200～700L/10a | 収穫21日前まで | 9回以内    | 散布   | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |
|     |         | 輪紋病       |              |          |         |      |                        |

**キノンドー水和剤80**

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「りんご」、「マルメロ」及び「かりん」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。
- 作物名「なし」の希釈倍数「1200～2000倍」を「1400～2000倍」に変更し、「1200倍」を削除する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

〔変更前〕

| 作物名  | 適用病害虫名                    | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数        |                        |
|------|---------------------------|------------|--------------|----------|---------|------|-----------------------|------------------------|
| りんご  | 黒星病、斑点落葉病                 | 1200～1600倍 | 200～700L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内    | 散布   | 7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内） |                        |
|      | 輪紋病、褐斑病、炭疽病、すす斑病、すす点病、黒点病 | 1200倍      |              |          |         |      |                       |                        |
| なし   | 黒星病、黒斑病                   | 1200～2000倍 |              | 収穫3日前まで  | 9回以内    |      | 4回以内                  | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |
|      | 輪紋病                       | 1200倍      |              |          |         |      |                       |                        |
| マルメロ | 黒点病                       | 1200～2000倍 |              | 収穫14日前まで | 4回以内    |      |                       | 4回以内                   |
| かりん  | ごま色斑点病                    | 1200倍      |              |          |         |      |                       |                        |

〔変更後〕

| 作物名 | 適用病害虫名  | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数         |
|-----|---------|------------|--------------|----------|---------|------|------------------------|
| なし  | 黒星病、黒斑病 | 1400～2000倍 | 200～700L/10a | 収穫21日前まで | 9回以内    | 散布   | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |

**キノンドーフロアブル**

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

〔変更前〕

| 作物名 | 適用病害虫名            | 希釈倍数  | 使用液量         | 使用時期    | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数         |
|-----|-------------------|-------|--------------|---------|---------|------|------------------------|
| なし  | 黒斑病、輪紋病、黒星病、褐色斑点病 | 1000倍 | 200～700L/10a | 収穫3日前まで | 9回以内    | 散布   | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |

〔変更後〕

| 作物名 | 適用病害虫名            | 希釈倍数  | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数         |
|-----|-------------------|-------|--------------|----------|---------|------|------------------------|
| なし  | 黒斑病、輪紋病、黒星病、褐色斑点病 | 1000倍 | 200～700L/10a | 収穫21日前まで | 9回以内    | 散布   | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |

**キンセツ水和剤80**

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

〔変更前〕

| 作物名 | 適用病虫害名            | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 銅を含む農薬の総使用回数 | 有機銅を含む農薬の総使用回数        |
|-----|-------------------|------------|--------------|----------|---------|------|--------------|-----------------------|
| りんご | 斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、炭疽病 | 1000～1200倍 | 200～700L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内    | 散布   | —            | 7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内） |
| なし  | 輪紋病、黒星病           |            |              | 収穫3日前まで  | 9回以内    |      |              |                       |

〔変更後〕

| 作物名 | 適用病虫害名  | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 銅を含む農薬の総使用回数 | 有機銅を含む農薬の総使用回数         |
|-----|---------|------------|--------------|----------|---------|------|--------------|------------------------|
| なし  | 輪紋病、黒星病 | 1000～1200倍 | 200～700L/10a | 収穫21日前まで | 9回以内    | 散布   | —            | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |

**キノンドー顆粒水和剤**

■変更内容

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ）】

- 作物名「りんご」を削除する。
- 作物名「なし」の使用時期を「収穫21日前まで」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかるとの部分のみ）】

〔変更前〕

| 作物名 | 適用病害虫名                              | 希釈倍数  | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数         |
|-----|-------------------------------------|-------|--------------|----------|---------|------|------------------------|
| りんご | 斑点落葉病、黒星病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、黒点病、炭疽病 | 1000倍 | 200～700L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内    | 散布   | 7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）  |
| なし  | 黒星病、黒斑病、輪紋病                         |       |              | 収穫3日前まで  | 9回以内    |      | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |

〔変更後〕

| 作物名 | 適用病害虫名      | 希釈倍数  | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 有機銅を含む農薬の総使用回数         |
|-----|-------------|-------|--------------|----------|---------|------|------------------------|
| なし  | 黒星病、黒斑病、輪紋病 | 1000倍 | 200～700L/10a | 収穫21日前まで | 9回以内    | 散布   | 12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内） |