

発生予察情報 令和 8 年度ウンカ・ヨコバイ定点調査結果
(7 月 6 半旬)

群馬県農業技術センター（病害虫防除所）
土壌・病害虫部 発生予察係

地域	調査地点	ヒメビウンカ						ツマグロヨコバイ						セジロウンカ						調査日
		成虫		幼虫		合計		成虫		幼虫		合計		成虫		幼虫		合計		
		本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	
中部	前橋市A	1	7.4	92	7.6	93	15.0	0	4.3	0	0.1	0	4.4	0	0.2	0	0.2	0	0.4	7/30
	前橋市B	9	5.6	7	18.3	16	23.9	0	3.1	0	1.4	0	4.5	0	0.2	0	0.0	0	0.2	7/30
	伊勢崎市	9	5.3	41	7.1	50	12.4	0	0.0	0	0.1	0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7/30
	渋川市	0	11.4	0	9.4	0	20.8	0	1.4	0	1.3	0	2.7	0	0.9	0	0.0	0	0.9	7/29
	中部平均	4.8	7.4	35.0	10.6	39.8	18.0	0.0	2.2	0.0	0.7	0.0	2.9	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.4	
西部	高崎市	4	9.6	0	69.4	4	79.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	0	0.1	0	0.6	7/28
	高崎市吉井町	7	7.4	7	9.1	14	16.6	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.1	0	0.9	0	1.0	7/28
	藤岡市	5	5.3	28	10.0	33	15.3	0	0.5	0	0.1	0	0.6	0	0.2	0	0.2	0	0.4	7/28
	富岡市	7	9.0	3	32.6	10	41.6	0	1.2	0	0.0	0	1.2	0	0.4	0	2.7	0	3.1	7/28
	安中市	17	5.6	0	53.5	17	59.1	2	4.7	0	0.8	2	5.5	0	0.1	0	0.2	0	0.3	7/28
	西部平均	8.0	7.4	7.6	34.9	15.6	42.3	0.6	1.3	0.0	0.2	0.6	1.5	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0	1.1	
吾妻	中之条町	2	2.3	1	1.0	3	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.7	0	0.0	0	0.7	7/29
	東吾妻町	0	3.0	0	1.7	0	4.7	0	0.9	0	0.2	0	1.1	0	0.3	0	0.0	0	0.3	7/29
	吾妻平均	1.0	2.7	0.5	1.4	1.5	4.0	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	
利根沼田	沼田市	1	1.5	1	0.6	2	2.1	1	0.1	0	0.2	1	0.3	0	0.3	0	0.0	0	0.3	7/29
	利根沼田平均	1.0	1.5	1.0	0.6	2.0	2.1	1.0	0.1	0.0	0.2	1.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	
東部	太田市A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7/29
	太田市B	1	9.8	71	134.1	72	143.9	0	1.5	0	0.2	0	1.7	0	0.4	0	4.0	0	4.4	7/29
	桐生市新里町	1	4.1	0	6.9	1	11.0	0	0.3	0	0.0	0	0.3	0	0.0	0	0.1	0	0.1	7/30
	みどり市笠懸町	2	0.9	0	0.6	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7/30
	館林市	0	12.7	1	47.7	1	60.4	0	0.3	0	0.4	0	0.7	0	0.6	0	2.7	0	3.3	7/29
	邑楽町	0	3.3	1	10.5	1	13.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	0	0.5	7/29
	板倉町A	6	3.8	16	3.8	22	7.6	0	0.2	0	0.1	0	0.3	0	0.1	0	0.3	0	0.4	7/30
	板倉町B	22	17.2	59	156.0	81	173.2	0	11.8	1	13.4	1	25.2	0	0.0	15	0.6	15	0.6	7/30
	板倉町C	2	-	0	-	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7/30
	東部平均	3.8	7.4	16.4	51.4	20.2	58.8	0.0	2.0	0.1	2.0	0.1	4.0	0.0	0.2	1.7	1.2	1.7	1.3	
県平均		4.6	6.4	15.6	29.0	20.2	35.5	0.2	1.5	0.0	1.0	0.2	2.5	0.0	0.3	0.7	0.6	0.7	0.9	

※ 調査場所：水稻栽培ほ場内 調査方法：すくい取り法（捕虫網による20回振り）
※ 平年値は過去10年間の調査結果の平均値
太田市Aおよび板倉町Cの調査は今年度からであるため、平年値はない。

I 調査方法の概要

- ・ すくい取り調査（7月6半旬調査）を、7月28日～30日に、県内21地点の「水田」で実施した。
- ・ 「平年値比較」を太田市A、板倉町Cを除く19地点で実施した。
- ・ 「県平均」の値は、この2地点を除く19地点の平均値とした。
- ・ 「東部平均」の値は、この2地点を除く7地点の平均値とした。
- ・ なお、捕獲地点数には、平年値がない太田市A、板倉町Cを含めた。

II 結果の概要

1 ヒメトビウンカ

- ・ 県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数および合計数ともに平年並であった。
- ・ 地域別の捕獲数は、成虫数は5地域すべてで平年並であったが、幼虫数および合計数は中部地域で平年より多く、西部地域および東部地域で平年より少なく、吾妻地域および利根沼田地域では平年並であった。
- ・ 成虫が捕獲された地点は16地点であった。
このうち、平年値比較が可能な15地点では、安中市で平年より多く、他の14地点では平年並であった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった渋川市、館林市で平年より少なく、東吾妻町、邑楽町では平年並であった。
- ・ 幼虫が捕獲された地点は13地点であり、前橋市A、伊勢崎市、藤岡市、板倉町Aで平年より多く、前橋市B、富岡市、館林市、板倉町Bで平年より少なく、他の5地点で平年並であった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった高崎市および安中市では平年より少なく、他の4地点では平年並であった。
- ・ 合計数が1頭以上の18地点では、前橋市A、伊勢崎市、藤岡市、板倉町Aの4地点で平年より多く、7地点で平年より少なく、6地点で平年並であった。
平年値比較が可能で合計数が0であった渋川市では平年より少なく、東吾妻町では平年並であった。

2 ツマグロヨコバイ

- ・ 県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数および合計数ともに平年並であった。
- ・ 地域別の捕獲数は、5地域すべてで成虫数、幼虫数、合計数ともに平年並であった。
- ・ 成虫が捕獲された地点は高崎市吉井町、安中市、沼田市の3地点であり、いずれの地点も平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が0であった16地点では、板倉町Bで平年より少なく、他の15地点では平年並であった。

- ・ 幼虫が捕獲されたのは板倉町Bのみで、その捕獲数は平年より少なかった。

平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の18地点では平年並であった。

- ・ 合計数が1頭以上の4地点は板倉町Bのみで、その数は平年より少なく、他の3地点では平年並であった。

平年値比較が可能で合計数が0であった他の15地点では平年並であった。

3 セジロウンカ

- ・ 県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数および合計数ともに平年並であった。
- ・ 地域別の捕獲数は、5地域すべてで成虫数、幼虫数、合計数ともに平年並であった。
- ・ 成虫が捕獲された地点は無かったが、平年値比較が可能な19地点では平年並であった。
- ・ 幼虫が捕獲されたのは板倉町Bのみで、その捕獲数は平年より多かった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった18地点ではいずれも平年並であった。
- ・ 合計数が1頭以上の地点は板倉町Bのみで、その数は平年より多かった。
平年値比較が可能で合計数が0であった他の18地点では平年並であった。

7月6半旬 ウンカヨコバイ多少表

地域	調査地点	ヒメビウンカ			ツマグロヨコバイ			セジロウンカ		
		成虫	幼虫	合計	成虫	幼虫	合計	成虫	幼虫	合計
中部	前橋市A	並	多	多	並	並	並	並	並	並
	前橋市B	並	少	並	並	並	並	並	並	並
	伊勢崎市	並	多	多	並	並	並	並	並	並
	渋川市	少	並	少	並	並	並	並	並	並
	中部平均	並	多	多	並	並	並	並	並	並
西部	高崎市	並	少	少	並	並	並	並	並	並
	高崎市吉井町	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	藤岡市	並	多	多	並	並	並	並	並	並
	富岡市	並	少	少	並	並	並	並	並	並
	安中市	多	少	少	並	並	並	並	並	並
	西部平均	並	少	少	並	並	並	並	並	並
吾妻	中之条町	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	東吾妻町	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	吾妻平均	並	並	並	並	並	並	並	並	並
利根沼田	沼田市	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	利根沼田平均	並	並	並	並	並	並	並	並	並
東部	太田市A	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	太田市B	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	桐生市新里町	並	並	少	並	並	並	並	並	並
	みどり市笠懸町	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	館林市	少	少	少	並	並	並	並	並	並
	邑楽町	並	並	少	並	並	並	並	並	並
	板倉町A	並	多	多	並	並	並	並	並	並
	板倉町B	並	少	少	少	少	少	並	多	多
	板倉町C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	東部平均	並	少	少	並	並	並	並	並	並
県平均		並	並	並	並	並	並	並	並	並

※「多・並・少」の判定基準について

多:調査値が平年値の2倍以上であり、かつ平年値との差が10頭以上の場合

少:調査値が平年値の1/2以下であり、かつ平年値との差が10頭以上の場合

並:上記の「多」および「少」のいずれにも該当しない場合