

発生予察情報 令和8年度斑点米カメムシ類定点調査結果(7月6半旬)

群馬県農業技術センター(病害虫防除所) 土壌・病害虫部 発生予察係

表1 水田内すくい取り調査結果(20回振り)

地域	調査地点	イネカメムシ				クモヘリカメムシ				ホソハリカメムシ				ミナミアオカメムシ				アカヒゲホソドリカスミカメ				アカスジカスミカメ				調査日
		成虫		幼虫		成虫		幼虫		成虫		幼虫		成虫		幼虫		成虫		幼虫		成虫		幼虫		
		本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	
中部	前橋市A	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7/30
	前橋市B	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.2	0	0.0	0	0.0	7/30
	伊勢崎市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	0.6	1	0.0	0	0.0	7/30
	渋川市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.5	0	1.7	0	0.0	0	0.0	7/30
	中部平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	
西部	高崎市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	7/28
	高崎市吉井町	0	0.0	0	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.4	1	0.0	0	0.0	0	0.0	7/28
	藤岡市	0	0.0	0	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7/28
	富岡市	0	0.0	0	0.0	3	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.8	0	0.0	6	0.8	1	0.0	7/28
	安中市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.8	0	0.0	0	0.1	0	0.0	7/28
	西部平均	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	1.2	0.2	0.2	0.0	
吾妻	中之条町	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7/29
	東吾妻町	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7/29
	吾妻平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
利根	沼田市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.2	0	0.0	7/29
	利根平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	
東部	太田市A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	0	-	0	-	7/29
	太田市B	0	13.5	0	3.0	0	0.2	0	0.6	0	0.0	0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.5	0	0.5	0	0.1	0	0.0	7/29
	太田市C	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	7/31
	桐生市新里町	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	7/30
	みどり市笠懸町	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	7/30
	館林市	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1	0	0.1	7/29
	邑楽町	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.5	0	0.5	0	0.0	0	0.1	7/29
	板倉町A	0	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.2	0	0.2	0	0.0	0	0.0	7/30
	板倉町B	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	2.3	0	0.4	0	0.2	7/30
	板倉町C	0	0.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-	7/30
東部平均	0.0	1.8	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.3	0.7	0.0	0.1	0.0	0.1		
県平均		0.0	0.7	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	

表2 雑草地すくい取り調査（20回振り）

地域	調査地点	雑草種	イネカメムシ				クモヘリカメムシ				ホソハリカメムシ				ミナミアオカメムシ				アカヒゲホソミドリカスミカメ				アカスジカスミカメ				調査日
			成虫		幼虫		成虫		幼虫		成虫		幼虫		成虫		幼虫		成虫		幼虫		成虫		幼虫		
			本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	
中部	前橋市A	メヒシバオヒシバ	0	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	48	58.7	11	34.8	0	0.0	0	0.0	7/30
	前橋市B	メヒシバオヒシバ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.3	0	0.2	0	0.0	0	0.0	78	20.1	49	17.8	24	3.7	0	0.3	7/30
	伊勢崎市	メヒシバ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	0	0.9	0	0.0	0	0.0	79	24.6	147	20.1	47	6.4	15	0.2	7/30
	渋川市	エノコログサ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.0	0	0.3	0	0.0	0	0.0	0	8.2	0	17.2	0	2.3	0	0.0	7/30
	中部平均		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	27.9	51.8	22.5	17.8	3.1	3.8	0.1	
西部	高崎市	オヒシバ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	0	0.0	0	0.0	27	19.7	44	23.1	0	0.1	0	0.0	7/28
	高崎市吉井町	オヒシバ	0	0.0	0	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	1.1	0	0.0	0	0.0	33	9.1	49	5.0	29	0.0	7	0.0	7/28
	藤岡市	オヒシバ	0	1.0	0	1.0	0	4.2	0	15.1	24	2.5	10	1.8	0	0.0	0	0.0	10	10.2	0	27.6	16	23.1	0	2.7	7/28
	富岡市	エノコログサ	0	0.0	0	0.0	0	0.3	0	5.4	0	1.3	0	1.4	0	0.0	0	0.0	1	20.9	0	21.2	1	7.8	0	0.6	7/28
	安中市	ホソムギ	0	0.0	0	0.0	0	0.2	0	0.1	13	0.1	10	0.2	0	0.0	0	0.0	14	2.1	28	2.6	18	1.0	0	0.0	7/28
	西部平均		0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	4.1	7.6	1.2	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	12.4	24.2	15.9	12.8	6.4	1.4	0.7	
吾妻	中之条町	メヒシバ	0	0.0	0	0.0	44	0.6	18	0.0	2	1.5	12	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.8	5	1.6	1	1.1	0	0.0	7/29
	東吾妻町	エノコログサ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.1	0	0.3	0	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.7	0	2.7	0	0.0	0	0.0	7/29
	吾妻平均		0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.3	9.0	0.6	1.0	0.9	6.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	2.5	2.2	0.5	0.6	0.0	0.0	
利根	沼田市	メヒシバ	0	0.0	0	0.0	0	0.5	0	0.6	6	1.5	3	0.4	0	0.0	0	0.0	22	3.8	13	6.3	29	3.1	0	0.3	7/30
	利根沼田平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	6.0	1.5	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	3.8	13.0	6.3	29.0	3.1	0.0	0.3	
東部	太田市A	エノコログサ	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	-	0	-	0	-	7/29
	太田市B	メヒシバオヒシバ	0	0.0	11	3.5	0	0.6	0	2.9	4	0.9	0	0.9	0	0.0	0	0.0	21	21.8	30	21.6	0	0.2	0	0.0	7/29
	太田市C	メヒシバ	0	-	0	-	0	-	0	-	3	-	0	-	0	-	0	-	31	-	10	-	8	-	0	-	7/31
	桐生市新里町	メヒシバオヒシバ	0	0.0	4	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.6	3	2.3	0	0.0	0	0.0	20	13.1	22	5.9	20	1.1	1	0.0	7/30
	みどり市笠懸町	メヒシバオヒシバ	0	0.0	0	0.0	0	0.1	0	0.1	0	3.0	0	2.7	0	0.0	0	0.0	33	24.7	6	17.1	0	0.1	0	0.0	7/30
	館林市	メヒシバ	0	1.5	0	2.5	0	0.1	0	0.0	4	1.3	3	1.1	0	0.0	0	0.0	4	13.2	5	14.5	2	2.1	0	0.8	7/29
	邑楽町	メヒシバオヒシバ	0	1.0	1	0.0	0	0.0	0	0.1	0	2.3	0	2.0	0	0.0	0	0.0	10	34.0	12	24.2	3	0.4	0	0.4	7/29
	板倉町A	メヒシバオヒシバ	0	0.0	0	3.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	1	2.6	0	0.0	0	0.0	21	15.6	33	73.9	4	12.0	0	0.9	7/30
	板倉町B	メヒシバ	0	0.0	0	1.5	0	0.0	0	0.0	4	1.8	3	2.3	0	0.0	0	0.0	1	20.1	3	13.9	0	4.1	0	0.5	7/30
	板倉町C	メヒシバ	0	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	0.0	5	0.0	0	0.0	0	0.0	31	-	49	-	17	-	0	-	7/30
	東部平均		0.0	0.4	1.6	1.3	0.0	0.1	0.0	0.4	4.1	1.8	1.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	20.4	17.3	24.4	5.4	2.9	0.1	0.4	
県平均		0.0	0.2	0.7	0.6	2.0	0.3	0.8	1.2	4.2	1.3	2.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	16.1	23.6	17.6	10.0	3.4	1.0	0.3		

※ 平年値は、過去10年間の平均値である。

※ 平年の「—」は、過去の調査結果が無く、平年値がないことを示す。

I 調査方法の概要

- ・斑点米カメムシ類のすくい取り調査（7月6半旬調査）を、7月28日～31日に、県内22地点の「水田」および「畦畔又は雑草地（以下「雑草地」という）」で実施した。
- ・イネカメムシおよびミナミアオカメムシについては、過去2か年の平均または昨年の調査結果を平年値として示した。
- ・平年値比較と県平均値、東部地域平均値について
 - * 1 イネカメムシ、クモヘリカメムシ、ホソハリカメムシ、ミナミアオカメムシの「平年値比較」を、平年値が無い太田市Aおよび太田市Cを除く20地点で実施した。「県平均」の値は、20地点の平均値とした。「東部平均」の値は、この2地点を除く8地点の平均値とした。
 - * 2 アカヒゲホソミドリカスミカメおよびアカスジカスミカメの「平年値比較」を、平年値が無い太田市A、太田市C、板倉町Cを除く19地点で実施した。「県平均」の値は、19地点の平均値とした。「東部平均」の値は、この3地点を除く7地点の平均値とした。

なお、捕獲地点数には、平年値がない地点も含めた。

II 調査結果の概要

1) イネカメムシ（平年値比較を22調査地点中20地点で実施^{*1}）

（1）水田内

- ・県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・地域別の平均捕獲数は、5地域すべてで成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・成虫が捕獲された地点は無かったが、平年値比較が可能な20地点では、太田市Bで平年より少なく、他の19地点では平年並であった。
- ・幼虫が捕獲された地点は板倉町Cのみで、その捕獲数は平年並であった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の19地点でも平年並であった。

(2) 雑草地

- ・ 県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・ 地域別の平均捕獲数は、5地域すべてで成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・ 成虫が捕獲された地点は無かったが、平年値比較が可能な20地点では平年並であった。
- ・ 幼虫が捕獲された地点は太田市B、桐生市新里町、邑楽町の3地点であり、いずれの地点も平年並であった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の17地点でも平年並であった。

2) クモヘリカメムシ (平年値比較を22調査地点中20地点で実施^{*1)})

(1) 水田内

- ・ 県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・ 地域別の平均捕獲数は、5地域すべてで成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・ 成虫が捕獲された地点は富岡市のみで、その捕獲数は平年並であった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の19地点でも平年並であった。
- ・ 幼虫が捕獲された地点は富岡市のみで、その捕獲数は平年並であった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の19地点でも平年並であった。

(2) 雑草地等

- ・ 県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・ 地域別の平均捕獲数は、吾妻地域で成虫数が平年より多かったことを除き、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・ 成虫が捕獲された地点は中之条町のみで、その捕獲数は平年より多かった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の19地点では平年並であった。
- ・ 幼虫が捕獲された地点は中之条町のみで、その捕獲数は平年より多かった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の19地点では、藤岡市で平年より少なく、他の18地点では平年並であつ

た。

3) ホソハリカメムシ（平年値比較を22調査地点中20地点で実施^{*1)}

(1) 水田内

- ・ 県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・ 地域別の平均捕獲数は、5地域すべてで成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・ 成虫が捕獲された地点は高崎市、安中市、館林市の3地点であり、いずれの地点も平年並であった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の17地点でも平年並であった。
- ・ 幼虫が捕獲された地点はみどり市笠懸町のみで、その捕獲数は平年並であった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の19地点でも平年並であった。

(2) 雑草地等

- ・ 県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・ 地域別の平均捕獲数は、5地域すべてで成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・ 成虫が捕獲された地点は14地点であった。
このうち、平年値比較が可能な13地点では、藤岡市、安中市、板倉町Cで平年より多く、他の10地点では平年並であった。
平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の7地点では平年並であった。
- ・ 幼虫が捕獲された地点は9地点であり、安中市および中之条町で平年より多く、他の7地点では平年並であった。
- ・ 平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の11地点の捕獲数は平年並であった。

4) ミナミアオカメムシ（平年値比較を22調査地点中20地点で実施^{*1)}

(1) 水田内（平年値比較を22調査地点中20地点で実施^{*2)}

- ・調査した全地点で、成虫および幼虫の捕獲数は0であった。
- ・県平均、地域平均および各地点の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。

(2) 雑草地等（平年値比較を22調査地点中20地点で実施^{*2}）

- ・調査した全地点で、成虫および幼虫の捕獲数は0であった。
- ・県平均、地域平均および各地点の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。

5) アカヒゲホソミドリカスミカメ（平年値比較を22調査地点中19地点で実施^{*2}）

(1) 水田内

- ・県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・地域別の平均捕獲数は、5地域すべてで成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・成虫が捕獲された地点は前橋市A、前橋市B、伊勢崎市、太田市A、板倉町Bの5地点であった。

このうち、平年値比較が可能な4地点では平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の15地点でも平年並であった。

- ・幼虫が捕獲された地点は伊勢崎市、高崎市、高崎市吉井町、太田市A、桐生市新里町、みどり市笠懸町の6地点であった。

このうち、平年値比較が可能な5地点では平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の14地点でも平年並であった。

(2) 雑草地等

- ・県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・地域別の平均捕獲数は、中部地域では幼虫数が、利根沼田地域では成虫数が平年より多かったことを除き、平年並であった。

- ・成虫が捕獲された地点は 19 地点であった。

このうち、平年値比較が可能な 17 地点では、前橋市B、伊勢崎市、高崎市吉井町、安中市、沼田市で平年より多く、富岡市、邑楽町、板倉町Bで平年より少なく、他の 9 地点では平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が 0 であった渋川市および東吾妻町で平年並であった。

- ・幼虫が捕獲された地点は 18 地点であった。

このうち平年値比較が可能な 15 地点では、前橋市B、伊勢崎市、高崎市吉井町、安中市、桐生市新里町で平年より多く、前橋市A、みどり市笠懸町、邑楽町、板倉町A、板倉町Bで平年より少なく、他の 5 地点では平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が 0 であった渋川市、藤岡市、富岡市で平年より少なく、東吾妻町で平年並であった。

6) アカスジカスミカメ（平年値比較を 22 調査地点中 19 地点で実施^{*2}）

（1）水田内

- ・県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・地域別の平均捕獲数は、5 地域すべてで、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・成虫が捕獲された地点は伊勢崎市および富岡市の 2 地点であり、いずれの地点も平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が 0 であった他の 17 地点でも平年並であった。

- ・幼虫が捕獲された地点は富岡市のみで、その捕獲数は平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が 0 であった他の 18 地点でも平年並であった。

（2）雑草地等

- ・県平均の捕獲数は、成虫数、幼虫数ともに平年並であった。
- ・地域別の平均捕獲数は、中部地域、利根沼田地域で成虫数が平年より多かったことを除き、平年並であった。
- ・成虫が捕獲された地点は 14 地点であった。

このうち、平年値比較が可能な 12 地点では、前橋市B、伊勢崎市、高崎市吉井町、安中市、沼田市、桐生市新里町で

平年より多く、他の6地点では平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の7地点では平年並であった。

- ・ 幼虫が捕獲された地点は伊勢崎市、高崎市吉井町、桐生市新里町の3地点であり、伊勢崎市では平年より多く、他の2地点では平年並であった。

平年値比較が可能で捕獲数が0であった他の16地点では平年並であった。

Ⅲ まとめ

- ・ 7月6半旬のすくい取り調査結果では、水田内の斑点米カメムシ類は全般に平年並であった。一方、雑草地の斑点米カメムシ類では、クモヘリカメムシ、ホソハリカメムシ、アカヒゲホソミドリカスミカメおよびアカスジカスミカメの捕獲数が一部地点で平年より多かった。

Ⅳ 防除対策（雑草地等の除草）

- ・ 出穂期2週間前以降の雑草地の除草は、斑点米カメムシ類を水田に追い込む可能性があるため、水田周辺の除草は、次の点に注意して実施する。

穂が出ているイネ科雑草の除草は、イネの出穂期2週間前までに行う。

イネの出穂期前後に、イネ科雑草の穂が出ていなければ再度除草を行う。

ただし、出穂期2週間前以降、穂が出ているイネ科雑草を除草すると、そこに生息する斑点米カメムシ類を水田に追い込むこととなるので控える。

Ⅴ 防除対策（農薬散布）

- ・ 出穂期前後を中心に水田を見回り、斑点米カメムシ類の侵入を確認した場合は、適期防除を行う。
- ・ イネカメムシの防除は、出穂期および出穂期8～10日後の2回防除が有効である。
- ・ その他の斑点米カメムシ類の防除は、穂揃期および1回目の防除の7～10日後の2回防除が有効である。

- ・ イネカメムシとその他の斑点米カメムシ類が同時に生息する水田では、被害が大きいイネカメムシを対象とした防除体系を実施する。
- ・ 薬剤抵抗性の発達を防ぐために、同一系統薬剤の2回散布は避ける。

表3 7月6半旬 斑点米カメムシ類 多少表(水田内)

地域	調査地点	イネカメムシ		クモヘリカメムシ		ホソハリカメムシ		ミナミアオカメムシ		アカヒゲホソミドリカスミカメ		アカスジカスミカメ	
		成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫
中部	前橋市A	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	前橋市B	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	伊勢崎市	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	渋川市	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	中部平均	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
西部	高崎市	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	高崎市吉井町	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	藤岡市	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	富岡市	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	安中市	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	西部平均	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
吾妻	中之条町	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	東吾妻町	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	吾妻平均	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
利根沼田	沼田市	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	利根沼田平均	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
東部	太田市A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	太田市B	少	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	太田市C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	桐生市新里町	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	みどり市笠懸町	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	館林市	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	呂宋町	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	板倉町A	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	板倉町B	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	板倉町C	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	東部平均	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
県平均		並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並

※「多・並・少」の判定基準について

多:調査値が平年値の2倍以上であり、かつ平年値との差が10頭以上の場合
少:調査値が平年値の1/2以下であり、かつ平年値との差が10頭以上の場合
並:上記の「多」および「少」のいずれにも該当しない場合

表 4 7月6半旬 斑点米カメムシ類 多少表（雑草地）

地域	調査地点	雑草種	イネカメムシ		クモヘリカメムシ		ホソハリカメムシ		ミナミアオカメムシ		アカヒゲホソドリカスミカメ		アカスジカスミカメ	
			成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫
中部	前橋市A	メヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	並	少	並	並
	前橋市B	メヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	多	多	多	並
	伊勢崎市	メヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	多	多	多	多
	渋川市	エノコログサ	並	並	並	並	並	並	並	並	並	少	並	並
	中部平均		並	並	並	並	並	並	並	並	並	多	多	並
西部	高崎市	オヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	高崎市吉井町	オヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	多	多	多	並
	藤岡市	オヒシバ	並	並	並	少	多	並	並	並	並	少	並	並
	富岡市	エノコログサ	並	並	並	並	並	並	並	並	少	少	並	並
	安中市	ホソムギ	並	並	並	並	多	多	並	並	多	多	多	並
	西部平均		並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
吾妻	中之条町	メヒシバ	並	並	多	多	並	多	並	並	並	並	並	並
	東吾妻町	エノコログサ	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	吾妻平均		並	並	多	並	並	並	並	並	並	並	並	並
利根沼田	沼田市	メヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	多	並	多	並
	利根沼田平均		並	並	並	並	並	並	並	並	多	並	多	並
東部	太田市A	エノコログサ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	太田市B	メヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	太田市C	メヒシバ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	桐生市新里町	メヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	並	多	多	並
	みどり市笠懸町	メヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	並	少	並	並
	館林市	メヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	邑楽町	メヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	少	少	並	並
	板倉町A	メヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	並	少	並	並
	板倉町B	メヒシバ	並	並	並	並	並	並	並	並	少	少	並	並
	板倉町C	メヒシバ	並	並	並	並	多	並	並	並	—	—	—	—
	東部平均		並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
県平均			並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並

※「多・並・少」の判定基準について

多:調査値が平年値の2倍以上であり、かつ平年値との差が10頭以上の場合
少:調査値が平年値の1/2以下であり、かつ平年値との差が10頭以上の場合
並:上記の「多」および「少」のいずれにも該当しない場合