


各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部　発生予察係
令和8年11月13日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。









・グラフの見方
縦軸は誘殺数（頭数）で、それぞれの半旬（5日間）の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬（1日～5日）を表します。
・誘殺方法
有翅アブラムシ類（伊勢崎市西小保方町）：黄色水盤
（館林市当郷、沼田市井戸上町）：黄色粘着トラップ
・館林市当郷と沼田市井戸上町の調査期間は、3月～11月です


各種トラップ調査結果


群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部　発生予察係
令和8年11月13日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。









・グラフの見方
縦軸は誘殺数（頭数）で、それぞれの半旬（5日間）の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬（1日～5日）を表します。
・誘殺方法
フェロモントラップ


各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部　発生予察係
令和8年11月13日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。


オオタバコガ：前橋市江木町

〔性フェロモントラップ、水田〕




オオタバコガ：伊勢崎市西小保方町

〔性フェロモントラップ、畑〕




オオタバコガ：藤岡市本郷

〔性フェロモントラップ、トマトハウス外〕




オオタバコガ：東吾妻町植栗

〔性フェロモントラップ、キクハウス外〕




オオタバコガ：昭和村糸井

〔性フェロモントラップ、レタス〕




オオタバコガ：太田市前小屋町

〔性フェロモントラップ、露地ナス〕



オオタバコガ：嬬恋村田代

〔性フェロモントラップ、キャベツ〕





・グラフの見方
縦軸は誘殺数（頭数）で、それぞれの半旬（5日間）の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬（1日～5日）を表します。
・誘殺方法
フェロモントラップ


各種トラップ調査結果


群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部　発生予察係
令和8年11月13日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。









・グラフの見方
縦軸は誘殺数（頭数）で、それぞれの半旬（5日間）の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬（1日～5日）を表します。
・誘殺方法
フェロモントラップ


各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部　発生予察係
令和8年11月13日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。


コナガ：伊勢崎市波志江町

〔性フェロモントラップ、キャベツ〕




コナガ：渋川市赤城町

〔性フェロモントラップ、キャベツ〕



コナガ：嬬恋村田代

〔性フェロモントラップ、キャベツ〕





・グラフの見方
縦軸は誘殺数（頭数）で、それぞれの半旬（5日間）の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬（1日～5日）を表します。
・誘殺方法


各種トラップ調査結果


群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部　発生予察係
令和8年11月13日更新


※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。













・グラフの見方
縦軸は誘殺数（頭数）で、それぞれの半旬（5日間）の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬（1日～5日）を表します。
・誘殺方法


各種トラップ調査結果

群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部　発生予察係
令和8年11月13日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意くださ








・グラフの見方
縦軸は誘殺数（頭数）で、それぞれの半旬（5日間）の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬（1日～5日）を表します。
・誘殺方法
イチモンジセセリ：粘着トラップ　地面から垂直に設置、3反復の平均値
フタオビコヤガ：フェロモントラップ


フタオビコヤガ：フェロモントラップ


各種トラップ調査結果


群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部　発生予察係
令和8年11月13日更新


※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。













・グラフの見方
縦軸は誘殺数（頭数）で、それぞれの半旬（5日間）の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬（1日～5日）を表します。
・誘殺方法
フェロモントラップ


各種トラップ調査結果


群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部　発生予察係
令和8年11月13日更新


※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。
















・グラフの見方
縦軸は誘殺数（頭数）で、それぞれの半旬（5日間）の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬（1日～5日）を表します。
・誘殺方法


各種トラップ調査結果


群馬県農業技術センター
土壌・病害虫部　発生予察係
令和8年11月13日更新

※同じ害虫でも、地点によって縦軸のスケールが異なっている場合がありますのでご注意ください。









・グラフの見方
縦軸は誘殺数（頭数）で、それぞれの半旬（5日間）の合計値です。
横軸の上段『1』は1半旬（1日～5日）を表します。
・誘殺方法
フェロモントラップ