

(身体状況調査)

表45 BMIの平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性・15歳以上〔妊婦除外〕

	性年齢	人数	平均	標準偏差		標準誤差		P1	P5	P10	P25	中央値			P95	P99	最大値
				標準偏差	標準誤差	最小値	最大値					P75	P90	P95			
総数	15～19歳	34	21.7	2.7	0.5	17.3	17.3	17.3	18.2	19.0	19.4	21.2	22.7	26.3	26.5	32.2	32.2
	20～29歳	53	23.5	4.9	1.1	17.1	17.1	17.1	17.7	18.0	19.9	22.3	26.5	31.7	33.5	35.5	35.5
	30～39歳	88	22.1	3.7	0.4	15.1	15.4	15.4	17.6	18.2	19.8	21.5	23.7	27.3	29.1	35.3	35.3
	40～49歳	158	24.0	4.5	0.4	16.5	17.5	17.5	18.4	18.8	20.8	23.5	26.6	28.7	30.2	43.5	47.3
	50～59歳	113	22.7	2.9	0.3	17.1	17.1	17.1	18.5	19.3	20.5	22.1	24.3	26.5	27.8	34.1	34.2
	60～69歳	142	23.5	4.0	0.4	14.9	15.5	15.5	17.5	18.4	20.7	23.4	25.7	28.4	30.8	35.2	35.9
	70歳以上	198	23.1	3.0	0.3	12.8	15.7	15.7	17.9	19.0	21.2	23.2	25.0	26.7	27.2	30.2	31.5
	(再掲)20歳以上	752	23.2	3.7	0.2	12.8	15.9	15.9	18.0	18.7	20.7	22.8	25.4	27.8	29.6	34.0	47.3
	(再掲)65～74歳	162	23.3	3.5	0.4	12.8	15.3	15.3	17.9	18.4	20.8	23.3	25.4	27.5	29.8	32.6	33.1
	(再掲)75歳以上	124	22.9	2.8	0.3	15.5	15.6	15.6	16.9	19.0	21.2	23.1	25.0	26.5	27.0	29.5	29.7
	(再掲)20歳以上※1	752	23.1	3.8	0.2	12.8	15.9	15.9	17.9	18.5	20.5	22.5	25.3	27.8	29.5	34.1	47.3
	(再掲)20～49歳※1	299	23.0	4.3	0.5	15.1	15.8	15.8	17.9	18.2	20.0	22.0	25.6	28.4	30.2	35.4	47.3
	(再掲)65～74歳※1	162	23.2	3.5	0.3	12.8	15.1	15.1	17.8	18.4	20.9	23.3	25.4	27.3	29.5	32.6	33.1
	(再掲)75歳以上※1	124	22.9	2.8	0.3	15.5	15.6	15.6	17.1	18.9	21.2	23.1	24.9	26.5	27.0	29.5	29.7
男性	15～19歳	20	22.5	3.2	0.8	17.3	17.3	17.3	17.8	18.4	21.1	22.6	24.7	26.4	31.8	32.2	32.2
	20～29歳	27	24.9	4.8	1.2	17.9	17.9	17.9	17.9	18.1	21.3	23.7	28.4	32.0	34.0	35.5	35.5
	30～39歳	43	23.8	3.6	0.7	17.5	17.8	17.8	19.5	19.9	21.3	22.6	27.0	28.5	31.8	34.1	34.1
	40～49歳	76	25.0	4.9	0.6	18.0	18.1	18.1	19.4	20.5	21.6	24.2	27.7	30.1	31.6	47.3	47.3
	50～59歳	53	23.0	2.8	0.5	17.9	18.3	18.3	19.1	19.6	21.2	22.5	24.9	27.1	27.9	34.2	34.2
	60～69歳	65	22.9	3.1	0.4	16.9	16.9	16.9	18.2	18.4	20.6	23.6	24.9	25.8	28.3	30.8	30.8
	70歳以上	77	23.8	2.2	0.3	17.7	19.0	19.0	20.6	20.9	22.0	23.6	25.9	26.7	27.0	31.5	31.5
	(再掲)20歳以上	341	23.8	3.6	0.4	16.9	17.5	17.5	18.7	19.9	21.4	23.5	25.7	28.0	29.9	34.2	47.3
	(再掲)65～74歳	70	23.0	2.9	0.4	16.9	16.9	16.9	18.0	18.4	20.7	23.4	24.9	26.0	27.3	31.5	31.5
	(再掲)75歳以上	49	23.7	2.2	0.3	17.7	18.7	18.7	20.8	20.9	21.9	23.6	25.9	26.7	27.0	29.7	29.7
	(再掲)20歳以上※1	341	23.7	3.6	0.4	16.9	17.5	17.5	18.5	19.6	21.3	23.4	25.7	28.0	29.7	34.2	47.3
	(再掲)20～49歳※1	146	24.3	4.5	0.7	17.5	17.6	17.6	18.7	19.7	21.2	23.5	27.1	29.5	32.2	43.5	47.3
	(再掲)65～74歳※1	70	23.0	2.9	0.3	16.9	16.9	16.9	18.0	18.4	20.7	23.5	24.9	25.9	27.1	31.5	31.5
	(再掲)75歳以上※1	49	23.6	2.3	0.4	17.7	17.7	17.7	20.8	20.8	22.0	23.4	25.9	26.7	27.0	29.7	29.7
女性	15～19歳	14	20.6	1.3	0.5	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.4	20.5	21.7	22.6	23.3	23.3	23.3
	20～29歳	26	21.8	4.6	1.1	17.1	17.1	17.1	17.3	17.6	18.5	20.4	23.0	29.5	33.9	35.1	35.1
	30～39歳	45	20.2	2.8	0.5	15.1	15.1	15.1	15.9	17.3	18.2	19.8	21.3	23.2	26.0	35.3	35.3
	40～49歳	82	23.0	3.8	0.2	16.5	17.2	17.2	17.9	18.4	19.8	22.5	25.5	28.4	29.5	35.5	35.5
	50～59歳	60	22.4	2.9	0.4	17.1	17.1	17.1	18.2	18.6	20.3	21.9	24.0	26.1	27.8	33.7	33.7
	60～69歳	77	23.9	4.7	0.7	14.9	15.2	15.2	16.9	17.9	20.7	23.3	26.8	30.1	33.4	35.9	35.9
	70歳以上	121	22.7	3.3	0.4	12.8	15.5	15.5	16.9	18.5	20.0	23.1	24.8	26.8	28.0	30.2	30.3
	(再掲)20歳以上	411	22.7	3.8	0.3	12.8	15.7	15.7	17.6	18.2	19.9	22.4	24.8	27.8	29.6	34.0	35.9
	(再掲)65～74歳	92	23.5	3.9	0.7	12.8	15.0	15.0	17.8	18.0	20.7	23.3	26.1	28.5	30.3	33.1	33.1
	(再掲)75歳以上	75	22.3	3.1	0.3	15.5	15.6	15.6	16.8	18.3	19.9	22.8	24.5	26.2	26.7	29.1	29.1
	(再掲)20歳以上※1	411	22.5	3.8	0.3	12.8	15.6	15.6	17.2	18.1	19.8	22.2	24.7	27.8	29.4	34.2	35.9
	(再掲)20～49歳※1	153	21.7	3.8	0.4	15.1	15.2	15.2	17.2	17.9	18.7	20.7	23.9	27.8	29.1	35.1	35.5
	(再掲)65～74歳※1	92	23.4	3.8	0.6	12.8	14.0	14.0	17.8	18.0	21.1	23.3	26.0	28.4	30.3	33.1	33.1
	(再掲)75歳以上※1	75	22.4	3.1	0.3	15.5	15.6	15.6	16.8	18.1	20.0	22.9	24.6	26.2	27.1	29.1	29.1

注1) 身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦6名を除外している。

注2) BMIは体重(kg)÷身長(m)²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。
注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1) 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表46-1 BMIの状況 - 年齢階級別、肥満度別(BMI別)、割合、標準誤差 - 総数・男性・女性・15歳以上〔妊婦除外〕

性年齢	人数	やせ 18.5未満		普通 18.5以上25未満		肥満 25以上		(再掲) 20以下		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	15～19歳	34	6.0%	3.9%	82.6%	6.4%	11.5%	5.2%	31.9%	12.5%
	20～29歳	53	16.9%	8.1%	50.7%	7.6%	32.5%	10.1%	25.3%	9.3%
	30～39歳	88	17.5%	5.7%	63.8%	6.5%	18.7%	5.4%	27.5%	5.3%
	40～49歳	158	4.7%	1.8%	62.1%	6.5%	33.2%	5.3%	18.5%	2.2%
	50～59歳	113	2.7%	1.6%	76.8%	5.2%	20.5%	5.3%	17.0%	1.7%
	60～69歳	142	11.5%	1.8%	57.2%	5.8%	31.4%	5.5%	18.1%	3.0%
	70歳以上	198	6.2%	3.1%	67.4%	4.5%	26.4%	4.7%	17.2%	3.8%
	(再掲)20歳以上	752	8.4%	1.1%	64.3%	2.8%	27.3%	3.7%	19.2%	1.3%
	(再掲)65～74歳	162	11.8%	1.7%	59.4%	5.5%	28.9%	4.9%	18.6%	2.4%
	(再掲)75歳以上	124	9.0%	2.8%	68.1%	6.2%	25.9%	7.3%	17.7%	2.6%
	(再掲)20歳以上※1	752	9.5%	1.4%	63.8%	2.5%	26.6%	3.5%	20.4%	1.5%
	(再掲)20～49歳※1	299	12.7%	2.0%	60.4%	3.8%	26.9%	4.8%	25.2%	3.2%
	(再掲)65～74歳※1	162	11.2%	1.7%	60.2%	5.1%	28.6%	4.4%	17.6%	2.3%
	(再掲)75歳以上※1	124	6.5%	2.7%	68.0%	5.8%	25.4%	4.4%	17.5%	2.5%
	15～19歳	20	10.3%	6.3%	69.8%	10.0%	19.8%	8.7%	20.5%	10.6%
	20～29歳	27	10.6%	8.8%	45.7%	8.8%	43.7%	13.9%	13.1%	9.5%
	30～39歳	43	1.8%	1.2%	68.1%	10.4%	30.1%	9.9%	6.5%	3.7%
	40～49歳	76	0.6%	0.6%	57.8%	5.6%	41.6%	5.7%	8.5%	3.3%
	50～59歳	53	0.6%	0.6%	74.0%	8.0%	25.4%	8.0%	14.6%	6.5%
60～69歳	65	11.8%	3.8%	64.2%	5.7%	24.0%	5.0%	19.4%	2.5%	
70歳以上	77	0.4%	0.4%	68.1%	6.1%	31.5%	6.2%	1.7%	1.3%	
(再掲)20歳以上	341	3.9%	1.5%	64.6%	5.0%	31.5%	6.0%	10.4%	1.8%	
(再掲)20～69歳	264	5.9%	2.3%	63.2%	4.7%	30.9%	6.0%	14.0%	2.7%	
(再掲)65～74歳	70	10.8%	4.9%	65.7%	4.8%	23.6%	4.5%	16.2%	4.0%	
(再掲)75歳以上	49	0.6%	0.6%	68.7%	8.7%	30.7%	8.8%	1.1%	1.2%	
(再掲)20歳以上※1	341	4.9%	1.9%	64.5%	4.7%	30.6%	5.9%	11.9%	2.7%	
(再掲)20～49歳※1	146	4.1%	2.4%	59.5%	6.4%	36.4%	7.4%	11.2%	4.2%	
(再掲)65～74歳※1	70	10.4%	4.3%	65.5%	4.2%	24.1%	4.0%	16.2%	3.5%	
(再掲)75歳以上※1	49	1.9%	1.9%	69.5%	8.3%	28.5%	9.0%	3.9%	3.9%	
15～19歳	14	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	47.6%	16.9%	
20～29歳	26	24.4%	14.0%	56.7%	14.1%	19.0%	8.2%	40.0%	13.9%	
30～39歳	45	35.8%	11.6%	58.7%	9.6%	5.4%	3.2%	51.9%	9.4%	
40～49歳	82	8.6%	3.8%	66.1%	7.4%	25.3%	4.9%	27.9%	4.1%	
50～59歳	60	4.4%	2.7%	79.1%	5.5%	16.4%	5.6%	18.9%	4.7%	
60～69歳	77	11.2%	3.6%	51.1%	8.0%	37.8%	7.9%	17.1%	4.9%	
70歳以上	121	9.8%	4.7%	67.1%	5.6%	23.1%	4.6%	26.8%	5.6%	
(再掲)20歳以上	411	12.1%	1.9%	64.0%	2.3%	23.8%	3.2%	26.6%	2.6%	
(再掲)40～69歳	219	8.7%	2.1%	63.8%	5.0%	27.6%	4.1%	21.6%	3.0%	
(再掲)65～74歳	92	12.5%	3.3%	54.9%	7.5%	32.6%	7.6%	20.4%	5.7%	
(再掲)75歳以上	75	9.8%	4.5%	67.6%	6.5%	22.6%	6.9%	29.3%	4.8%	
(再掲)20歳以上※1	411	13.5%	1.8%	63.3%	2.2%	23.2%	2.8%	27.8%	2.2%	
(再掲)20～49歳※1	153	21.0%	3.3%	61.3%	3.5%	17.8%	3.2%	38.7%	3.9%	
(再掲)65～74歳※1	92	11.8%	3.0%	56.3%	7.3%	31.9%	7.0%	18.6%	5.3%	
(再掲)75歳以上※1	75	10.1%	4.2%	66.9%	6.1%	23.0%	6.4%	28.3%	4.7%	

注1)身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦6名を除外している。

注2)BMIは体重(kg)/(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3)BMIの判定は下記のとおり。

低体重(やせ):18.5未満

普通:18.5以上25.0未満

肥満:25.0以上

注)値は保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表46-2 BMIの状況 - 年齢階級別、肥満度別 (BMI別)、割合、標準誤差 - 総数・男性・女性、65歳以上

性年齢	人数	やせ 18.5未満		普通 18.5以上25未満		肥満 25以上		(再掲) 20以下	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数									
65～69歳	88	15.6%	3.3%	54.3%	10.6%	30.1%	9.2%	20.4%	3.7%
70～74歳	74	6.4%	4.3%	66.4%	9.0%	27.1%	7.4%	16.2%	7.9%
75～79歳	50	3.1%	2.1%	72.8%	9.1%	24.1%	8.7%	13.2%	5.2%
80～84歳	44	5.3%	5.3%	71.7%	7.8%	23.0%	8.7%	23.9%	7.7%
80歳以上	74	7.7%	4.4%	65.3%	10.2%	27.0%	11.8%	20.3%	3.7%
85歳以上	30	10.1%	8.2%	58.8%	15.5%	31.1%	15.8%	16.7%	9.9%
(再掲)65歳以上	286	9.3%	1.8%	63.4%	4.2%	27.6%	4.9%	17.5%	1.8%
(再掲)65～69歳※1	88	15.5%	3.0%	54.5%	9.6%	30.0%	8.3%	19.8%	3.5%
(再掲)70～74歳※1	74	5.3%	3.7%	68.1%	7.9%	26.6%	6.3%	14.5%	6.7%
(再掲)75～79歳※1	50	5.9%	4.4%	70.5%	9.0%	23.6%	8.0%	16.3%	6.8%
(再掲)80～84歳※1	44	4.7%	4.7%	71.1%	7.5%	24.2%	8.4%	21.0%	7.2%
(再掲)80歳以上※1	74	6.9%	4.0%	66.5%	10.1%	26.6%	11.4%	18.2%	3.8%
(再掲)85歳以上※1	30	9.1%	7.5%	61.8%	15.0%	29.1%	15.3%	15.2%	9.0%
男性									
65～69歳	42	16.3%	6.4%	65.1%	8.5%	18.6%	7.5%	23.0%	5.6%
70～74歳	28	0.0%	0.0%	66.7%	10.3%	33.3%	10.3%	2.8%	2.1%
75～79歳	23	1.2%	1.3%	75.4%	10.2%	23.4%	10.2%	2.4%	2.5%
80～84歳	17	0.0%	0.0%	53.3%	11.7%	46.7%	11.7%	0.0%	0.0%
80歳以上	26	0.0%	0.0%	62.9%	16.6%	37.1%	16.6%	0.0%	0.0%
85歳以上	9	0.0%	0.0%	76.8%	21.2%	23.2%	21.2%	0.0%	0.0%
(再掲)65歳以上	119	6.9%	2.7%	67.2%	4.9%	26.0%	5.6%	11.0%	3.1%
(再掲)65～69歳※1	42	16.3%	5.8%	63.7%	8.0%	20.0%	7.2%	22.4%	5.2%
(再掲)70～74歳※1	28	0.0%	0.0%	68.6%	9.1%	31.4%	9.1%	5.3%	3.6%
(再掲)75～79歳※1	23	4.1%	3.9%	74.6%	9.3%	21.3%	9.7%	8.2%	7.9%
(再掲)80～84歳※1	17	0.0%	0.0%	55.5%	12.2%	44.5%	12.2%	0.0%	0.0%
(再掲)80歳以上※1	26	0.0%	0.0%	64.9%	16.4%	35.1%	16.4%	0.0%	0.0%
(再掲)85歳以上※1	9	0.0%	0.0%	78.3%	19.9%	21.7%	19.9%	0.0%	0.0%
女性									
65～69歳	46	15.0%	5.0%	44.5%	13.1%	40.5%	10.2%	18.1%	5.5%
70～74歳	46	9.7%	5.8%	66.3%	11.9%	24.0%	10.2%	22.9%	10.7%
75～79歳	27	5.2%	3.5%	70.0%	12.8%	24.8%	11.6%	24.9%	8.7%
80～84歳	27	9.1%	8.2%	84.5%	7.6%	6.4%	3.1%	40.6%	13.7%
80歳以上	48	11.8%	6.1%	66.6%	9.7%	21.6%	9.4%	31.2%	4.4%
85歳以上	21	14.1%	11.0%	51.0%	16.9%	34.3%	16.7%	23.4%	13.0%
(再掲)65歳以上	167	11.3%	3.3%	60.6%	4.5%	28.3%	4.7%	22.5%	4.4%
(再掲)65～69歳※1	46	14.7%	4.4%	46.5%	12.1%	38.8%	9.5%	17.5%	4.9%
(再掲)70～74歳※1	46	8.4%	5.3%	67.8%	10.6%	23.7%	8.9%	19.9%	10.1%
(再掲)75～79歳※1	27	8.2%	5.5%	65.3%	14.1%	26.5%	11.2%	26.6%	8.4%
(再掲)80～84歳※1	27	8.2%	7.6%	82.9%	7.1%	8.9%	4.3%	36.9%	13.5%
(再掲)80歳以上※1	48	11.0%	5.8%	67.5%	9.1%	21.5%	8.8%	29.0%	5.1%
(再掲)85歳以上※1	21	13.3%	10.5%	54.2%	16.4%	32.5%	16.1%	22.2%	12.3%

注1) 身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦6名を除外している。

注2) BMIは体重(kg)÷(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3) BMIの判定は下記のとおり。

低体重(やせ):18.5未満

普通:18.5以上25.0未満

肥満:25.0以上

注) 値は保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表46-3 目標とするBMIの範囲の分布 - 年齢階級、目標とするBMIの範囲、割合、標準誤差
- 総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

	性年齢	人数	範囲未満		範囲内		範囲以上	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	53	18.0%	8.0%	49.5%	7.3%	32.5%	10.1%
	30～39歳	88	17.5%	5.7%	63.8%	6.5%	18.7%	5.4%
	40～49歳	158	4.9%	1.8%	61.9%	6.4%	33.2%	5.3%
	50～59歳	113	17.0%	1.7%	62.5%	4.6%	20.5%	5.3%
	60～69歳	142	18.1%	3.0%	50.5%	6.6%	31.4%	5.5%
	70歳以上	198	27.9%	4.6%	46.1%	6.0%	26.0%	4.7%
	(再掲)20歳以上	752	18.1%	1.4%	54.7%	3.7%	27.2%	3.7%
	(再掲)65～74歳	162	22.6%	3.1%	48.5%	3.4%	28.9%	4.9%
	(再掲)75歳以上	124	29.2%	5.1%	45.5%	7.5%	25.4%	7.4%
	(再掲)20歳以上※1	752	18.4%	1.4%	55.1%	3.2%	26.6%	3.5%
	(再掲)20～49歳※1	299	13.0%	1.9%	60.1%	3.8%	26.9%	4.8%
	(再掲)65～74歳※1	162	22.6%	2.6%	48.8%	3.1%	28.6%	4.4%
	(再掲)75歳以上※1	124	28.9%	4.8%	46.2%	7.1%	24.9%	7.1%
男性	20～29歳	27	10.6%	8.8%	45.7%	8.8%	43.7%	13.9%
	30～39歳	43	1.8%	1.2%	68.1%	10.4%	30.1%	9.9%
	40～49歳	76	0.6%	0.6%	57.8%	5.6%	41.6%	5.7%
	50～59歳	53	14.6%	6.5%	60.0%	5.9%	25.4%	8.0%
	60～69歳	65	19.4%	2.5%	56.6%	6.5%	24.0%	5.0%
	70歳以上	77	16.3%	5.6%	53.1%	8.2%	30.6%	6.2%
	(再掲)20歳以上	341	11.4%	1.6%	57.3%	5.0%	31.3%	6.0%
	(再掲)65～74歳	70	20.0%	4.1%	56.4%	5.3%	23.6%	4.5%
	(再掲)75歳以上	49	17.3%	7.2%	53.3%	11.5%	29.3%	9.1%
	(再掲)20歳以上※1	341	12.0%	1.9%	57.6%	4.6%	30.4%	5.9%
	(再掲)20～49歳※1	146	4.1%	2.4%	59.5%	6.4%	36.4%	7.4%
	(再掲)65～74歳※1	70	20.8%	3.8%	55.1%	5.0%	24.1%	4.0%
	(再掲)75歳以上※1	49	18.9%	7.1%	53.8%	10.7%	27.3%	9.2%
女性	20～29歳	26	26.9%	13.8%	54.1%	14.4%	19.0%	8.2%
	30～39歳	45	35.8%	11.6%	58.7%	9.6%	5.4%	3.2%
	40～49歳	82	9.0%	3.8%	65.7%	7.4%	25.3%	4.9%
	50～59歳	60	18.9%	4.7%	64.6%	6.5%	16.4%	5.6%
	60～69歳	77	17.1%	4.9%	45.1%	8.3%	37.8%	7.9%
	70歳以上	121	35.1%	6.3%	41.7%	6.2%	23.1%	4.6%
	(再掲)20歳以上	411	23.7%	2.8%	52.4%	3.3%	23.8%	3.2%
	(再掲)65～74歳	92	24.5%	6.2%	42.9%	5.7%	32.6%	7.6%
	(再掲)75歳以上	75	37.5%	6.3%	40.0%	8.0%	22.6%	6.9%
	(再掲)20歳以上※1	411	23.9%	2.4%	52.9%	2.9%	23.2%	2.8%
	(再掲)20～49歳※1	153	21.6%	3.1%	60.6%	3.3%	17.8%	3.2%
	(再掲)65～74歳※1	92	24.0%	5.3%	44.1%	5.5%	31.9%	7.0%
	(再掲)75歳以上※1	75	36.8%	5.9%	40.2%	7.4%	23.0%	6.4%

注1) 身長と体重の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦6名を除外している。

注2) BMIは体重(kg) / (身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

<参考> 目標とするBMIの範囲(18歳以上)^{1,2}

年齢(歳)	目標とするBMI(kg/m ²)
18～49	18.5～24.9
50～69	20.0～24.9
70以上	21.5～24.9 ³

¹ 男女共通。あくまでも参考として使用すべきである。

² 観察疫学研究において報告された総死亡率が最も低かったBMIを基に、疾患別の発症率とBMIとの関連、死因とBMIとの関連、日本人のBMIの実態に配慮し、総合的に判断し目標とする範囲を設定。

³ 70歳以上では、総死亡率が最も低かったBMIと実態との乖離が見られるため、虚弱の予防及び生活習慣病の予防の両者に配慮する必要があることも踏まえ、当面目標とするBMIの範囲を21.5～24.9とした。

(厚生労働省「日本人の食事摂取基準2015年版」)

表47 腹囲の分布 - 年齢階級別、腹囲の区分、割合、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上
〔妊婦除外〕

性年齢		人数	<85cm(男)/<90cm(女)		≥85cm(男)/≥90cm(女)	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	38	63.7%	10.3%	36.3%	10.3%
	30～39歳	64	75.6%	7.0%	24.4%	7.0%
	40～49歳	128	62.9%	7.7%	37.1%	7.7%
	50～59歳	97	72.3%	5.7%	27.7%	5.7%
	60～69歳	121	54.8%	4.1%	45.2%	4.1%
	70歳以上	156	50.8%	6.2%	49.2%	6.2%
	(再掲)20歳以上	604	60.6%	3.8%	39.4%	3.8%
	(再掲)65～74歳	136	53.5%	3.3%	46.5%	3.3%
	(再掲)75歳以上	95	50.1%	9.4%	49.9%	9.4%
	(再掲)20歳以上※1	604	62.1%	3.9%	37.9%	3.9%
	(再掲)20～49歳※1	230	69.4%	6.6%	30.6%	6.6%
	(再掲)65～74歳※1	136	52.9%	2.9%	47.1%	2.9%
	(再掲)75歳以上※1	95	50.2%	9.1%	49.8%	9.1%
男性	20～29歳	21	47.4%	12.0%	52.6%	12.0%
	30～39歳	28	55.9%	13.7%	44.1%	13.7%
	40～49歳	58	42.6%	9.2%	57.4%	9.2%
	50～59歳	44	55.5%	10.8%	44.5%	10.8%
	60～69歳	53	42.1%	8.2%	57.9%	8.2%
	70歳以上	62	25.2%	8.3%	74.8%	8.3%
	(再掲)20歳以上	266	42.5%	6.6%	57.5%	6.6%
	(再掲)65～74歳	57	38.7%	8.6%	61.3%	8.6%
	(再掲)75歳以上	39	23.5%	10.8%	76.5%	10.8%
	(再掲)20歳以上※1	266	43.7%	6.3%	56.3%	6.3%
	(再掲)20～49歳※1	107	49.6%	9.2%	50.4%	9.2%
	(再掲)65～74歳※1	57	35.4%	8.7%	64.6%	8.7%
	(再掲)75歳以上※1	39	25.4%	10.7%	74.6%	10.7%
女性	20～29歳	17	90.8%	9.2%	9.2%	9.2%
	30～39歳	36	95.5%	2.9%	4.5%	2.9%
	40～49歳	70	80.6%	5.7%	19.4%	5.7%
	50～59歳	53	86.9%	4.1%	13.1%	4.1%
	60～69歳	68	64.6%	7.4%	35.4%	7.4%
	70歳以上	94	67.5%	5.8%	32.5%	5.8%
	(再掲)20歳以上	338	75.5%	3.4%	24.5%	3.4%
	(再掲)65～74歳	79	63.2%	6.6%	36.8%	6.6%
	(再掲)75歳以上	56	69.7%	8.9%	30.3%	8.9%
	(再掲)20歳以上※1	338	77.5%	3.2%	22.5%	3.2%
	(再掲)20～49歳※1	123	87.4%	3.4%	12.6%	3.4%
	(再掲)65～74歳※1	79	65.0%	6.3%	35.0%	6.3%
	(再掲)75歳以上※1	56	70.8%	8.3%	29.2%	8.3%

注) 腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお女性は妊婦6名を除外した。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表48-1 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差、中央値 - 総数・男性・女性・20歳以上〔血圧を下げる薬の使用を含む〕

性年齢	人数	収縮期(最高)血圧			拡張期(最低)血圧				
		平均値	標準偏差	標準誤差	中央値	平均値	標準偏差	標準誤差	中央値
総数	20~29歳	116.6	9.9	2.8	119.5	73.0	10.2	2.9	76.1
	30~39歳	112.4	14.3	1.9	112.0	73.5	10.5	1.4	76.0
	40~49歳	99	14.3	2.1	120.0	76.3	9.1	0.9	75.0
	50~59歳	123.9	16.2	4.1	125.0	78.1	11.0	2.5	78.0
	60~69歳	105	135.9	16.5	135.0	82.3	8.7	0.6	82.0
	70歳以上	140	137.6	16.8	139.0	76.9	10.8	0.8	78.0
	(再掲)65~74歳	512	128.5	18.0	128.0	77.8	10.4	0.6	78.0
	(再掲)75歳以上	121	138.3	18.3	137.0	81.4	9.8	1.0	83.0
	(再掲)20歳以上	82	137.2	16.2	137.0	75.6	11.0	1.3	77.1
	(再掲)20歳以上※1	512	127.9	18.2	127.0	77.3	10.3	0.6	78.0
	(再掲)20~49歳※1	182	117.3	13.9	117.8	74.5	9.7	1.0	75.0
	(再掲)40~89歳※1	121	138.6	18.0	137.0	80.8	9.7	1.1	82.0
	(再掲)65~74歳※1	82	137.9	16.2	139.0	75.3	10.7	1.4	77.0
	(再掲)75歳以上※1	82	137.2	16.2	137.0	75.6	11.0	1.3	77.0
男性	20~29歳	121.3	6.7	1.8	122.3	77.2	9.1	2.7	77.5
	30~39歳	121.7	10.1	3.0	125.0	81.1	7.2	2.0	79.8
	40~49歳	125.0	14.9	1.7	120.9	79.8	9.3	1.3	80.0
	50~59歳	126.4	17.9	5.6	129.4	82.0	10.4	2.9	80.0
	60~69歳	135.0	12.2	2.6	135.0	84.5	7.9	1.6	83.4
	70歳以上	139.2	17.5	3.3	141.0	76.9	9.8	1.3	77.4
	(再掲)20歳以上	212	130.4	16.2	128.2	80.5	9.5	1.0	80.0
	(再掲)65~74歳	48	140.0	12.4	137.2	82.3	9.3	1.8	82.0
	(再掲)75歳以上	34	138.0	18.8	140.8	76.0	10.1	1.5	77.0
	(再掲)20歳以上※1	212	130.4	16.3	128.0	80.4	9.5	0.9	80.0
	(再掲)20~49歳※1	75	123.1	11.6	122.0	79.5	8.7	0.9	79.0
	(再掲)40~89歳※1	48	141.0	12.6	137.9	82.1	9.2	1.6	82.0
	(再掲)65~74歳※1	34	138.4	18.6	141.6	75.9	9.9	1.5	77.0
	(再掲)75歳以上※1	34	138.0	18.8	140.8	76.0	10.1	1.5	77.0
女性	20~29歳	108.0	9.3	2.9	102.0	65.3	7.5	2.6	62.5
	30~39歳	103.8	12.1	3.9	105.3	66.6	7.8	1.5	64.0
	40~49歳	117.8	13.2	2.5	115.9	73.8	8.0	1.1	74.0
	50~59歳	121.6	14.2	3.4	124.3	74.4	10.3	2.9	75.0
	60~69歳	136.4	18.9	0.9	135.0	80.8	9.0	0.8	82.0
	70歳以上	136.4	16.4	2.8	136.0	76.8	11.5	1.7	78.0
	(再掲)20歳以上	300	126.9	19.3	127.0	75.6	10.5	0.9	75.0
	(再掲)65~74歳	73	137.2	21.0	135.9	80.8	10.1	1.3	83.0
	(再掲)75歳以上	48	136.6	13.8	135.0	75.3	11.8	2.3	77.7
	(再掲)20歳以上※1	300	125.9	19.4	125.4	74.9	10.3	0.9	74.3
	(再掲)20~49歳※1	107	112.6	14.0	111.1	70.3	8.6	1.1	71.0
	(再掲)40~89歳※1	73	137.2	20.6	136.0	80.0	10.0	1.6	82.0
	(再掲)65~74歳※1	48	137.5	13.7	135.0	74.7	11.5	2.3	77.0
	(再掲)75歳以上※1	48	136.6	13.8	135.0	75.3	11.8	2.3	77.7

注) 単位:mmHg

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

注3) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1) 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表48-2 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差、中央値 - 総数・男性・女性・20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

性年齢	人数	収縮期(最高)血圧				拡張期(最低)血圧			
		平均値	標準偏差	中央値	標準誤差	平均値	標準偏差	中央値	標準誤差
20～29歳	25	116.6	9.9	119.5	2.8	73.0	10.2	76.1	2.9
30～39歳	57	112.4	14.4	112.0	1.9	73.6	10.5	76.0	1.4
40～49歳	94	120.4	14.3	118.0	2.2	76.0	9.1	75.0	1.0
50～59歳	71	122.0	16.0	123.2	4.3	76.8	10.9	77.0	2.5
60～69歳	69	134.0	19.0	129.2	1.7	81.2	9.0	82.0	0.9
70歳以上	61	131.9	21.0	131.0	5.7	76.1	11.3	76.4	1.8
(再掲)20歳以上	377	124.1	18.2	123.3	1.5	76.7	10.4	78.0	0.6
(再掲)65～74歳	70	135.7	21.5	135.3	2.6	79.5	10.2	81.1	1.6
(再掲)75歳以上	33	134.1	22.5	132.7	8.5	76.8	11.9	77.4	2.7
(再掲)20歳以上※1	377	123.6	18.0	122.0	1.4	76.4	10.3	77.0	0.6
(再掲)20～49歳※1	176	117.1	13.9	117.7	1.7	74.3	9.7	75.0	1.0
(再掲)40～89歳※1	294	127.0	18.4	126.0	1.5	77.7	10.0	78.3	0.5
(再掲)65～74歳※1	70	136.4	21.1	137.0	2.3	79.2	9.9	81.0	1.4
(再掲)75歳以上※1	33	134.0	22.8	132.8	8.7	76.9	11.8	77.5	2.7
20～29歳	12	121.3	6.7	122.3	1.8	77.2	9.1	77.5	2.7
30～39歳	23	101.7	10.1	125.0	3.0	81.1	7.2	80.0	2.0
40～49歳	38	124.4	15.0	120.0	1.7	79.5	9.4	79.0	1.4
50～59歳	29	123.5	18.8	122.2	6.3	80.6	10.8	80.0	3.3
60～69歳	29	133.7	13.0	130.8	2.6	84.5	8.1	85.1	1.8
70歳以上	17	132.3	27.3	134.2	11.2	77.7	8.5	79.4	3.1
(再掲)20歳以上	148	126.2	16.5	125.0	1.7	80.6	9.2	80.0	0.9
(再掲)65～74歳	23	139.1	15.4	137.1	3.6	83.1	9.4	80.9	3.0
(再掲)75歳以上	10	131.7	29.4	139.1	14.1	77.4	9.3	79.2	4.0
(再掲)20歳以上※1	148	126.2	16.4	125.0	1.6	80.4	9.2	80.0	0.8
(再掲)20～49歳※1	73	122.8	11.6	122.0	1.5	79.4	8.7	79.0	0.9
(再掲)40～89歳※1	113	128.3	18.4	127.0	2.0	80.9	9.5	80.0	1.1
(再掲)65～74歳※1	23	140.5	15.6	137.1	3.6	82.8	9.1	81.6	2.5
(再掲)75歳以上※1	10	131.7	29.4	139.1	14.1	77.4	9.3	79.2	4.0
20～29歳	13	108.0	9.3	102.0	2.9	65.3	7.5	62.5	2.6
30～39歳	34	103.6	12.1	105.3	3.8	66.5	7.9	64.0	1.5
40～49歳	56	117.5	13.2	115.1	2.6	73.6	8.1	74.0	1.1
50～59歳	42	120.9	13.5	124.0	3.7	73.8	10.2	75.0	3.2
60～69歳	40	134.3	22.4	128.7	2.2	79.0	9.0	81.3	1.4
70歳以上	44	131.7	18.4	131.0	4.3	75.4	12.2	75.0	1.7
(再掲)20歳以上	229	122.6	19.3	122.0	2.1	74.0	10.3	74.0	0.7
(再掲)65～74歳	47	134.5	23.3	131.2	3.0	78.3	10.3	81.2	1.4
(再掲)75歳以上	23	135.6	18.0	132.4	6.9	76.5	13.4	75.1	2.9
(再掲)20歳以上※1	229	121.6	18.9	121.0	1.9	73.4	10.0	73.0	0.6
(再掲)20～49歳※1	103	112.4	13.9	111.0	2.1	70.2	8.6	71.0	1.1
(再掲)40～89歳※1	181	126.2	18.4	125.0	2.0	75.5	9.8	75.0	0.6
(再掲)65～74歳※1	47	135.0	22.8	133.2	2.6	77.9	9.9	80.2	1.3
(再掲)75歳以上※1	23	135.6	18.0	132.4	6.9	76.5	13.4	75.1	2.9

注) 単位:mmHg

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

注3) 値は保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表49-1 ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上
 (インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用を含む)

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20～29歳	25	5.2	0.3	0.1	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	5.0	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
30～39歳	54	5.2	0.2	0.0	4.6	4.6	4.9	4.9	5.1	5.1	5.2	5.5	5.5	5.6	5.6
40～49歳	99	5.5	0.7	0.1	4.4	4.4	4.9	5.0	5.1	5.3	5.3	5.6	6.3	10.9	10.9
50～59歳	84	5.5	0.5	0.0	4.7	4.7	4.8	4.9	5.2	5.2	5.4	5.7	5.9	6.1	7.6
60～69歳	103	5.8	0.9	0.1	4.7	4.9	5.0	5.1	5.3	5.6	5.6	5.9	6.8	7.3	10.5
70歳以上	136	6.0	1.0	0.2	4.7	4.7	5.2	5.3	5.5	5.8	5.8	6.2	7.0	7.8	10.6
(再掲)20歳以上	501	5.7	0.8	0.1	4.4	4.7	4.9	5.0	5.2	5.5	5.5	5.8	6.3	7.1	10.2
(再掲)65～74歳	119	6.0	1.2	0.2	4.7	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	5.8	6.1	6.9	9.2	10.6
(再掲)75歳以上	79	5.9	0.6	0.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.5	5.8	5.8	6.1	6.6	7.6	7.9
(再掲)20歳以上※1	501	5.6	0.8	0.1	4.4	4.6	4.9	5.0	5.2	5.5	5.5	5.8	6.2	7.0	9.6
(再掲)20～49歳※1	178	5.3	0.5	0.0	4.4	4.4	4.7	4.9	5.1	5.3	5.3	5.5	5.7	5.9	7.7
(再掲)65～74歳※1	119	5.9	1.1	0.2	4.7	4.7	5.0	5.2	5.4	5.7	5.7	6.0	6.9	8.3	10.6
(再掲)75歳以上※1	79	5.9	0.6	0.1	4.9	4.9	5.1	5.3	5.5	5.8	5.8	6.2	6.6	7.8	7.9
20～29歳	12	5.2	0.3	0.0	4.6	4.6	4.6	4.6	5.1	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5
30～39歳	23	5.3	0.2	0.0	4.6	4.6	4.9	5.1	5.1	5.3	5.3	5.5	5.5	5.5	5.6
40～49歳	40	5.4	0.5	0.1	4.4	4.4	4.8	5.0	5.1	5.2	5.2	5.8	6.1	6.3	7.7
50～59歳	38	5.4	0.4	0.1	4.7	4.7	4.7	4.9	5.0	5.3	5.3	5.7	5.9	6.0	6.6
60～69歳	41	5.7	0.6	0.1	4.7	4.7	5.0	5.2	5.3	5.6	5.6	5.8	6.8	7.1	8.8
70歳以上	54	5.9	0.7	0.1	4.7	4.7	5.1	5.2	5.4	5.8	5.8	6.0	6.9	7.8	7.9
(再掲)20歳以上	208	5.6	0.6	0.0	4.4	4.5	4.9	5.0	5.2	5.5	5.5	5.8	6.2	6.7	7.9
(再掲)65～74歳	47	5.7	0.7	0.1	4.7	4.7	4.7	5.0	5.2	5.7	5.7	6.0	6.7	7.0	8.8
(再掲)75歳以上	32	5.9	0.7	0.2	5.0	5.0	5.2	5.3	5.5	5.9	5.9	6.2	6.7	7.9	7.9
(再掲)20歳以上※1	208	5.5	0.6	0.0	4.4	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.4	5.8	6.1	6.7	7.9
(再掲)20～49歳※1	75	5.3	0.4	0.0	4.4	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.3	5.5	5.9	6.0	7.7
(再掲)65～74歳※1	47	5.7	0.7	0.1	4.7	4.7	4.7	5.0	5.2	5.7	5.7	6.0	6.7	7.0	8.8
(再掲)75歳以上※1	32	6.0	0.7	0.2	5.0	5.0	5.2	5.3	5.5	5.9	5.9	6.2	7.2	7.9	7.9
20～29歳	13	5.2	0.3	0.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	5.2	5.2	5.4	5.6	5.7	5.7
30～39歳	31	5.2	0.2	0.0	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.2	5.3	5.6	5.6	5.6
40～49歳	59	5.5	0.8	0.1	4.7	4.7	4.9	5.0	5.1	5.4	5.4	5.6	5.7	6.8	10.9
50～59歳	46	5.6	0.5	0.1	4.8	4.8	5.1	5.3	5.3	5.5	5.5	5.7	6.0	6.9	7.6
60～69歳	62	5.8	1.1	0.1	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.5	5.5	5.9	6.6	7.8	10.5
70歳以上	82	6.1	1.1	0.3	4.9	4.9	5.1	5.4	5.6	5.8	5.8	6.2	7.3	8.0	10.6
(再掲)20歳以上	293	5.7	0.9	0.1	4.7	4.8	5.0	5.1	5.3	5.5	5.5	5.8	6.4	7.5	10.6
(再掲)65～74歳	72	6.2	1.4	0.3	5.0	5.0	5.1	5.2	5.4	5.8	5.8	6.1	7.4	10.5	10.6
(再掲)75歳以上	47	5.9	0.6	0.1	4.9	4.9	5.0	5.2	5.5	5.8	5.8	6.1	6.4	7.3	7.8
(再掲)20歳以上※1	293	5.7	0.9	0.1	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.5	5.5	5.8	6.2	7.3	10.5
(再掲)20～49歳※1	103	5.3	0.6	0.0	4.7	4.7	4.8	4.9	5.1	5.3	5.3	5.4	5.6	5.8	10.7
(再掲)65～74歳※1	72	6.1	1.3	0.3	5.0	5.0	5.1	5.3	5.4	5.7	5.7	5.9	7.2	10.2	10.6
(再掲)75歳以上※1	47	5.9	0.6	0.1	4.9	4.9	5.1	5.1	5.5	5.8	5.8	6.2	6.4	7.3	7.8

(注)単位:%

(注)ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表49-2 ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上
 [インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用除く]

性別	年齢	人数	平均	標準偏差		標準誤差		P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値		
				最小値	最大値	最小値	最大値												
総数	20～29歳	25	5.2	0.3	0.1	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	5.0	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	
	30～39歳	54	5.2	0.2	0.0	4.6	4.6	4.6	4.9	4.9	4.9	5.1	5.2	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
	40～49歳	97	5.4	0.6	0.1	4.4	4.4	4.4	4.9	4.9	5.0	5.1	5.3	5.6	5.9	6.1	10.9	10.9	10.9
	50～59歳	76	5.4	0.4	0.0	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	5.2	5.4	5.7	5.9	6.0	7.1	7.1	7.1
	60～69歳	98	5.7	0.9	0.2	4.7	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.5	5.7	5.8	6.2	6.9	10.5	10.5	10.5
	70歳以上	121	5.9	0.9	0.2	4.7	4.7	4.7	5.1	5.2	5.2	6.4	6.4	7.1	7.1	10.4	10.4	10.4	10.4
	(再掲)20歳以上	471	5.6	0.7	0.1	4.4	4.6	4.6	4.7	4.7	5.0	5.2	5.4	5.8	6.0	6.3	10.4	10.4	10.4
	(再掲)65～74歳	111	5.9	1.2	0.2	4.7	4.7	4.7	5.0	5.1	5.2	5.5	5.7	6.0	6.3	6.7	7.9	7.9	7.9
	(再掲)75歳以上	70	5.8	0.5	0.1	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	6.3	6.3	6.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
	(再掲)20歳以上※1	471	5.5	0.7	0.1	4.4	4.6	4.6	4.7	4.7	5.0	5.2	5.4	5.7	6.0	6.2	9.8	10.9	10.9
	(再掲)20～49歳※1	176	5.3	0.4	0.0	4.4	4.6	4.6	4.7	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.5	5.7	6.7	10.9	10.9
	(再掲)65～74歳※1	111	5.8	1.1	0.2	4.7	4.7	4.7	5.0	5.1	5.4	6.3	6.3	7.5	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6
	(再掲)75歳以上※1	70	5.8	0.5	0.1	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	6.3	6.3	6.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
	20～29歳	12	5.2	0.3	0.0	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	5.1	5.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
30～39歳	23	5.3	0.2	0.0	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	5.0	5.1	5.3	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	
40～49歳	39	5.4	0.4	0.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7	5.0	5.1	5.2	5.8	5.8	6.0	6.2	6.5	6.5	
50～59歳	35	5.3	0.4	0.1	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	5.0	5.2	5.2	5.5	5.9	6.0	6.6	6.6	
60～69歳	38	5.7	0.6	0.1	4.7	4.7	4.7	4.7	5.0	5.1	5.3	5.6	5.6	5.8	6.6	7.0	7.2	7.2	
70歳以上	48	5.8	0.7	0.1	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.3	5.6	6.0	6.6	7.2	7.9	7.9	7.9	
(再掲)20歳以上	195	5.5	0.5	0.0	4.4	4.6	4.6	4.7	4.7	5.0	5.2	5.4	5.8	6.1	6.6	7.5	7.9	7.9	
(再掲)65～74歳	43	5.6	0.5	0.1	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	5.0	5.2	5.5	5.9	6.4	6.7	6.9	6.9	6.9	
(再掲)75歳以上	28	5.9	0.7	0.2	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.3	6.7	6.7	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	
(再掲)20歳以上※1	195	5.5	0.5	0.0	4.4	4.6	4.6	4.7	4.7	5.0	5.2	5.4	5.7	6.0	6.5	7.5	7.9	7.9	
(再掲)20～49歳※1	74	5.3	0.4	0.0	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5	5.5	5.8	6.0	6.5	6.5	
(再掲)65～74歳※1	43	5.6	0.5	0.1	4.7	4.7	4.7	4.7	5.0	5.0	5.2	5.6	5.9	6.3	6.7	6.9	6.9	6.9	
(再掲)75歳以上※1	28	5.9	0.7	0.2	5.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.3	6.7	6.7	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	
20～29歳	13	5.2	0.3	0.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	5.2	5.4	5.4	5.6	5.7	5.7	5.7	
30～39歳	31	5.2	0.2	0.0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6	
40～49歳	58	5.4	0.7	0.1	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	5.0	5.1	5.4	5.6	5.6	5.9	10.9	10.9	10.9	
50～59歳	41	5.5	0.3	0.1	4.8	4.8	4.8	4.8	5.1	5.3	5.3	5.5	5.7	5.7	5.9	6.0	7.1	7.1	
60～69歳	60	5.7	1.0	0.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.5	5.8	6.2	6.7	10.5	10.5	10.5	
70歳以上	73	5.9	1.1	0.3	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.2	6.7	10.5	10.5	10.5	
(再掲)20歳以上	276	5.6	0.9	0.1	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	5.1	5.2	5.5	5.7	5.9	6.2	7.8	10.6	10.6	
(再掲)65～74歳	68	6.0	1.4	0.3	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	6.8	6.8	10.5	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	
(再掲)75歳以上	42	5.7	0.3	0.1	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.1	5.5	5.7	5.9	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	
(再掲)20歳以上※1	276	5.6	0.8	0.1	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.2	6.2	6.3	6.3	
(再掲)20～49歳※1	102	5.3	0.5	0.0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	6.2	10.5	10.9	10.9	
(再掲)65～74歳※1	68	6.0	1.3	0.2	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	6.3	6.3	10.5	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	
(再掲)75歳以上※1	42	5.7	0.3	0.1	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.1	5.5	5.7	5.9	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	

注) 単位: %

注) ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行い、身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。
 注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表50-1 血清総コレステロール値の平均及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差-総数・男性・女性、20歳以上
 [コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用を含む]

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20~29歳	25	174.1	23.6	3.4	122.0	122.0	142.4	151.2	153.8	175.1	189.6	213.2	227.6	231.0	231.0
30~39歳	54	179.4	36.7	4.6	115.0	115.0	121.1	136.2	157.2	174.9	195.0	227.8	261.1	308.0	308.0
40~49歳	99	199.7	35.9	4.1	139.0	139.0	145.6	161.2	178.8	195.0	217.2	235.9	288.4	311.0	311.0
50~59歳	84	201.7	32.1	5.9	140.0	140.0	151.9	168.5	180.6	202.0	217.1	243.3	263.4	303.0	303.0
60~69歳	103	214.6	34.2	4.0	145.0	145.0	155.4	166.6	195.0	210.0	237.0	260.1	275.2	295.9	296.0
70歳以上	136	194.8	31.9	1.5	112.0	123.8	146.2	152.0	171.7	195.6	216.6	234.6	242.8	276.9	280.0
(再掲)20歳以上	501	199.2	35.2	1.2	112.0	124.7	147.0	154.0	176.0	197.0	220.0	243.0	261.0	301.4	311.0
(再掲)65~74歳	119	208.3	29.9	4.6	123.0	153.0	163.0	170.3	189.1	204.2	225.9	252.8	259.5	294.8	296.0
(再掲)75歳以上	79	189.9	34.5	2.8	112.0	113.9	142.0	147.0	163.0	187.0	208.1	238.8	244.9	277.0	277.0
(再掲)20歳以上※1	501	198.0	35.0	1.2	112.0	125.0	147.0	154.0	172.5	196.0	218.7	243.0	260.3	301.0	311.0
(再掲)20~49歳※1	178	188.6	35.2	2.5	115.0	115.0	138.0	149.0	165.1	181.9	208.9	231.0	253.7	310.0	311.0
(再掲)65~74歳※1	119	207.5	30.7	4.2	123.0	142.7	162.2	167.1	186.4	203.5	225.6	253.0	260.6	294.6	296.0
(再掲)75歳以上※1	79	189.4	34.5	2.6	112.0	114.4	142.0	147.0	163.0	187.0	208.8	238.5	245.9	277.0	277.0
20~29歳	12	172.1	23.4	4.5	122.0	122.0	127.7	148.0	153.3	172.6	190.0	205.6	231.0	231.0	231.0
30~39歳	23	182.8	42.4	8.3	115.0	115.0	115.0	122.1	152.6	176.3	218.7	257.9	264.0	265.0	265.0
40~49歳	40	206.3	31.3	5.4	139.0	139.0	139.0	175.6	182.4	207.8	223.0	238.8	271.6	291.0	291.0
50~59歳	38	200.8	38.2	8.6	140.0	140.0	140.0	153.5	174.3	196.6	221.5	246.8	283.7	302.0	302.0
60~69歳	41	206.7	38.1	3.6	145.0	145.0	145.0	156.1	177.2	200.6	231.0	261.9	279.9	288.0	288.0
70歳以上	54	178.2	27.0	3.4	123.0	123.3	130.7	146.4	162.9	176.3	204.3	211.0	224.2	237.0	237.0
(再掲)20歳以上	208	193.5	36.3	2.9	115.0	117.0	139.6	147.1	169.0	191.0	217.0	237.6	261.7	295.7	302.0
(再掲)65~74歳	47	195.4	28.0	5.5	123.0	128.7	161.4	162.1	173.4	192.2	207.1	242.0	252.0	255.0	255.0
(再掲)75歳以上	32	174.1	28.6	5.6	127.0	127.0	127.0	144.3	147.0	171.0	203.4	213.2	226.9	234.0	234.0
(再掲)20歳以上※1	208	193.4	35.9	2.9	115.0	117.0	139.9	147.4	169.0	191.5	217.0	236.4	257.5	295.0	302.0
(再掲)20~49歳※1	75	191.1	35.9	3.2	115.0	115.0	136.5	147.3	165.5	191.0	217.0	233.6	258.6	291.0	291.0
(再掲)65~74歳※1	47	195.7	28.0	4.8	123.0	132.0	161.5	162.0	172.9	193.1	213.2	236.8	251.4	255.0	255.0
(再掲)75歳以上※1	32	173.4	28.2	5.3	127.0	127.0	127.0	145.7	147.0	168.7	203.1	212.7	226.5	234.0	234.0
20~29歳	13	177.8	25.0	6.7	149.0	149.0	149.0	151.2	160.7	173.4	202.6	221.8	228.0	228.0	228.0
30~39歳	31	176.0	30.5	6.7	129.0	129.0	132.4	136.3	158.7	175.8	185.8	197.7	264.6	308.0	308.0
40~49歳	59	194.8	38.5	7.8	140.0	140.4	146.8	152.7	169.4	192.0	204.5	236.7	303.8	311.0	311.0
50~59歳	46	202.6	25.2	5.2	145.0	147.1	168.3	169.4	183.3	202.0	211.0	234.3	251.2	303.0	303.0
60~69歳	62	219.9	30.5	5.0	145.0	147.1	171.2	186.9	200.0	219.0	242.0	260.2	274.5	296.0	296.0
70歳以上	82	206.7	29.9	3.2	112.0	122.6	153.5	170.0	187.0	206.4	228.6	242.2	257.9	280.0	280.0
(再掲)20歳以上	293	203.9	33.5	3.4	112.0	136.2	153.0	163.8	183.0	201.0	223.0	243.0	261.0	308.9	311.0
(再掲)65~74歳	72	216.1	28.4	3.0	143.0	159.6	172.0	186.0	195.9	213.3	233.0	258.6	276.3	296.0	296.0
(再掲)75歳以上	47	203.0	33.7	6.1	112.0	112.0	149.7	155.8	185.3	200.9	227.4	243.8	265.4	277.0	277.0
(再掲)20歳以上※1	293	201.6	33.9	3.3	112.0	136.0	151.0	161.6	180.0	197.2	221.3	243.0	260.8	308.7	311.0
(再掲)20~49歳※1	103	186.5	34.7	4.5	129.0	130.7	144.2	151.1	164.0	181.0	196.5	228.7	262.1	311.0	311.0
(再掲)65~74歳※1	72	214.8	30.1	3.4	143.0	143.0	172.0	184.0	195.0	212.0	233.0	259.1	276.4	296.0	296.0
(再掲)75歳以上※1	47	203.9	33.5	5.6	112.0	112.0	150.8	162.1	186.2	201.6	228.9	244.9	263.9	277.0	277.0

注) 単位: mg/dL

注) 血清総コレステロールの測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表50-2 血清総コレステロール値の平均及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上
 (コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用除く)

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
20~29歳	25	174.1	23.6	3.3	122.0	122.0	142.4	151.2	153.8	175.6	189.6	213.2	227.6	231.0	231.0
30~39歳	54	179.4	36.7	4.4	115.0	115.0	121.1	136.2	157.2	174.9	195.0	227.8	261.1	308.0	308.0
40~49歳	93	199.6	36.4	4.2	139.0	139.0	145.1	153.8	179.0	194.6	217.0	236.0	290.0	311.0	311.0
50~59歳	75	204.6	32.3	4.7	140.0	140.0	151.4	169.8	182.6	203.6	218.7	243.6	267.3	303.0	303.0
60~69歳	87	215.1	34.8	3.7	145.0	145.0	156.2	170.0	195.0	210.0	236.8	260.4	280.0	296.0	296.0
70歳以上	108	193.2	33.1	2.8	112.0	123.2	146.1	147.0	167.1	193.0	216.8	233.0	244.0	278.8	280.0
(再掲)20歳以上	442	199.1	36.0	1.0	112.0	123.5	147.0	154.0	176.0	196.0	220.0	243.0	263.4	302.0	311.0
(再掲)65~74歳	96	207.0	30.4	4.9	123.0	158.8	162.2	167.3	186.1	203.0	225.4	254.2	259.6	296.0	296.0
(再掲)75歳以上	63	187.7	35.6	4.0	112.0	112.8	140.9	146.7	160.5	184.8	208.0	240.2	248.0	276.0	276.0
(再掲)20歳以上※1	442	197.6	35.6	1.0	112.0	123.8	146.9	153.4	172.0	195.0	219.0	243.0	260.9	301.6	311.0
(再掲)20~49歳※1	172	188.0	35.2	2.5	115.0	115.0	137.8	148.9	165.0	181.5	208.0	231.0	256.4	310.0	311.0
(再掲)65~74歳※1	96	206.5	31.1	4.3	123.0	159.6	162.0	166.0	184.0	203.0	224.8	255.0	264.4	296.0	296.0
(再掲)75歳以上※1	63	187.5	35.7	3.8	112.0	113.3	142.0	146.8	159.5	183.7	211.0	240.2	247.1	276.0	276.0
20~29歳	12	172.1	23.4	4.3	122.0	122.0	127.7	148.0	153.3	172.6	190.0	205.6	231.0	231.0	231.0
30~39歳	23	182.8	42.4	8.0	115.0	115.0	115.0	122.1	151.9	176.3	218.7	257.9	264.0	265.0	265.0
40~49歳	36	205.4	32.2	5.4	139.0	139.0	139.0	172.8	182.0	207.0	224.1	239.4	282.1	291.0	291.0
50~59歳	33	203.5	39.3	7.8	140.0	140.0	140.0	152.4	176.2	199.7	222.1	254.6	288.1	302.0	302.0
60~69歳	35	204.1	38.5	4.1	145.0	145.0	145.0	153.7	174.6	199.4	231.0	266.6	281.9	288.0	288.0
70歳以上	47	176.2	27.0	4.2	123.0	123.2	126.8	146.5	158.5	173.9	196.5	213.5	226.7	237.0	237.0
(再掲)20歳以上	186	192.6	36.9	3.2	115.0	115.0	139.5	147.0	165.5	191.0	217.0	236.6	264.7	296.9	302.0
(再掲)65~74歳	40	190.7	25.3	3.4	123.0	123.4	162.0	162.0	169.8	190.8	202.9	231.0	242.5	255.0	255.0
(再掲)75歳以上	27	172.4	28.6	5.7	127.0	127.0	146.0	146.0	147.0	168.5	202.6	216.8	229.5	234.0	234.0
(再掲)20歳以上※1	186	192.4	36.2	3.0	115.0	115.0	139.7	147.1	165.2	191.0	217.0	236.0	261.2	296.3	302.0
(再掲)20~49歳※1	71	189.7	35.8	2.9	115.0	115.0	136.2	147.2	162.3	188.2	217.0	232.3	259.4	291.0	291.0
(再掲)65~74歳※1	40	191.2	25.9	3.1	123.0	126.8	162.0	162.0	168.4	190.5	205.7	231.0	240.9	255.0	255.0
(再掲)75歳以上※1	27	171.7	28.1	5.4	127.0	127.0	127.0	146.1	147.0	168.1	200.0	215.6	229.2	234.0	234.0
20~29歳	13	177.8	25.0	6.5	149.0	149.0	149.0	151.2	160.7	173.4	202.6	221.8	228.0	228.0	228.0
30~39歳	31	176.0	30.5	6.4	129.0	129.0	132.4	136.3	158.7	175.8	185.8	197.7	264.6	308.0	308.0
40~49歳	57	195.5	38.8	7.6	140.0	140.2	146.6	152.3	170.0	193.0	206.0	241.4	304.2	311.0	311.0
50~59歳	42	205.7	24.3	4.2	145.0	148.8	169.8	181.0	185.6	203.4	213.9	237.1	253.3	303.0	303.0
60~69歳	52	223.0	29.8	5.3	145.0	156.4	182.1	187.5	197.8	222.9	242.6	260.3	279.6	296.0	296.0
70歳以上	61	208.3	30.7	4.3	112.0	113.3	151.2	168.3	190.3	211.3	224.3	243.2	263.1	280.0	280.0
(再掲)20歳以上	256	204.7	34.3	3.7	112.0	135.3	151.6	164.0	183.0	201.6	223.7	251.0	262.1	309.3	311.0
(再掲)65~74歳	56	217.7	28.8	4.2	157.0	163.4	171.8	186.0	196.3	216.4	230.0	258.9	284.4	296.0	296.0
(再掲)75歳以上	36	203.4	35.6	8.2	112.0	112.0	145.9	152.3	184.6	202.9	225.8	246.7	266.7	276.0	276.0
(再掲)20歳以上※1	256	202.1	34.6	3.5	112.0	134.6	150.7	162.0	180.0	197.0	223.0	246.0	261.4	309.1	311.0
(再掲)20~49歳※1	101	186.7	34.9	4.2	129.0	130.6	144.0	151.0	164.9	181.0	197.0	229.3	268.3	311.0	311.0
(再掲)65~74歳※1	56	216.8	30.2	4.0	157.0	159.2	170.2	184.0	195.0	213.8	229.7	259.6	283.3	296.0	296.0
(再掲)75歳以上※1	36	204.9	35.4	7.6	112.0	112.0	147.8	153.1	184.7	205.1	235.3	247.0	265.7	276.0	276.0

注) 単位: mg/dL

注) 血清総コレステロールの測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをした値。

表51-1 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上
 [コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用含む]

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数															
20～29歳	25	54.2	13.2	4.6	32.0	32.0	32.0	32.0	41.9	56.6	63.3	72.9	75.4	76.0	76.0
30～39歳	54	56.0	14.9	2.9	33.0	33.9	35.5	36.0	43.9	54.0	67.0	75.0	84.0	105.0	105.0
40～49歳	99	53.9	15.2	3.3	31.0	31.0	31.0	36.0	43.0	54.0	64.2	73.5	83.2	103.0	103.0
50～59歳	84	59.4	14.8	1.9	29.0	29.0	34.6	40.9	48.0	59.0	71.0	78.1	83.7	92.0	92.0
60～69歳	103	57.2	13.0	1.5	31.0	35.5	40.6	42.0	46.0	54.4	64.2	73.5	84.0	101.5	102.0
70歳以上	136	55.0	12.6	1.7	30.0	31.8	37.0	41.0	45.0	54.0	64.0	72.0	75.9	89.9	91.0
(再掲)20歳以上	501	56.2	13.9	1.5	29.0	30.7	36.0	40.0	46.0	55.0	65.0	74.0	80.0	95.5	105.0
(再掲)65～74歳	119	58.8	13.2	1.8	31.0	35.1	40.5	44.0	47.0	58.0	67.7	74.0	90.0	96.4	97.0
(再掲)75歳以上	79	51.4	11.8	1.1	30.0	32.7	35.3	38.0	43.0	48.0	58.4	72.0	73.4	91.0	91.0
(再掲)20歳以上※1	501	56.5	14.0	1.5	29.0	30.9	36.0	40.0	46.0	55.0	66.0	75.0	81.0	96.5	105.0
(再掲)20～49歳※1	178	55.8	14.8	2.4	31.0	31.0	33.6	36.0	44.2	55.0	65.0	75.4	81.9	102.5	105.0
(再掲)65～74歳※1	119	58.1	13.4	1.7	31.0	35.8	40.2	42.1	46.0	56.9	67.6	74.0	90.0	96.3	97.0
(再掲)75歳以上※1	79	51.1	11.6	1.1	30.0	33.3	35.3	38.0	43.0	48.0	58.0	71.7	73.3	91.0	91.0
男性															
20～29歳	12	50.0	12.0	4.2	32.0	32.0	32.0	32.0	40.3	51.0	59.7	64.8	66.0	66.0	66.0
30～39歳	23	47.6	12.9	3.3	33.0	33.0	35.2	35.6	36.0	44.0	57.0	63.5	84.6	105.0	105.0
40～49歳	40	45.9	12.3	3.9	31.0	31.0	31.0	31.0	37.7	45.0	52.9	60.2	73.4	102.0	102.0
50～59歳	38	55.6	14.4	2.4	29.0	29.0	29.0	36.6	45.3	55.6	69.4	74.9	77.8	87.0	87.0
60～69歳	41	55.7	13.5	2.2	31.0	31.1	41.0	42.6	45.2	54.0	63.0	72.7	82.8	97.0	97.0
70歳以上	54	49.6	10.2	2.2	35.0	35.0	35.0	36.6	43.0	47.3	56.3	65.0	71.2	81.0	81.0
(再掲)20歳以上	208	51.3	13.0	2.0	29.0	29.0	31.9	36.0	42.8	49.0	59.8	70.1	73.5	95.5	105.0
(再掲)65～74歳	47	56.0	14.0	3.2	31.0	31.0	40.0	42.3	44.8	54.5	64.0	72.8	82.5	97.0	97.0
(再掲)75歳以上	32	46.7	9.5	2.3	35.0	35.0	35.0	35.4	40.5	44.8	50.0	60.9	70.8	81.0	81.0
(再掲)20歳以上※1	208	51.4	13.2	1.9	29.0	29.0	32.0	36.0	42.0	49.0	60.0	71.0	75.3	95.0	105.0
(再掲)20～49歳※1	75	48.3	12.5	2.7	31.0	31.0	31.0	32.0	38.2	46.0	57.3	64.4	66.7	105.0	105.0
(再掲)65～74歳※1	47	54.5	13.8	3.6	31.0	31.3	38.8	41.0	44.0	52.4	63.1	72.4	80.4	97.0	97.0
(再掲)75歳以上※1	32	46.7	9.4	2.2	35.0	35.0	35.0	35.4	40.0	44.8	50.0	60.6	70.6	81.0	81.0
女性															
20～29歳	13	61.9	12.1	4.4	42.0	42.0	42.3	43.0	50.5	61.9	72.7	75.5	76.0	76.0	76.0
30～39歳	31	64.5	11.7	2.8	48.0	48.0	48.0	50.1	52.3	65.2	72.5	81.3	86.6	99.0	99.0
40～49歳	59	59.7	14.5	2.8	36.0	36.0	36.0	41.5	48.0	58.0	69.0	79.5	87.0	103.0	103.0
50～59歳	46	63.1	14.3	1.8	34.0	34.0	40.3	44.4	52.0	64.3	73.0	81.5	88.3	92.0	92.0
60～69歳	62	58.3	12.7	1.7	38.0	38.0	40.3	41.5	49.0	56.0	68.0	73.6	84.0	102.0	102.0
70歳以上	82	58.9	12.7	1.8	30.0	30.9	42.0	43.0	49.0	57.7	69.0	74.0	85.8	91.0	91.0
(再掲)20歳以上	293	60.1	13.3	1.0	30.0	34.7	41.0	43.6	51.0	58.0	70.0	76.4	85.0	99.1	103.0
(再掲)65～74歳	72	60.5	12.6	1.8	40.0	40.0	40.6	44.8	51.3	59.0	69.0	75.3	90.0	91.0	91.0
(再掲)75歳以上	47	55.2	12.3	1.0	30.0	30.0	36.2	42.0	45.0	55.0	64.0	73.1	73.9	91.0	91.0
(再掲)20歳以上※1	293	60.6	13.4	0.9	30.0	35.0	41.0	44.0	51.0	59.0	70.0	77.0	85.6	99.6	103.0
(再掲)20～49歳※1	103	62.1	13.8	1.5	36.0	36.0	42.4	45.0	53.0	60.2	71.0	80.0	86.5	102.9	103.0
(再掲)65～74歳※1	72	60.4	12.6	1.6	40.0	40.0	40.7	44.8	50.5	59.0	69.0	75.0	90.0	91.0	91.0
(再掲)75歳以上※1	47	55.1	12.1	0.9	30.0	30.0	36.9	42.5	45.6	52.5	64.0	72.9	73.8	91.0	91.0

注) 単位: mg/dL

注) 血清HDLコレステロールの測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表51-2 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上
 【コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用者除外】

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数															
20～29歳	25	54.2	13.2	4.4	32.0	32.0	32.0	32.0	32.5	41.9	56.6	63.3	72.9	75.4	76.0
30～39歳	54	56.0	14.9	2.8	33.0	33.9	35.5	36.0	36.0	43.9	54.0	67.0	75.0	84.0	105.0
40～49歳	93	54.1	15.5	3.4	31.0	31.0	31.0	31.0	36.0	43.0	54.0	65.0	74.7	86.1	103.0
50～59歳	75	58.8	15.2	2.3	29.0	29.0	34.0	40.5	48.0	57.7	71.8	79.0	84.9	92.0	92.0
60～69歳	87	57.7	13.0	1.3	31.0	34.3	40.7	42.0	46.0	55.7	67.2	73.5	84.0	102.0	102.0
70歳以上	108	55.6	13.2	1.5	30.0	31.2	35.7	39.1	45.0	54.0	64.3	72.7	80.5	89.9	90.0
(再掲)20歳以上	442	56.4	14.2	1.4	29.0	30.5	36.0	39.0	45.5	55.0	66.0	74.0	80.6	96.7	105.0
(再掲)65～74歳	96	59.7	13.2	1.4	31.0	33.7	40.5	43.7	49.0	59.0	68.5	74.0	86.5	97.0	97.0
(再掲)75歳以上	63	51.8	12.4	1.1	30.0	30.3	35.0	36.4	43.0	48.0	58.9	72.3	73.6	85.0	85.0
(再掲)20歳以上※1	442	56.6	14.3	1.4	29.0	30.7	36.0	40.0	46.0	55.0	66.0	75.0	81.0	98.2	105.0
(再掲)20～49歳※1	172	55.8	14.9	2.3	31.0	31.0	32.8	36.0	44.0	55.0	65.0	76.0	82.9	102.6	105.0
(再掲)65～74歳※1	96	58.8	13.2	1.6	31.0	34.4	40.1	42.0	47.0	58.1	68.0	74.0	85.2	97.0	97.0
(再掲)75歳以上※1	63	51.5	12.2	1.1	30.0	30.4	35.0	36.6	43.0	48.0	58.5	72.0	73.5	85.0	85.0
20～29歳	12	50.0	12.0	4.1	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	40.3	51.0	59.7	64.8	66.0	66.0
30～39歳	23	47.6	12.9	3.1	33.0	33.0	35.2	35.6	36.0	44.0	57.0	63.5	84.6	105.0	105.0
40～49歳	36	45.2	12.4	3.9	31.0	31.0	31.0	31.0	36.8	43.0	51.0	60.4	72.0	102.0	102.0
50～59歳	33	54.4	14.4	3.2	29.0	29.0	29.0	35.8	42.7	49.8	66.1	75.5	78.2	87.0	87.0
60～69歳	35	56.3	13.7	2.2	31.0	31.0	40.8	44.0	46.0	54.0	63.2	72.9	85.7	97.0	97.0
70歳以上	47	50.0	10.8	2.3	35.0	35.0	35.0	35.8	42.3	47.4	57.6	66.3	71.4	81.0	81.0
(再掲)20歳以上	186	51.1	13.2	2.1	29.0	29.0	32.0	36.0	42.0	48.3	60.0	69.0	73.7	96.6	105.0
(再掲)65～74歳	40	57.8	14.3	3.0	31.0	31.0	37.0	42.2	46.0	56.7	65.0	73.2	85.8	97.0	97.0
(再掲)75歳以上	27	46.6	10.0	2.4	35.0	35.0	35.0	35.2	40.0	44.1	49.5	64.2	71.9	81.0	81.0
(再掲)20歳以上※1	186	51.2	13.3	2.0	29.0	29.0	32.0	36.0	42.0	49.0	60.0	69.0	76.0	96.2	105.0
(再掲)20～49歳※1	71	47.9	12.3	2.5	31.0	31.0	31.0	31.9	37.5	45.1	57.3	64.2	66.2	105.0	105.0
(再掲)65～74歳※1	40	56.0	14.3	3.6	31.0	31.0	37.6	40.2	45.2	54.7	64.2	72.8	84.2	97.0	97.0
(再掲)75歳以上※1	27	46.6	9.9	2.3	35.0	35.0	35.0	35.3	40.0	44.1	49.7	63.4	71.8	81.0	81.0
20～29歳	13	61.9	12.1	4.3	42.0	42.0	42.3	43.0	50.5	61.9	72.7	75.5	76.0	76.0	76.0
30～39歳	31	64.5	11.7	2.7	48.0	48.0	50.1	52.3	54.0	65.2	75.0	81.3	86.6	99.0	99.0
40～49歳	57	60.4	14.5	2.7	36.0	36.0	36.0	41.2	52.9	58.0	69.0	79.9	87.0	103.0	103.0
50～59歳	42	62.9	14.9	1.7	34.0	34.0	40.2	42.5	51.9	63.0	74.0	83.1	89.0	92.0	92.0
60～69歳	52	58.8	12.4	1.6	38.0	38.0	40.5	41.5	50.3	56.1	68.0	74.0	81.6	102.0	102.0
70歳以上	61	60.6	13.3	2.2	30.0	30.1	38.2	45.0	50.3	58.8	70.0	75.0	87.0	90.0	90.0
(再掲)20歳以上	256	60.9	13.4	0.9	30.0	34.5	40.8	43.7	52.0	59.0	70.0	77.0	85.0	99.4	103.0
(再掲)65～74歳	56	60.9	12.4	1.6	40.0	40.0	40.7	44.6	51.7	62.0	69.7	74.9	86.3	90.0	90.0
(再掲)75歳以上	36	57.1	12.5	2.1	30.0	30.0	33.9	39.9	47.5	56.0	70.1	73.4	74.0	85.0	85.0
(再掲)20歳以上※1	256	61.2	13.5	0.8	30.0	34.8	41.0	44.0	53.0	59.0	70.0	78.0	86.0	99.9	103.0
(再掲)20～49歳※1	101	62.4	13.7	1.4	36.0	36.0	42.1	45.1	53.6	61.0	71.3	80.0	86.6	102.9	103.0
(再掲)65～74歳※1	56	60.6	12.1	1.5	40.0	40.0	40.8	45.0	51.8	61.7	69.4	74.8	85.5	90.0	90.0
(再掲)75歳以上※1	36	57.0	12.2	1.9	30.0	30.0	34.5	41.1	47.6	55.5	68.7	73.3	74.0	85.0	85.0

注)単位:mg/dL

注)血清HDLコレステロールの測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表52-1

血清LDLコレステロール値(直接法)の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性・20歳以上
 [コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用者含む]

性別	性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値			P95	P99	最大値
											P75	P90	P95			
総数	20～29歳	25	100.7	26.4	5.0	57.0	57.0	57.0	65.5	71.0	77.6	97.0	123.0	145.5	150.4	151.0
	30～39歳	54	103.0	29.2	4.1	53.0	53.0	53.0	57.7	73.6	83.2	96.0	121.1	140.7	165.5	194.0
	40～49歳	99	119.1	29.2	3.9	48.0	49.5	49.5	75.6	86.9	95.0	115.4	135.7	158.0	171.6	200.0
	50～59歳	84	116.2	26.3	4.8	62.0	62.2	62.2	78.1	79.0	95.0	119.7	133.6	148.5	158.0	211.0
	60～69歳	103	130.3	33.1	4.0	53.0	55.9	55.9	80.7	91.2	107.0	126.9	154.0	172.5	197.8	213.9
	70歳以上	136	113.1	26.2	1.8	49.0	67.0	67.0	72.0	81.1	94.0	112.4	129.7	146.9	164.0	177.4
	(再掲)20歳以上	501	117.3	30.1	1.6	48.0	57.8	57.8	73.6	80.0	95.0	115.0	135.9	157.0	172.0	204.6
	(再掲)65～74歳	119	121.7	28.4	5.0	53.0	65.5	65.5	82.7	90.7	104.1	119.6	137.0	160.0	171.9	211.9
	(再掲)75歳以上	79	111.6	28.2	2.8	49.0	60.0	60.0	71.6	80.3	87.7	107.7	126.2	156.2	169.5	179.0
	(再掲)20歳以上※1	501	116.4	29.9	1.5	48.0	57.8	57.8	72.0	79.0	94.0	115.0	135.6	156.2	172.0	202.8
	(再掲)20～49歳※1	178	110.0	29.4	2.4	48.0	53.9	53.9	67.6	76.0	89.0	106.0	130.0	146.6	162.3	195.0
	(再掲)65～74歳※1	119	122.0	28.5	4.4	53.0	65.9	65.9	82.4	90.7	103.5	117.2	137.0	161.2	172.6	211.7
	(再掲)75歳以上※1	79	111.4	28.0	2.6	49.0	64.2	64.2	71.7	81.1	88.4	107.4	127.1	156.1	168.9	179.0
	20～29歳	12	101.5	25.4	5.9	57.0	57.0	57.0	58.2	64.1	76.0	103.8	122.1	131.5	146.0	146.0
	30～39歳	23	110.0	32.0	6.2	58.0	58.0	58.0	58.0	71.4	89.0	101.0	137.7	154.9	175.5	181.0
	40～49歳	40	128.1	23.1	2.7	48.0	48.0	48.0	93.1	94.6	112.4	132.6	137.8	158.1	161.0	170.0
50～59歳	38	117.1	29.0	5.8	63.0	63.0	63.0	63.0	73.7	97.0	119.0	138.9	158.0	167.6	178.0	
60～69歳	41	122.5	38.4	2.6	53.0	53.1	53.1	60.8	75.5	94.3	114.8	149.9	191.0	202.0	207.0	
70歳以上	54	104.5	23.5	3.0	64.0	65.7	65.7	69.6	72.0	82.0	106.5	118.3	138.3	145.1	162.0	
(再掲)20歳以上	208	115.2	30.5	2.0	48.0	48.0	48.0	68.6	77.0	93.4	113.0	135.8	155.3	164.3	202.5	
(再掲)65～74歳	47	112.1	27.5	6.1	53.0	53.0	53.0	69.3	74.8	93.5	107.0	130.8	159.1	160.0	187.0	
(再掲)75歳以上	32	102.9	22.7	3.7	67.0	67.0	67.0	70.5	72.0	82.0	105.3	117.0	139.7	148.9	155.0	
(再掲)20歳以上※1	208	115.4	30.1	2.1	48.0	48.0	48.0	70.0	76.8	93.8	114.0	136.0	155.0	161.2	201.7	
(再掲)20～49歳※1	75	116.2	28.6	3.3	48.0	50.0	50.0	65.3	75.0	97.0	120.4	136.0	151.6	160.9	181.0	
(再掲)65～74歳※1	47	113.8	27.7	5.9	53.0	54.9	54.9	71.2	80.5	93.9	107.0	133.5	159.2	161.0	187.0	
(再掲)75歳以上※1	32	102.3	22.4	3.6	67.0	67.0	67.0	70.6	72.0	82.0	105.1	117.0	139.6	148.5	155.0	
20～29歳	13	99.3	29.6	8.4	60.0	60.0	60.0	63.3	78.1	81.0	85.4	117.0	136.5	150.4	151.0	
30～39歳	31	96.0	24.7	5.7	53.0	53.0	53.0	59.8	76.0	76.0	93.0	108.6	122.2	161.9	194.0	
40～49歳	59	112.6	31.5	5.6	52.0	52.0	52.0	73.9	81.8	92.3	106.0	123.9	161.7	195.0	200.0	
50～59歳	46	115.4	23.7	5.0	62.0	62.0	62.0	78.3	80.0	95.0	124.1	130.0	136.3	143.9	211.0	
60～69歳	62	135.4	28.3	5.2	87.0	87.0	87.0	91.3	103.5	114.3	130.6	155.0	172.0	180.7	214.0	
70歳以上	82	119.2	26.4	3.0	49.0	49.0	49.0	77.8	91.0	98.2	116.0	136.7	158.7	170.0	179.0	
(再掲)20歳以上	293	119.1	29.7	2.8	49.0	49.0	49.0	62.5	83.0	95.8	115.7	136.0	161.0	173.3	211.9	
(再掲)65～74歳	72	127.6	27.5	3.7	74.0	74.0	74.0	90.3	95.2	107.7	125.0	137.0	171.1	179.2	214.0	
(再掲)75歳以上	47	118.9	30.4	5.3	49.0	49.0	49.0	74.6	84.6	96.1	114.0	142.8	168.8	174.4	179.0	
(再掲)20歳以上※1	293	117.1	29.8	2.8	49.0	49.0	49.0	76.0	81.0	93.9	115.0	134.0	157.0	172.3	211.6	
(再掲)20～49歳※1	103	104.8	29.2	2.9	52.0	52.0	52.0	53.0	66.4	85.4	95.4	121.0	138.6	170.6	200.0	
(再掲)65～74歳※1	72	127.1	28.0	3.5	74.0	74.0	74.0	90.2	95.1	107.0	125.0	137.0	171.4	179.3	214.0	
(再掲)75歳以上※1	47	119.6	30.2	4.9	49.0	49.0	49.0	74.9	86.0	98.7	114.6	141.9	168.3	174.0	179.0	

注) 単位: mg/dL

注) 血清LDLコレステロールの測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした。

表52-2 血清LDLコレステロール値(直接法)の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性・20歳以上
 [コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用除く]

	性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値										最大値
						P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99		
総数	20~29歳	25	100.7	26.4	4.8	57.0	57.0	65.5	71.0	77.6	97.0	121.9	145.5	150.4	151.0	151.0
	30~39歳	54	103.0	29.2	3.9	53.0	53.0	57.7	73.3	83.2	96.0	121.1	140.7	165.5	194.0	194.0
	40~49歳	93	118.5	29.2	4.2	48.0	48.0	76.0	85.4	95.0	115.1	136.0	158.3	173.5	200.0	200.0
	50~59歳	75	119.1	25.3	3.4	63.0	63.0	79.4	85.9	99.0	124.1	135.1	150.3	158.0	211.0	211.0
	60~69歳	87	131.5	34.3	3.9	53.0	53.0	77.4	91.1	107.0	127.9	154.6	174.6	201.3	214.0	214.0
	70歳以上	108	111.9	26.5	2.5	49.0	49.0	72.0	77.2	91.0	110.7	126.6	145.1	166.3	178.6	179.0
	(再掲)20歳以上	442	117.5	30.6	1.6	48.0	48.0	72.0	81.0	95.0	115.0	134.5	158.0	173.7	206.3	214.0
	(再掲)65~74歳	96	121.4	29.6	5.2	53.0	53.0	81.1	90.1	102.0	120.0	134.0	165.3	178.4	214.0	214.0
	(再掲)75歳以上	63	110.9	28.5	3.8	49.0	49.0	72.0	78.3	86.2	107.1	126.8	156.4	171.5	179.0	179.0
	(再掲)20歳以上※1	442	116.4	30.3	1.5	48.0	48.0	72.0	79.1	93.8	115.0	134.0	155.6	172.0	204.6	214.0
	(再掲)20~49歳※1	172	109.3	29.3	2.6	48.0	48.0	67.2	75.4	88.7	105.1	130.0	144.2	165.0	195.0	200.0
	(再掲)65~74歳※1	96	122.0	29.6	4.7	53.0	53.0	82.0	90.2	102.0	120.0	135.5	168.6	178.8	214.0	214.0
	(再掲)75歳以上※1	63	110.8	28.4	3.5	49.0	49.0	72.0	80.5	86.8	106.8	128.0	156.6	170.4	179.0	179.0
	男性	20~29歳	12	101.5	25.4	5.7	57.0	57.0	58.2	64.1	76.0	103.8	122.1	131.5	146.0	146.0
30~39歳		23	110.0	32.0	6.0	58.0	58.0	58.0	71.4	89.0	101.0	137.2	154.9	175.5	181.0	181.0
40~49歳		36	127.0	23.2	2.1	48.0	48.0	92.3	94.5	110.9	132.6	137.2	158.0	162.3	170.0	170.0
50~59歳		33	119.8	28.6	4.5	63.0	63.0	63.0	87.8	99.0	119.7	141.6	158.0	170.1	178.0	178.0
60~69歳		35	120.9	39.4	2.8	53.0	53.0	59.8	72.2	93.0	111.7	147.3	193.9	203.2	207.0	207.0
70歳以上		47	102.5	23.0	3.0	67.0	67.0	69.5	72.0	82.0	105.5	115.0	139.3	147.7	162.0	162.0
(再掲)20歳以上		186	114.6	30.7	2.0	48.0	48.0	57.1	67.2	92.9	112.3	133.0	152.0	169.7	203.4	207.0
(再掲)65~74歳		40	107.3	25.5	3.9	53.0	53.0	68.3	74.1	91.5	104.5	120.3	144.8	161.8	187.0	187.0
(再掲)75歳以上		27	102.1	23.1	4.0	67.0	67.0	72.0	74.7	82.0	104.8	113.0	140.3	151.4	155.0	155.0
(再掲)20歳以上※1		186	114.8	30.3	2.1	48.0	48.0	57.0	68.9	93.2	113.0	134.6	152.0	163.2	202.7	207.0
(再掲)20~49歳※1		71	115.0	28.5	3.1	48.0	48.0	60.7	73.7	94.8	120.0	134.4	148.3	162.5	181.0	181.0
(再掲)65~74歳※1		40	109.3	26.2	4.4	53.0	53.0	70.2	74.7	91.9	105.0	122.6	149.0	161.6	187.0	187.0
(再掲)75歳以上※1		27	101.5	22.7	3.8	67.0	67.0	72.0	77.9	82.0	104.3	113.0	140.2	151.2	155.0	155.0
女性		20~29歳	13	99.3	29.6	8.1	60.0	60.0	63.3	78.1	81.0	85.4	136.5	150.4	151.0	151.0
	30~39歳	31	96.0	24.7	5.5	53.0	53.0	59.8	69.5	76.0	93.0	108.6	122.2	161.9	194.0	194.0
	40~49歳	57	112.6	31.6	5.5	52.0	52.0	73.5	80.6	91.9	106.4	123.3	161.3	195.0	200.0	200.0
	50~59歳	42	118.3	22.0	3.6	75.0	75.0	82.1	84.7	108.0	124.7	129.8	136.5	154.2	211.0	211.0
	60~69歳	52	139.0	28.2	5.7	87.0	87.0	100.3	105.7	115.0	132.2	157.6	173.1	188.7	214.0	214.0
	70歳以上	61	120.2	26.8	4.3	49.0	49.0	50.1	75.9	101.4	120.6	136.3	165.2	174.4	179.0	179.0
	(再掲)20歳以上	256	120.0	30.3	3.1	49.0	49.0	61.6	76.0	96.0	116.6	135.0	162.8	174.9	212.3	214.0
	(再掲)65~74歳	56	130.6	28.7	5.0	81.0	81.0	86.1	89.8	114.0	126.6	137.0	171.6	189.2	214.0	214.0
	(再掲)75歳以上	36	119.9	31.0	7.3	49.0	49.0	74.4	78.1	102.0	113.4	136.9	171.0	176.1	179.0	179.0
	(再掲)20歳以上※1	256	117.8	30.4	2.9	49.0	49.0	57.7	75.8	93.2	115.0	134.0	162.1	174.1	212.0	214.0
	(再掲)20~49歳※1	101	104.6	29.2	2.7	52.0	53.0	66.2	76.0	85.1	95.6	121.0	137.8	172.2	199.8	200.0
	(再掲)65~74歳※1	56	130.6	28.9	4.4	81.0	81.0	90.3	95.6	114.0	126.3	137.3	172.0	187.0	214.0	214.0
	(再掲)75歳以上※1	36	121.1	30.9	6.7	49.0	49.0	74.6	81.0	102.0	114.8	139.4	170.3	175.9	179.0	179.0

注)単位:mg/dL

注)血清LDLコレステロールの測定を行い、身体状況調査の問題においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表53-1 血清non HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差・年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性・20歳以上
 [コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用を含む]

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数															
20～29歳	25	119.9	29.5	6.2	79.0	79.0	83.9	87.1	94.0	116.2	145.5	164.8	167.0	167.0	167.0
30～39歳	54	123.4	34.7	5.0	69.0	69.0	70.9	83.0	103.1	111.9	139.2	169.5	211.6	224.0	224.0
40～49歳	99	145.8	39.8	6.4	63.0	71.4	99.6	105.0	115.6	139.0	168.0	197.4	245.0	268.0	268.0
50～59歳	84	142.3	33.5	5.7	81.0	82.5	98.0	100.5	116.0	139.2	163.0	174.6	197.2	259.0	259.0
60～69歳	103	157.4	36.1	4.9	96.0	96.0	101.3	114.7	130.6	152.0	180.7	210.1	230.1	249.7	250.0
70歳以上	136	139.8	30.3	2.1	65.0	86.2	96.3	101.0	123.0	136.4	158.7	181.3	190.1	237.5	238.0
(再掲)20歳以上	501	143.1	36.0	2.5	63.0	81.4	94.0	100.1	116.0	139.0	163.0	190.0	210.2	256.3	268.0
(再掲)65～74歳	119	149.5	31.5	5.7	86.0	96.5	105.3	115.5	126.8	145.9	166.3	191.5	211.0	247.1	250.0
(再掲)75歳以上	79	138.5	33.6	3.0	65.0	67.8	95.2	101.1	113.0	135.0	158.0	187.5	191.7	238.0	238.0
(再掲)20歳以上※1	501	141.5	35.7	2.4	63.0	81.3	93.4	99.0	115.0	138.0	163.0	187.0	207.5	255.5	268.0
(再掲)20～49歳※1	178	132.9	37.4	3.8	63.0	69.9	86.0	93.2	105.0	127.0	157.9	172.5	205.9	263.5	268.0
(再掲)65～74歳※1	119	149.3	31.4	5.1	86.0	96.7	105.1	115.2	126.0	145.7	166.5	191.7	211.0	246.8	250.0
(再掲)75歳以上※1	79	138.3	33.2	2.7	65.0	68.4	95.3	102.0	113.0	134.9	158.0	187.1	191.3	238.0	238.0
20～29歳	12	122.1	29.6	7.2	82.0	82.0	84.5	86.7	91.1	120.6	152.9	162.8	165.0	165.0	165.0
30～39歳	23	135.1	38.5	7.1	71.0	71.0	71.0	86.2	111.4	130.3	161.3	201.9	214.0	216.0	216.0
40～49歳	40	160.4	31.9	3.9	106.0	106.0	107.4	116.4	137.0	161.0	172.9	199.2	224.4	255.0	255.0
50～59歳	38	145.2	39.6	7.8	91.0	91.0	91.0	95.7	116.0	145.3	170.8	191.5	229.8	259.0	259.0
60～69歳	41	151.0	41.4	3.6	96.0	96.0	96.0	98.8	116.9	139.3	177.0	218.7	230.5	231.0	231.0
70歳以上	54	128.6	25.9	2.7	86.0	86.1	87.6	96.3	104.3	126.5	148.7	168.8	175.4	184.0	184.0
(再掲)20歳以上	208	142.3	36.8	2.7	71.0	74.1	90.8	97.4	115.0	137.0	167.9	196.0	212.3	256.7	259.0
(再掲)65～74歳	47	139.4	32.4	7.6	86.0	87.0	96.6	103.5	116.3	127.0	158.0	202.6	211.0	211.0	211.0
(再掲)75歳以上	32	127.4	26.8	4.0	87.0	87.0	87.0	95.6	103.3	125.9	144.0	173.2	175.7	181.0	181.0
(再掲)20歳以上※1	208	142.0	36.2	2.6	71.0	74.1	89.9	97.1	115.0	137.0	166.5	185.0	210.8	256.5	259.0
(再掲)20～49歳※1	75	142.8	36.5	3.5	71.0	71.0	86.3	90.3	113.0	141.8	168.8	191.3	209.7	255.0	255.0
(再掲)65～74歳※1	47	141.2	32.2	7.3	86.0	88.4	96.7	104.8	117.0	127.0	165.5	184.9	211.0	211.0	211.0
(再掲)75歳以上※1	32	126.8	26.3	3.8	87.0	87.0	87.0	95.9	103.6	125.6	143.0	173.0	175.7	181.0	181.0
20～29歳	13	115.9	30.7	9.1	79.0	79.0	79.1	83.8	94.7	100.0	156.6	167.0	167.0	167.0	167.0
30～39歳	31	111.6	26.3	5.7	69.0	69.0	75.3	82.6	95.0	106.3	124.6	139.2	183.4	224.0	224.0
40～49歳	59	135.1	41.8	8.2	63.0	63.8	89.1	102.0	112.2	124.4	144.0	174.4	254.8	268.0	268.0
50～59歳	46	139.5	26.5	5.3	81.0	81.0	100.0	100.9	118.8	137.9	159.9	166.3	194.3	240.0	240.0
60～69歳	62	161.7	31.7	5.8	97.0	98.4	114.4	128.0	141.8	152.0	181.7	206.2	224.6	250.0	250.0
70歳以上	82	147.8	30.9	3.8	65.0	82.4	100.8	112.1	127.2	140.0	166.2	187.9	203.9	238.0	238.0
(再掲)20歳以上	293	143.7	35.4	4.1	63.0	81.2	96.0	102.0	118.1	139.0	162.3	190.0	207.1	255.4	268.0
(再掲)65～74歳	72	155.6	29.6	3.9	97.0	101.3	123.0	123.6	137.0	151.9	167.0	194.5	211.4	250.0	250.0
(再掲)75歳以上	47	147.8	36.1	6.1	65.0	65.0	97.6	102.5	128.3	138.5	171.0	191.2	236.2	238.0	238.0
(再掲)20歳以上※1	293	141.1	35.4	4.0	63.0	81.2	94.0	100.0	114.1	139.0	158.0	187.2	205.6	254.1	268.0
(再掲)20～49歳※1	103	124.5	36.3	4.0	63.0	69.2	83.8	93.0	101.2	114.0	139.0	164.0	209.0	267.7	268.0
(再掲)65～74歳※1	72	154.4	30.0	4.0	97.0	97.9	114.4	123.0	136.0	151.3	166.7	200.8	209.9	250.0	250.0
(再掲)75歳以上※1	47	148.8	35.6	5.7	65.0	65.0	97.8	102.9	129.0	138.9	172.2	190.9	236.1	238.0	238.0

注) 血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

non HDL コレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL)

表53-2

血清non HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上
 [コレステロール又は中性脂肪を下げる薬の使用有無除]

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20～29歳	25	119.9	29.5	6.2	79.0	79.0	83.9	87.1	94.0	116.2	145.5	164.8	167.0	167.0
	30～39歳	54	123.4	34.7	5.0	69.0	69.0	70.9	83.0	103.1	111.9	139.2	169.5	211.6	224.0
	40～49歳	93	145.5	40.6	7.0	63.0	70.2	97.1	103.9	114.5	139.0	163.0	198.3	248.5	268.0
	50～59歳	75	145.8	32.9	4.4	91.0	91.0	98.6	108.6	119.0	145.0	175.6	200.5	259.0	259.0
	60～69歳	87	157.4	36.8	4.5	96.0	96.0	98.8	115.0	128.7	151.2	181.0	208.6	230.4	250.0
	70歳以上	108	137.6	30.5	2.5	65.0	86.1	97.0	99.9	122.3	135.0	153.6	176.0	191.0	236.7
	(再掲)20歳以上	442	142.7	36.6	2.4	63.0	80.7	94.0	100.0	116.0	137.0	163.0	192.0	211.1	257.5
	(再掲)65～74歳	96	147.3	31.6	5.2	86.0	96.1	103.7	115.1	125.1	142.9	163.0	189.3	210.7	250.0
	(再掲)75歳以上	63	135.9	33.6	4.2	65.0	66.2	95.0	98.9	108.4	134.0	150.8	183.2	192.0	238.0
	(再掲)20歳以上※1	442	141.0	36.2	2.3	63.0	80.3	92.0	99.0	114.0	137.0	163.0	187.0	207.6	256.7
男性	(再掲)20～49歳※1	172	132.2	37.6	4.1	63.0	69.8	85.6	93.1	105.0	125.0	155.2	172.4	207.8	263.8
	(再掲)65～74歳※1	96	147.7	31.7	4.7	86.0	96.1	104.8	115.0	125.0	142.8	163.0	190.0	208.3	250.0
	(再掲)75歳以上※1	63	136.0	33.4	3.9	65.0	66.9	95.2	99.3	112.7	134.0	159.0	181.7	191.7	238.0
	20～29歳	12	122.1	29.6	7.2	82.0	82.0	84.5	86.7	91.1	120.6	152.9	162.8	165.0	165.0
	30～39歳	23	135.1	38.5	7.1	71.0	71.0	71.0	86.2	111.4	130.3	161.3	201.9	214.0	216.0
	40～49歳	36	160.3	33.2	4.1	106.0	106.0	107.3	108.0	137.0	158.3	175.5	199.8	225.5	255.0
	50～59歳	33	149.0	39.6	6.9	91.0	91.0	91.0	104.4	117.3	150.1	173.0	195.8	236.8	259.0
	60～69歳	35	147.8	41.0	3.5	96.0	96.0	96.0	98.2	116.2	135.1	174.7	224.0	230.6	231.0
	70歳以上	47	126.1	25.3	3.0	86.0	86.0	86.9	96.4	103.9	125.3	136.4	171.9	175.7	184.0
	(再掲)20歳以上	186	141.5	37.0	2.8	71.0	71.0	90.3	97.0	114.3	135.0	167.2	191.3	214.8	257.1
女性	(再掲)65～74歳	40	132.9	27.9	4.7	86.0	86.1	96.5	102.3	115.7	127.0	142.5	179.3	204.3	211.0
	(再掲)75歳以上	27	125.8	26.7	4.4	87.0	87.0	87.0	96.3	103.1	125.3	135.0	173.8	176.5	181.0
	(再掲)20歳以上※1	186	141.2	36.4	2.7	71.0	71.8	88.9	97.0	115.0	135.0	166.0	184.7	211.9	256.9
	(再掲)20～49歳※1	71	141.8	36.9	3.7	71.0	71.0	85.6	89.6	111.9	140.0	165.6	194.6	210.6	255.0
	(再掲)65～74歳※1	40	135.2	28.8	5.4	86.0	87.1	96.6	103.4	116.1	127.0	149.3	183.3	198.3	211.0
	(再掲)75歳以上※1	27	125.2	26.1	4.2	87.0	87.0	87.0	96.7	103.4	124.8	135.0	173.7	176.2	181.0
	20～29歳	13	115.9	30.7	9.1	79.0	79.0	79.1	83.8	94.7	100.0	156.6	167.0	167.0	167.0
	30～39歳	31	111.6	26.3	5.7	69.0	69.0	75.3	82.6	95.0	106.3	124.6	139.2	183.4	224.0
	40～49歳	57	135.1	42.4	8.4	63.0	63.3	89.0	102.0	111.8	125.0	144.0	176.7	255.6	268.0
	50～59歳	42	142.8	25.0	4.0	96.0	96.0	101.5	114.4	125.6	140.1	162.0	194.5	240.0	240.0
60～69歳	52	164.2	32.1	6.5	97.0	106.3	119.0	128.0	141.5	152.6	186.4	205.6	230.7	250.0	
70歳以上	61	147.7	31.2	4.8	65.0	65.7	98.9	115.0	131.0	140.7	165.9	190.6	209.8	238.0	
(再掲)20歳以上	256	143.7	36.3	4.3	63.0	79.8	96.0	102.0	118.8	139.0	163.0	191.6	208.9	258.1	
(再掲)65～74歳	56	156.7	30.6	4.3	97.0	103.4	121.3	123.6	139.0	152.0	166.6	201.3	222.3	250.0	
(再掲)75歳以上	36	146.4	37.1	8.5	65.0	65.0	87.6	101.1	127.3	137.0	165.9	191.9	222.6	238.0	
(再掲)20歳以上※1	256	140.9	36.2	4.1	63.0	79.6	93.5	100.0	114.0	138.0	159.1	190.0	206.5	256.9	
(再掲)20～49歳※1	101	124.3	36.4	4.0	63.0	68.9	83.6	92.5	101.0	113.9	139.0	163.3	209.0	267.8	
(再掲)65～74歳※1	56	156.2	31.0	4.0	97.0	105.1	115.3	123.1	137.9	151.5	166.6	202.2	219.8	250.0	
(再掲)75歳以上※1	36	147.9	36.7	7.9	65.0	65.0	91.1	103.4	127.4	137.0	172.7	191.6	221.0	238.0	

注)血清総コレステロール値およびHDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬および中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

non HDL コレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL)

表54 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の状況 - 年齢階級別、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑い、割合、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

性年齢	人数	メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)が 強く疑われる者		メタボリックシンドローム (内臓脂肪症候群)の 予備群と考えられる者		左記以外		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	24	1.8%	2.0%	10.4%	8.2%	87.8%	8.0%
	30～39歳	52	4.4%	3.8%	9.4%	5.8%	86.2%	5.6%
	40～49歳	99	7.0%	3.1%	21.2%	8.5%	71.8%	7.5%
	50～59歳	83	2.8%	1.2%	18.3%	4.8%	79.0%	4.2%
	60～69歳	103	20.3%	4.9%	23.2%	7.7%	56.6%	6.1%
	70歳以上	135	27.4%	3.3%	22.4%	4.4%	50.2%	4.9%
	(再掲)20歳以上	496	14.3%	1.8%	19.8%	1.9%	65.8%	3.4%
	(再掲)65～74歳	119	22.5%	6.4%	23.0%	4.8%	54.5%	4.1%
	(再掲)75歳以上	78	30.5%	3.6%	22.6%	6.3%	46.9%	7.4%
	(再掲)20歳以上※1	496	13.0%	1.8%	19.0%	1.9%	67.9%	3.5%
	(再掲)20～49歳※1	175	4.5%	1.8%	14.7%	6.5%	80.8%	5.9%
	(再掲)65～74歳※1	119	21.8%	6.0%	23.8%	4.4%	54.4%	3.6%
(再掲)75歳以上※1	78	30.2%	4.2%	21.6%	6.3%	48.2%	8.1%	
男性	20～29歳	12	2.7%	3.1%	15.8%	9.9%	81.5%	9.5%
	30～39歳	23	8.6%	7.1%	18.5%	11.6%	72.9%	10.7%
	40～49歳	40	9.4%	6.0%	35.2%	10.4%	55.3%	8.5%
	50～59歳	38	5.6%	2.8%	28.3%	9.7%	66.1%	8.5%
	60～69歳	41	23.2%	7.8%	33.8%	11.3%	43.0%	8.4%
	70歳以上	54	43.7%	8.1%	29.0%	6.6%	27.2%	8.8%
	(再掲)20歳以上	208	19.4%	2.2%	28.9%	3.1%	51.7%	4.5%
	(再掲)65～74歳	47	35.9%	10.9%	26.9%	9.0%	37.2%	9.8%
	(再掲)75歳以上	32	44.3%	11.1%	32.8%	12.1%	22.9%	11.5%
	(再掲)20歳以上※1	208	19.4%	2.2%	28.9%	3.1%	51.7%	4.5%
	(再掲)20～49歳※1	75	6.8%	3.6%	30.2%	9.4%	69.0%	8.2%
	(再掲)65～74歳※1	47	35.2%	9.8%	30.2%	9.4%	34.6%	9.6%
(再掲)75歳以上※1	32	42.4%	11.0%	31.4%	11.9%	26.2%	12.4%	
女性	20～29歳	12	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	29	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	40～49歳	59	5.3%	3.3%	10.9%	4.9%	83.8%	5.2%
	50～59歳	45	0.0%	0.0%	8.5%	3.8%	91.5%	3.8%
	60～69歳	62	18.4%	3.9%	16.0%	7.7%	65.6%	8.6%
	70歳以上	81	15.7%	3.2%	17.6%	7.3%	66.7%	7.7%
	(再掲)20歳以上	288	10.2%	2.4%	12.5%	3.0%	77.3%	4.4%
	(再掲)65～74歳	72	14.3%	5.5%	20.7%	6.1%	65.0%	6.6%
	(再掲)75歳以上	46	19.0%	3.6%	14.0%	10.3%	67.0%	8.8%
	(再掲)20歳以上※1	288	8.9%	2.2%	11.4%	2.5%	79.6%	4.0%
	(再掲)20～49歳※1	100	2.5%	1.6%	6.5%	2.6%	91.0%	2.6%
	(再掲)65～74歳※1	72	13.5%	5.2%	19.8%	5.5%	66.7%	6.3%
(再掲)75歳以上※1	46	19.1%	3.3%	12.8%	9.5%	68.1%	8.1%	

注1) 血圧、腹囲、ヘモグロビンA1c、血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬、インスリン注射または血糖を下げる薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬の服用状況にすべて回答した20歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦6名(20-29歳の1名と30-39歳の5名)を除外した。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

”メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑い”の判定

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者

腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、3つの項目(血中脂質、血圧、血糖)のうち2つ以上の項目に該当する者。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備軍と考えられる者

腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、3つの項目(血中脂質、血圧、血糖)のうち1つに該当する者。

※”該当する”とは、下記の「基準」を満たしている場合、かつ/または「服薬」がある場合とする。

腹囲	腹囲(ウエスト周囲径)		
	血中脂質	血圧	血糖
項目			
基準	・HDLコレステロール値 40mg/dL未満	・収縮期血圧値 130mmHg以上 ・拡張期血圧値 85mmHg以上	・ヘモグロビン A1c(NGSP)値 6.0%以上
服薬	・コレステロールを下げる薬服用 ・中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬服用	・血圧を下げる薬服用	・血糖を下げる薬服用 ・インスリン注射使用

表55 糖尿病の指摘の状況－年齢階級別、糖尿病の指摘の有無、割合、標準誤差
－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	人数	指摘あり		指摘なし		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	25	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	54	6.7%	5.7%	93.3%	5.7%
	40～49歳	99	7.6%	1.9%	92.4%	1.9%
	50～59歳	84	15.6%	4.5%	84.4%	4.5%
	60～69歳	103	12.6%	2.5%	87.4%	2.5%
	70歳以上	136	30.0%	8.2%	70.0%	8.2%
	(再掲)20歳以上	501	15.5%	2.6%	84.5%	2.6%
	(再掲)65～74歳	119	19.2%	6.1%	80.8%	6.1%
	(再掲)75歳以上	79	28.9%	5.0%	71.1%	5.0%
	(再掲)20歳以上※1	501	14.1%	2.4%	85.9%	2.4%
	(再掲)20～49歳※1	178	5.0%	2.2%	95.0%	2.2%
	(再掲)65～74歳※1	119	17.2%	5.5%	82.8%	5.5%
	(再掲)75歳以上※1	79	31.3%	5.5%	68.7%	5.5%
男性	20～29歳	12	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	23	12.2%	11.1%	87.8%	11.1%
	40～49歳	40	10.8%	4.2%	89.2%	4.2%
	50～59歳	38	18.0%	9.8%	82.0%	9.8%
	60～69歳	41	12.5%	5.0%	87.5%	5.0%
	70歳以上	54	33.6%	6.6%	66.4%	6.6%
	(再掲)20歳以上	208	17.4%	3.8%	82.6%	3.8%
	(再掲)65～74歳	47	17.4%	8.2%	82.6%	8.2%
	(再掲)75歳以上	32	37.8%	8.3%	62.2%	8.3%
	(再掲)20歳以上※1	208	16.4%	3.5%	83.6%	3.5%
	(再掲)20～49歳※1	75	7.7%	4.1%	92.3%	4.1%
	(再掲)65～74歳※1	47	17.2%	7.4%	82.8%	7.4%
	(再掲)75歳以上※1	32	40.5%	8.9%	59.5%	8.9%
女性	20～29歳	13	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	30～39歳	31	1.1%	1.2%	98.9%	1.2%
	40～49歳	59	5.2%	3.0%	94.8%	3.0%
	50～59歳	46	13.4%	5.8%	86.6%	5.8%
	60～69歳	62	12.6%	3.3%	87.4%	3.3%
	70歳以上	82	27.3%	10.3%	72.7%	10.3%
	(再掲)20歳以上	293	14.0%	3.9%	86.0%	3.9%
	(再掲)65～74歳	72	20.4%	9.1%	79.6%	9.1%
	(再掲)75歳以上	47	21.6%	4.8%	78.4%	4.8%
	(再掲)20歳以上※1	293	12.2%	3.3%	87.8%	3.3%
	(再掲)20～49歳※1	103	2.7%	1.6%	97.3%	1.6%
	(再掲)65～74歳※1	72	17.2%	8.4%	82.8%	8.4%
	(再掲)75歳以上※1	47	23.1%	4.9%	76.9%	4.9%

注) ヘモグロビンA1c値を測定し、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」、「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の服薬状況のすべてに回答をしている者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表56 糖尿病を指摘されたことがある者における、治療の状況 - 治療の状況、年齢階級別、割合、標準誤差-男性・女性・総数、20歳以上

	性年齢	人数	糖尿病の治療あり		糖尿病の治療なし	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	3	16.6%	20.3%	83.4%	20.3%
	40～49歳	6	29.6%	22.2%	70.4%	22.2%
	50～59歳	11	65.5%	18.9%	34.5%	18.9%
	60～69歳	11	72.5%	12.2%	27.5%	12.2%
	70歳以上	27	64.1%	7.4%	35.9%	7.4%
	(再掲)20歳以上	58	61.1%	7.1%	38.9%	7.1%
	(再掲)65～74歳	14	61.6%	12.9%	38.4%	12.9%
	(再掲)75歳以上	18	60.7%	8.1%	39.3%	8.1%
	(再掲)20歳以上※1	58	62.4%	7.8%	37.6%	7.8%
	(再掲)20～49歳※1	9	25.5%	19.6%	74.5%	19.6%
	(再掲)65～74歳※1	14	62.3%	13.0%	37.7%	13.0%
	(再掲)75歳以上※1	18	64.4%	10.1%	35.6%	10.1%
男性	20～29歳	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	2	9.1%	12.1%	90.9%	12.1%
	40～49歳	4	11.1%	13.0%	88.9%	13.0%
	50～59歳	4	73.4%	27.7%	26.6%	27.7%
	60～69歳	5	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	70歳以上	14	46.9%	17.0%	53.1%	17.0%
	(再掲)20歳以上	29	54.0%	10.4%	46.0%	10.4%
	(再掲)65～74歳	7	74.0%	25.0%	26.0%	25.0%
	(再掲)75歳以上	10	42.9%	20.5%	57.1%	20.5%
	(再掲)20歳以上※1	29	55.9%	10.7%	44.1%	10.7%
	(再掲)20～49歳※1	6	10.2%	10.8%	89.8%	10.8%
	(再掲)65～74歳※1	7	76.1%	22.9%	23.9%	22.9%
	(再掲)75歳以上※1	10	49.0%	19.8%	51.0%	19.8%
女性	20～29歳	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	40～49歳	2	57.5%	35.9%	42.5%	35.9%
	50～59歳	7	55.3%	16.9%	44.7%	16.9%
	60～69歳	6	54.5%	24.4%	45.5%	24.4%
	70歳以上	13	79.2%	7.9%	20.8%	7.9%
	(再掲)20歳以上	29	68.2%	6.2%	31.8%	6.2%
	(再掲)65～74歳	7	55.1%	14.0%	44.9%	14.0%
	(再掲)75歳以上	8	86.8%	10.5%	13.2%	10.5%
	(再掲)20歳以上※1	29	69.6%	6.7%	30.4%	6.7%
	(再掲)20～49歳※1	3	62.4%	31.8%	37.6%	31.8%
	(再掲)65～74歳※1	7	53.8%	14.7%	46.2%	14.7%
	(再掲)75歳以上※1	8	88.8%	8.9%	11.2%	8.9%

注1)ヘモグロビンA1c値を測定し、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」、「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の服薬状況のすべてに回答をした者のうち、「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。

注2)身体状況調査票の「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無」、「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」のいずれかに「有」と回答した者を糖尿病の治療ありとした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値

表57 「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況 - 糖尿病が疑われる人の状況 - 年齢階級別、割合、標準誤差 - 総数・男性・女性・20歳以上

性年齢	人数	糖尿病が強く疑われる		糖尿病の可能性を否定できない人		左記以外		(再掲)糖尿病が強く疑われる人のうち、服薬者	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
20～29歳	25	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30～39歳	54	1.1%	1.2%	0.0%	0.0%	98.9%	1.2%	0.0%	0.0%
40～49歳	99	3.8%	2.0%	5.4%	2.6%	90.7%	2.8%	58.4%	26.1%
50～59歳	83	10.9%	5.0%	3.4%	2.4%	85.8%	4.4%	91.8%	7.4%
60～69歳	103	13.4%	4.1%	8.5%	2.3%	78.1%	5.5%	46.8%	26.9%
70歳以上	135	26.6%	9.0%	14.4%	3.1%	59.0%	7.3%	57.1%	7.8%
(再掲)20歳以上	499	12.8%	2.6%	7.3%	1.6%	79.9%	3.4%	59.2%	5.8%
(再掲)65～74歳	118	20.4%	6.6%	8.8%	3.7%	70.8%	7.3%	56.2%	16.0%
(再掲)75歳以上	79	23.2%	8.0%	16.2%	4.4%	60.6%	7.1%	46.7%	15.4%
(再掲)20歳以上※1	499	11.6%	2.2%	6.7%	1.4%	81.8%	3.0%	63.4%	4.1%
(再掲)20～49歳※1	178	2.0%	0.9%	2.4%	1.2%	95.6%	1.4%	49.3%	24.7%
(再掲)65～74歳※1	118	18.2%	6.1%	8.4%	3.5%	73.4%	7.1%	63.7%	4.7%
(再掲)75歳以上※1	79	25.8%	8.7%	16.2%	4.0%	58.0%	7.5%	75.3%	9.3%
20～29歳	12	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30～39歳	23	1.1%	1.2%	0.0%	0.0%	98.9%	1.2%	0.0%	0.0%
40～49歳	40	2.5%	1.8%	10.2%	4.5%	87.3%	4.1%	48.3%	36.6%
50～59歳	38	14.3%	10.2%	1.2%	1.3%	84.5%	10.1%	92.1%	10.3%
60～69歳	41	17.8%	8.6%	2.8%	2.4%	79.4%	8.1%	35.7%	28.1%
70歳以上	53	26.4%	9.0%	22.0%	6.7%	51.6%	4.7%	37.6%	19.5%
(再掲)20歳以上	207	13.4%	2.3%	7.7%	2.1%	78.8%	3.7%	48.2%	12.1%
(再掲)65～74歳	46	21.5%	10.1%	13.7%	6.2%	64.8%	12.3%	55.5%	27.3%
(再掲)75歳以上	32	28.6%	15.3%	19.4%	4.8%	52.0%	11.0%	26.1%	19.0%
(再掲)20歳以上※1	207	12.7%	2.0%	6.8%	2.0%	80.5%	3.4%	60.5%	5.0%
(再掲)20～49歳※1	75	1.3%	0.8%	4.2%	2.0%	94.5%	1.9%	37.2%	30.1%
(再掲)65～74歳※1	46	20.7%	8.9%	12.3%	5.9%	67.0%	11.3%	73.2%	7.2%
(再掲)75歳以上※1	32	31.6%	15.6%	18.6%	4.8%	49.8%	11.2%	79.2%	11.6%
20～29歳	13	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
30～39歳	31	1.1%	1.2%	0.0%	0.0%	98.9%	1.2%	0.0%	0.0%
40～49歳	59	4.8%	3.0%	1.9%	1.9%	93.3%	3.8%	62.2%	29.9%
50～59歳	45	7.5%	3.8%	3.5%	4.5%	87.0%	3.9%	91.2%	10.5%
60～69歳	62	10.4%	3.5%	12.3%	3.8%	77.3%	6.3%	59.5%	28.3%
70歳以上	82	26.7%	10.3%	9.3%	4.2%	64.0%	10.4%	70.5%	10.0%
(再掲)20歳以上	292	12.2%	3.8%	7.0%	2.2%	80.8%	4.8%	68.8%	8.1%
(再掲)65～74歳	72	19.8%	9.4%	5.9%	3.2%	74.3%	9.1%	56.7%	13.1%
(再掲)75歳以上	47	18.7%	4.9%	13.5%	7.1%	67.8%	8.6%	72.9%	23.8%
(再掲)20歳以上※1	292	10.7%	3.2%	6.5%	1.9%	82.8%	4.0%	66.7%	4.3%
(再掲)20～49歳※1	103	2.5%	1.4%	0.9%	0.8%	96.6%	1.7%	54.6%	29.8%
(再掲)65～74歳※1	72	16.7%	8.6%	6.1%	2.9%	77.2%	8.4%	55.8%	4.8%
(再掲)75歳以上※1	47	20.5%	4.9%	14.0%	6.6%	65.4%	8.6%	71.2%	9.2%

注1)ヘモグロビンA1c値を測定し、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」、「(6)インスリン注射または血糖を下げる薬の服薬状況のすべてに回答をした者のうち、「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。
 注2)身体状況調査票の「(6)(c)インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無」、「(7-1)現在糖尿病の治療の有無」のいずれかに「有」と回答した者を糖尿病の治療ありとした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをした値。

「糖尿病が強く疑われる人」の判定
 ヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査票(6)(c)及び(7)に回答した者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)の値が6.5%以上、または、身体状況調査票の(7-1)「現在、糖尿病治療の有無」に「有」と回答した者
 「糖尿病の可能性を否定できない人」の判定
 ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)値が6.0%以上、6.5%未満で、「糖尿病が強く疑われる人」以外の人

表58 高血圧症有病者の状況－年齢階級別、高血圧症有病者の状況、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	人数	高血圧症有病者			正常高値血圧者			上記以外			(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	25	8.3%	7.2%	1.7%	1.9%	89.9%	7.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	30～39歳	57	10.6%	5.4%	4.1%	3.1%	85.3%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%		
	40～49歳	99	13.7%	2.4%	9.6%	1.7%	76.7%	3.4%	26.3%	11.9%	11.9%		
	50～59歳	84	29.8%	5.1%	8.2%	2.8%	61.9%	6.2%	53.3%	8.2%	8.2%		
	60～69歳	105	60.8%	7.4%	5.5%	5.5%	33.7%	6.8%	61.6%	5.8%	5.8%		
	70歳以上	140	72.3%	6.8%	8.1%	3.1%	19.6%	5.8%	76.6%	5.2%	5.2%		
	(再掲)20歳以上	510	43.1%	2.6%	7.1%	1.2%	49.9%	2.9%	63.4%	4.1%	4.1%		
	(再掲)65～74歳	121	68.0%	4.2%	7.4%	2.8%	24.7%	4.3%	63.7%	4.7%	4.7%		
	(再掲)75歳以上	82	75.4%	8.5%	10.4%	4.8%	14.2%	5.8%	75.3%	9.3%	9.3%		
	(再掲)20歳以上※1	510	40.4%	2.5%	7.2%	1.1%	52.4%	2.6%	62.2%	3.7%	3.7%		
	(再掲)20～49歳※1	181	10.9%	1.8%	5.9%	1.4%	83.2%	2.2%	14.4%	7.7%	7.7%		
	(再掲)65～74歳※1	121	66.9%	4.1%	6.9%	3.6%	23.7%	3.9%	62.4%	4.6%	4.6%		
(再掲)75歳以上※1	82	77.3%	8.0%	9.3%	4.3%	13.4%	5.5%	77.5%	9.4%	9.4%			
男性	20～29歳	12	12.9%	11.9%	2.7%	3.1%	84.4%	12.4%	0.0%	0.0%	0.0%		
	30～39歳	23	19.7%	11.2%	6.5%	6.7%	73.8%	12.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	40～49歳	40	22.2%	3.3%	4.6%	3.0%	73.2%	4.4%	22.3%	16.2%	16.2%		
	50～59歳	38	49.0%	9.8%	5.5%	3.1%	45.5%	10.7%	51.7%	7.6%	7.6%		
	60～69歳	43	67.3%	8.6%	2.0%	1.6%	30.7%	8.4%	53.6%	9.2%	9.2%		
	70歳以上	56	82.8%	6.7%	2.7%	1.8%	14.5%	6.3%	84.7%	8.5%	8.5%		
	(再掲)20歳以上	212	51.4%	4.6%	3.8%	1.5%	44.8%	4.7%	60.5%	5.0%	5.0%		
	(再掲)65～74歳	48	83.1%	4.7%	2.3%	2.3%	13.2%	4.1%	73.2%	7.2%	7.2%		
	(再掲)75歳以上	34	82.3%	9.1%	2.2%	1.8%	15.4%	8.9%	79.2%	11.6%	11.6%		
	(再掲)20歳以上※1	212	49.1%	4.4%	4.1%	1.5%	46.8%	4.5%	59.3%	4.5%	4.5%		
	(再掲)20～49歳※1	75	17.5%	3.6%	4.3%	2.2%	78.2%	3.9%	11.5%	9.2%	9.2%		
	(再掲)65～74歳※1	48	81.9%	4.5%	6.4%	4.1%	11.7%	4.1%	72.3%	6.7%	6.7%		
(再掲)75歳以上※1	34	83.0%	8.7%	2.2%	1.8%	14.8%	8.5%	80.2%	11.3%	11.3%			
女性	20～29歳	13	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	30～39歳	34	1.9%	1.5%	1.9%	1.5%	96.2%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	40～49歳	59	7.5%	3.2%	13.3%	4.8%	79.2%	5.3%	35.0%	15.6%	15.6%		
	50～59歳	46	11.4%	5.1%	10.9%	5.3%	77.7%	5.4%	59.7%	31.5%	31.5%		
	60～69歳	62	56.4%	9.0%	7.8%	3.7%	35.8%	7.3%	68.1%	5.5%	5.5%		
	70歳以上	84	64.8%	8.1%	12.0%	5.3%	23.3%	6.7%	69.2%	5.5%	5.5%		
	(再掲)20歳以上	298	36.3%	3.7%	9.7%	2.0%	54.0%	4.1%	66.7%	4.3%	4.3%		
	(再掲)65～74歳	73	59.1%	8.2%	9.5%	4.3%	31.4%	7.2%	55.8%	4.8%	4.8%		
	(再掲)75歳以上	48	69.3%	11.0%	17.5%	8.9%	13.2%	7.1%	71.2%	9.2%	9.2%		
	(再掲)20歳以上※1	298	33.3%	3.3%	9.7%	1.7%	57.0%	3.6%	65.6%	3.9%	3.9%		
	(再掲)20～49歳※1	106	5.3%	1.8%	7.2%	2.2%	87.4%	2.4%	22.2%	13.6%	13.6%		
	(再掲)65～74歳※1	73	57.8%	7.6%	11.3%	4.4%	30.9%	6.4%	54.0%	4.6%	4.6%		
(再掲)75歳以上※1	48	71.8%	10.3%	16.0%	8.3%	12.1%	6.5%	74.5%	9.5%	9.5%			

注1) 血圧を測定をし、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に回答をしている者を集計対象とした。

*「服薬者」は、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に「有」と回答した者

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

「高血圧症有病者」の判定

収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者

「正常高値血圧者」の判定

収縮期血圧130～139mmHg、かつ/または拡張期血圧85～89mmHg以上の者

表59 「脂質異常症が疑われる者」の状況-年齢階級別、脂質異常症が疑われる人の状況、割合-総数・男性・女性、20歳以上

	性年齢	人数	脂質異常症が疑われる人		左記以外		(再掲)脂質異常症が疑われる人のうち服薬者	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	25	12.0%	7.9%	88.0%	7.9%	16.9%	9.2%
	30～39歳	54	18.9%	8.2%	81.1%	8.2%	34.3%	13.3%
	40～49歳	99	22.8%	7.0%	77.2%	7.0%	38.2%	7.2%
	50～59歳	84	17.6%	7.2%	82.4%	7.2%	22.0%	7.8%
	60～69歳	103	16.0%	3.2%	84.0%	3.2%	14.0%	5.7%
	70歳以上	136	29.4%	7.2%	70.6%	7.2%	23.5%	6.1%
	(再掲)20歳以上	501	21.0%	4.2%	79.0%	4.2%	24.3%	4.7%
	(再掲)65～74歳	119	21.8%	7.1%	78.2%	7.1%	19.9%	10.7%
	(再掲)75歳以上	79	31.2%	6.1%	68.8%	6.1%	28.2%	4.3%
	(再掲)20歳以上※1	501	19.8%	3.9%	80.2%	3.9%	56.4%	4.6%
	(再掲)20～49歳※1	178	17.2%	5.2%	82.8%	5.2%	18.7%	11.4%
	(再掲)65～74歳※1	119	21.8%	6.3%	78.2%	6.3%	93.2%	4.7%
	(再掲)75歳以上※1	79	30.9%	5.5%	69.1%	5.5%	63.6%	12.7%
男性	20～29歳	12	18.5%	9.5%	81.5%	9.5%	23.8%	15.2%
	30～39歳	23	37.8%	13.7%	62.2%	13.7%	46.4%	13.4%
	40～49歳	40	38.5%	7.7%	61.5%	7.7%	81.4%	11.5%
	50～59歳	38	22.6%	8.5%	77.4%	8.5%	52.0%	12.7%
	60～69歳	41	13.1%	5.8%	86.9%	5.8%	35.9%	5.9%
	70歳以上	54	24.5%	6.6%	75.5%	6.6%	79.0%	15.0%
	(再掲)20歳以上	208	24.9%	4.9%	75.1%	4.9%	41.7%	20.9%
	(再掲)65～74歳	47	20.7%	12.0%	79.3%	12.0%	16.4%	11.5%
	(再掲)75歳以上	32	27.2%	4.4%	72.8%	4.4%	11.3%	6.4%
	(再掲)20歳以上※1	208	24.3%	4.7%	75.7%	4.7%	35.1%	5.6%
	(再掲)20～49歳※1	75	31.3%	6.9%	68.7%	6.9%	14.7%	9.2%
	(再掲)65～74歳※1	47	19.9%	10.7%	80.1%	10.7%	80.6%	13.5%
	(再掲)75歳以上※1	32	28.2%	4.3%	71.8%	4.3%	38.5%	19.5%
女性	20～29歳	13	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	31	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	40～49歳	59	11.3%	6.8%	88.7%	6.8%	39.0%	28.6%
	50～59歳	46	12.8%	5.6%	87.2%	5.6%	75.0%	16.5%
	60～69歳	62	18.0%	4.6%	82.0%	4.6%	94.2%	4.7%
	70歳以上	82	32.9%	8.2%	67.1%	8.2%	89.3%	9.6%
	(再掲)20歳以上	293	17.8%	4.0%	82.2%	4.0%	83.1%	7.2%
	(再掲)65～74歳	72	22.4%	5.1%	77.6%	5.1%	100.0%	0.0%
	(再掲)75歳以上	47	34.5%	9.7%	65.5%	9.7%	81.8%	16.4%
	(再掲)20歳以上※1	293	16.1%	3.5%	83.9%	3.5%	82.5%	6.7%
	(再掲)20～49歳※1	103	5.2%	3.3%	94.8%	3.3%	39.0%	28.6%
	(再掲)65～74歳※1	72	22.9%	4.5%	77.1%	4.5%	100.0%	0.0%
	(再掲)75歳以上※1	47	33.3%	9.2%	66.7%	9.2%	82.8%	15.4%

注)HDLコレステロールを測定し、身体状況調査の問診において「(6) (d)コレステロールを下げる薬」、「(6) (e) 中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬」の使用状況に回答した者を集計対象とした。

*「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6) (d)コレステロールを下げる薬」、「(6) (e) 中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬」に使用「有」と回答し
*身体状況調査票の問診(7-1)「現在糖尿病の治療の有無(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)」に「有」と回答した者を治療ありと

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

「脂質異常症が疑われる人」の判定
県民栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記の通りとした。
HDLコレステロールが40mg/dl未満、もしくはコレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬を服用している者。

表60 運動習慣の有無 - 運動習慣の有無、年齢階級別、割合、標準誤差
- 総数・男性・女性、20歳以上

	性年齢	人数	運動あり		運動なし	
			割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	25	22.5%	5.9%	77.5%	5.9%
	30～39歳	61	11.1%	5.3%	88.9%	5.3%
	40～49歳	103	13.8%	4.6%	86.2%	4.6%
	50～59歳	82	16.9%	4.0%	83.1%	4.0%
	60～69歳	104	29.4%	5.3%	70.6%	5.3%
	70歳以上	137	38.2%	3.6%	61.8%	3.6%
	(再掲)20歳以上	512	24.6%	2.6%	75.4%	2.6%
	(再掲)65～74歳	119	38.6%	5.0%	61.4%	5.0%
	(再掲)75歳以上	80	38.8%	3.5%	61.2%	3.5%
	(再掲)20歳以上※1	512	22.4%	3.1%	77.6%	3.1%
	(再掲)20～49歳※1	189	13.4%	4.4%	86.6%	4.4%
	(再掲)20～64歳※1	313	14.5%	2.7%	85.5%	2.7%
	(再掲)65歳以上※1	199	36.2%	5.1%	63.8%	5.1%
	(再掲)65～74歳※1	119	35.5%	6.2%	64.5%	6.2%
	(再掲)75歳以上※1	80	37.5%	4.1%	62.5%	4.1%
男性	20～29歳	13	32.5%	6.0%	67.5%	6.0%
	30～39歳	26	20.9%	10.4%	79.1%	10.4%
	40～49歳	44	15.4%	3.3%	84.6%	3.3%
	50～59歳	35	10.8%	5.5%	89.2%	5.5%
	60～69歳	43	36.7%	7.3%	63.3%	7.3%
	70歳以上	54	51.7%	6.9%	48.3%	6.9%
	(再掲)20歳以上	215	29.8%	4.1%	70.2%	4.1%
	(再掲)65～74歳	48	52.8%	9.7%	47.2%	9.7%
	(再掲)75歳以上	31	51.0%	4.7%	49.0%	4.7%
	(再掲)20歳以上※1	215	27.9%	4.4%	72.1%	4.4%
	(再掲)20～49歳※1	83	20.6%	4.9%	79.4%	4.9%
	(再掲)20～64歳※1	136	17.9%	3.7%	82.1%	3.7%
	(再掲)65歳以上※1	79	47.7%	7.9%	52.3%	7.9%
	(再掲)65～74歳※1	48	47.0%	11.5%	53.0%	11.5%
	(再掲)75歳以上※1	31	48.8%	5.5%	51.2%	5.5%
女性	20～29歳	12	3.0%	3.3%	97.0%	3.3%
	30～39歳	35	1.5%	1.6%	98.5%	1.6%
	40～49歳	59	12.5%	6.9%	87.5%	6.9%
	50～59歳	47	21.9%	7.0%	78.1%	7.0%
	60～69歳	61	24.5%	5.9%	75.5%	5.9%
	70歳以上	83	28.9%	4.6%	71.1%	4.6%
	(再掲)20歳以上	297	20.4%	2.0%	79.6%	2.0%
	(再掲)65～74歳	71	30.3%	5.0%	69.7%	5.0%
	(再掲)75歳以上	49	29.0%	4.9%	71.0%	4.9%
	(再掲)20歳以上※1	297	18.0%	2.4%	82.0%	2.4%
	(再掲)20～49歳※1	106	7.1%	3.2%	92.9%	3.2%
	(再掲)20～64歳※1	177	11.6%	2.6%	88.4%	2.6%
	(再掲)65歳以上※1	120	28.2%	3.6%	71.8%	3.6%
	(再掲)65～74歳※1	71	28.5%	5.1%	71.5%	5.1%
	(再掲)75歳以上※1	49	27.8%	4.5%	72.2%	4.5%

注) 身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、(9)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。

※「運動の習慣有」とは、身体状況調査の問診(9)で1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続していると回答した者。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表61-1 歩数の平均値及び標準偏差-年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差-総数・男性・女性・20歳以上(すべての者)

性年齢	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
総数	20~29歳	69	7086	4368	438	614	692	1893	2611	3950	5792	9561	14373	17065	17707
	30~39歳	101	6176	3798	569	138	200	848	1700	3391	5549	7869	11248	14042	22886
	40~49歳	169	6596	3849	248	251	376	1709	2690	3871	5837	8283	11646	13363	22096
	50~59歳	128	6591	3591	382	428	600	2491	2675	3741	5819	8726	11802	13953	19730
	60~69歳	144	5639	3235	431	180	402	1179	1994	3048	5277	7827	10428	11885	14043
	70歳以上	197	4355	4071	486	30	30	152	398	1476	3409	6019	8843	10070	23127
	(再掲)20歳以上	808	5825	3881	213	30	143	843	1476	3165	5209	7589	10756	12892	17603
	(再掲)65~74歳	162	5404	3050	304	180	408	1261	1840	3120	5131	6924	9769	11333	14076
	(再掲)75歳以上	124	3957	4692	706	30	30	141	168	952	2959	5314	8941	11078	28243
	(再掲)20歳以上※1	808	5905	3857	188	30	151	1002	1662	3215	5267	7822	10905	13147	17615
	(再掲)20~49歳※1	339	6521	3885	227	138	430	1401	2281	3852	5721	8637	11610	13849	20036
	(再掲)65~74歳※1	162	5357	2984	291	180	438	1235	1826	3116	5117	6920	9754	11249	14068
	(再掲)75歳以上※1	124	3965	4657	675	30	30	142	175	944	2958	5381	9012	12127	28053
	20~29歳	36	7677	4737	565	1621	1621	2527	3401	3963	5917	9827	16900	17453	17707
30~39歳	50	5979	3730	668	1217	1217	1217	1649	3301	5418	7508	11498	12811	22999	
40~49歳	83	7297	4457	592	251	288	2657	3058	3942	5963	10351	12266	16451	24720	
50~59歳	65	6191	3857	775	428	452	2277	2579	3276	4777	8771	11740	12727	22460	
60~69歳	68	5468	3267	552	180	333	1111	1824	3042	4941	7326	10434	11901	14115	
70歳以上	79	4982	3564	594	149	150	188	349	2115	5191	6689	9284	14720	15705	
(再掲)20歳以上	381	6121	3966	237	149	180	1211	2039	3287	5387	7920	11645	13638	20249	
(再掲)65~74歳	73	5677	3130	498	180	275	1212	2124	3255	5388	6988	10532	11883	14854	
(再掲)75歳以上	49	4582	3939	874	149	149	168	236	1411	3589	6443	9323	15096	15705	
(再掲)20歳以上※1	381	6220	4000	227	149	220	1215	2041	3357	5427	8091	11643	13884	20049	
(再掲)20~49歳※1	169	6912	4298	339	251	860	1657	2411	3943	5752	9369	12255	16646	22606	
(再掲)65~74歳※1	73	5635	3061	449	180	306	1338	2128	3219	5357	7072	10004	11803	14854	
(再掲)75歳以上※1	49	4669	4107	857	149	149	169	242	1349	3615	6492	10524	15078	15705	
20~29歳	33	6171	3628	799	614	614	1239	1661	3482	5277	8747	12485	13250	13329	
30~39歳	51	6425	3910	704	138	138	346	1831	3511	5696	9218	11236	15347	15917	
40~49歳	86	5858	2933	231	807	845	1149	1933	3858	5716	7791	9789	10750	15827	
50~59歳	63	6972	3303	430	650	1666	2734	3564	4387	6355	8612	12362	14118	16951	
60~69歳	76	5800	3218	617	570	570	1236	2025	2996	5777	7939	10557	11320	13442	
70歳以上	118	3948	4335	568	30	30	140	490	1323	3244	4791	8474	9799	28254	
(再掲)20歳以上	427	5545	3783	239	30	89	632	1246	3019	4875	7533	9894	12340	15769	
(再掲)65~74歳	89	5191	2986	410	570	570	1268	1580	3092	4502	6924	9666	10901	13442	
(再掲)75歳以上	75	3520	5135	758	30	30	80	143	765	2725	4007	7666	9969	30025	
(再掲)20歳以上※1	427	5604	3695	212	30	117	674	1345	3079	4957	7537	9894	12426	15816	
(再掲)20~49歳※1	170	6097	3342	324	138	249	1151	2103	3627	5647	7962	10328	13141	15809	
(再掲)65~74歳※1	89	5135	2918	387	570	570	1221	1539	3068	4516	6912	9343	10790	13442	
(再掲)75歳以上※1	75	3424	5001	718	30	30	86	144	746	2481	3988	7080	9880	30025	

注) 栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動数(歩数)」および「歩数計の装着状況」の両方に回答した者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表61-2 歩数の平均値及び標準偏差一年齢階級別、平均値、標準偏差、標準誤差一総数・男性・女性・20歳以上(装着状況が「いい」または100歩未満、5万歩以上除く)

	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値	
																性年齢
総数	20~29歳	64	7,227	4,358	387	1,213	2,310	2,888	3,954	5,865	9,559	15,933	17,114	17,707	17,707	
	30~39歳	94	6,201	3,792	606	500	911	1,708	3,412	5,563	7,865	11,147	14,389	22,999	22,999	
	40~49歳	158	6,642	3,852	257	384	827	1,717	2,809	3,904	5,839	8,233	11,647	22,248	24,720	
	50~59歳	119	6,763	3,597	422	428	582	2,531	3,094	3,831	6,255	8,800	11,902	14,053	20,544	22,460
	60~69歳	136	5,748	3,198	451	570	570	1,261	2,038	3,058	5,468	7,841	10,347	11,491	14,055	14,115
	70歳以上	187	4,456	4,110	471	117	117	169	597	1,546	3,671	6,088	8,916	10,485	23,812	30,025
	(再掲)20歳以上	758	5,922	3,885	214	117	154	965	1,680	3,265	5,300	7,808	11,044	13,158	17,716	30,025
	(再掲)65~74歳	157	5,335	3,083	286	570	570	1,264	1,939	3,230	5,319	7,164	9,852	11,393	14,085	14,854
	(再掲)75歳以上	115	4,064	4,746	694	117	117	150	255	1,042	2,987	5,398	9,003	11,155	28,858	30,025
	(再掲)20歳以上※1	758	5,995	3,860	190	117	169	1,096	1,831	3,293	5,379	7,852	11,044	13,179	17,698	30,025
	(再掲)20~64歳※1	486	6,545	3,760	205	384	499	1,801	2,388	3,843	5,819	8,638	11,348	13,523	17,904	24,720
	(再掲)65歳以上※1	272	4,904	3,831	391	117	126	309	881	2,283	4,161	6,667	9,739	11,270	15,687	30,025
	(再掲)20~49歳※1	316	6,578	3,881	236	384	458	1,575	2,351	3,884	5,765	8,637	11,652	13,881	20,196	24,720
	(再掲)65~74歳※1	157	5,470	2,993	282	570	570	1,238	1,930	3,208	5,252	6,985	9,762	11,286	14,078	14,854
	(再掲)75歳以上※1	115	4,062	4,707	663	117	117	152	255	1,020	2,985	5,415	9,060	13,158	28,728	30,025
男性	20~29歳	34	7,718	4,758	630	2,183	2,763	3,432	3,964	5,900	9,829	16,943	17,478	17,707	17,707	
	30~39歳	46	5,914	3,718	683	1,217	1,217	1,501	3,194	5,406	7,451	11,122	12,896	22,999	22,999	
	40~49歳	79	7,338	4,476	604	384	2,801	3,068	3,928	5,965	10,373	12,274	16,990	24,720	24,720	
	50~59歳	59	6,479	3,880	798	428	442	2,509	2,623	3,439	5,150	8,899	11,794	12,944	22,460	
	60~69歳	62	5,531	3,247	565	675	675	1,131	1,817	3,043	5,085	7,326	10,320	11,827	14,115	
	70歳以上	77	5,012	3,578	599	149	150	186	343	2,107	5,197	6,695	9,291	14,745	15,705	
	(再掲)20歳以上	357	6,188	3,981	258	149	180	1,212	2,040	3,359	5,434	7,951	11,653	13,869	21,111	24,720
	(再掲)65~74歳	70	5,836	3,137	502	1,210	1,210	1,276	2,127	3,324	5,696	7,218	10,585	12,622	14,854	14,854
	(再掲)75歳以上	47	4,619	3,971	888	149	149	168	232	1,371	3,971	6,475	9,437	15,124	15,705	
	(再掲)20歳以上※1	357	6,285	4,016	246	149	199	1,215	2,042	3,365	5,507	8,124	11,653	13,999	20,234	24,720
	(再掲)20~64歳※1	240	6,698	4,139	351	384	628	1,799	2,334	3,816	5,665	8,722	11,957	15,722	22,499	24,720
	(再掲)65歳以上※1	117	5,342	3,562	375	149	155	267	1,133	2,778	5,293	6,864	9,745	13,924	15,640	15,705
	(再掲)20~49歳※1	159	6,923	4,315	357	384	1,020	1,743	2,452	3,948	5,758	8,748	12,278	16,750	22,696	24,720
	(再掲)65~74歳※1	70	5,774	3,066	454	1,210	1,210	1,420	2,131	3,285	5,586	7,303	10,491	11,853	14,854	14,854
	(再掲)75歳以上※1	47	4,707	4,139	870	149	149	168	238	1,310	3,979	6,524	10,953	15,106	15,705	
女性	20~29歳	30	6,439	3,588	653	1,213	1,327	2,309	3,624	5,655	9,056	12,840	13,265	13,329	13,329	
	30~39歳	48	6,555	3,897	759	500	500	2,165	3,544	5,845	9,330	11,809	15,394	15,917	15,917	
	40~49歳	79	5,888	2,881	199	1,136	1,153	1,993	3,897	5,739	7,710	9,779	10,647	15,827	15,827	
	50~59歳	60	7,018	3,333	447	650	1,585	2,651	3,560	4,402	6,555	8,666	12,447	14,127	16,951	
	60~69歳	74	5,943	3,163	598	570	570	1,390	2,271	3,341	5,914	7,977	10,646	11,323	13,442	
	70歳以上	110	4,073	4,415	566	117	117	148	632	1,392	3,310	4,810	8,501	9,812	29,003	30,025
	(再掲)20歳以上	401	5,670	3,780	216	117	134	715	1,379	3,190	4,994	7,574	10,108	12,487	15,809	30,025
	(再掲)65~74歳	87	5,303	3,002	413	570	570	1,260	1,633	3,210	4,682	7,014	9,795	10,965	13,442	13,442
	(再掲)75歳以上	68	3,653	5,238	764	117	117	128	172	856	2,883	4,023	7,427	10,147	30,025	30,025
	(再掲)20歳以上※1	401	5,718	3,689	195	117	145	801	1,442	3,237	5,130	7,574	10,114	12,552	15,845	30,025
	(再掲)20~64歳※1	246	6,385	3,318	247	500	500	1,732	2,470	3,904	6,172	8,270	10,770	13,304	15,826	16,951
	(再掲)65歳以上※1	155	4,556	4,011	465	117	117	360	729	2,091	3,917	6,020	9,210	10,622	24,622	30,025
	(再掲)20~49歳※1	157	6,199	3,315	299	500	500	1,270	2,275	3,739	5,751	8,087	10,424	13,190	15,824	15,917
	(再掲)65~74歳※1	87	5,230	2,930	393	570	570	1,209	1,542	3,135	4,703	6,924	9,505	10,850	13,442	13,442
	(再掲)75歳以上※1	68	3,541	5,093	725	117	117	131	227	843	2,874	3,993	6,303	10,030	30,025	30,025

注) 栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動数(歩数)」および「歩数計の装着状況」の両方に回答した者を集計対象とした。なお、歩数が100歩未満、50,000歩以上の者を除外した。
注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。